

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EFECTUADA EN LA BASE DE DATOS "PSICODOC" DEL COLEGIO

DE PSICÓLOGOS SOBRE EL TEMA: "SÍNDROME POSTRAUMÁTICO"

TITULO: CATASTROFES. REPERCUSION EN SALUD MENTAL

AUTOR: MARIN LOZANO, J.J. \ SANTO-DOMINGO CARRASCO, J.
AFILIACION: HOSP. LA PAZ, SERV. PSIQUIATRIA, MADRID , ESPAÑA
REVISTA: Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
PAIS-FUENTE: ESPAÑA
VOL-NO: Vol. 14 (49)
PAGS: 293-295
AÑO: 1994
IDIOMA: ESPAÑOL
TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO DE REVISTA

**TITULO: INTERVENCION TERAPEUTICA EN EL TRASTORNO POR ESTRES POSTRAUMATICO: UN
ANALISIS TEMATICO**

AUTOR: PEREZ SAN GREGORIO, M.A. \ BORDA MAS, M. \ MARTIN RODRIGUEZ, A. \ ET AL
AFILIACION: UNIV. SEVILLA, ESPAÑA
REVISTA: Psicologemas
PAIS-FUENTE: ESPAÑA
VOL-NO: Vol. 8 (15)
PAGS: 25-40
AÑO: 1994
IDIOMA: ESPAÑOL
TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO DE REVISTA

RESUMEN: EN EL PRESENTE ARTICULO SE REALIZA UNA REVISION DE LA LITERATURA SOBRE LAS INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN EL AMBITO DEL TRATAMIENTO TERAPEUTICO DEL TRASTORNO POR ESTRES POSTRAUMATICO, DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO 1974-1993. SE PRESENTA UN ANALISIS DE PRODUCTIVIDAD (POR AÑOS, PAISES Y AUTORES) Y UN ANALISIS DE MATERIAS (POR REVISTA Y AREAS TEMATICAS). SE UTILIZA LA BASE COMPUTERIZADA DEL PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS Y LAS PALABRAS CLAVES POSTRAUMATIC STRESS DISORDER Y THERAPY. LOS PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES FUERON: (1) 1992 ES EL AÑO MAS PRODUCTIVO, (2) USA ES EL PAIS MAS PRODUCTIVO. (3) EL AUTOR MAS PRODUCTIVO ES DAVIDSON, J.R., (4) HAY UN TOTAL DE 69 REVISTAS DIFERENTES QUE PUBLICAN SOBRE ESTE AREA. LA MAS PRODUCTIVA ES AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Y (5) EL AREA TEMATICA MAS TRABAJADA HA SIDO EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO FRENTE AL PSICOLOGICO. Y DENTRO DE ESTE ULTIMO LA TECNICA TERAPEUTICA MAS UTILIZADA HA SIDO LA DESINSIBILIZACION SISTEMATICA POR MOVIMIENTO OCULAR.

ABSTRACT: IN THIS ARTICLE WE REVIEW THE LITERATURE DEALING WITH RESEARCH ON THE THERAPEUTIC TREATMENT IN POSTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD), PUBLISHED BETWEEN 1974 AND 1993. WE ANALYSED PRODUCTIVITY (CONSIDERING DATE OF PUBLICATION, AUTHORS AND COUNTRY OF ORIGIN), AND TOPICS (CONSIDERING THE PUBLISHING JOURNAL AND THE PARTICULAR TOPIC THE ARTICLE DEALS WITH). WE SEARCHED ARTICLES CONTAINING THE KEY WORDS POSTRAUMATIC STRESS DISORDER AND THERAPY IN THE COMPUTERIZED DATA BASE PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS. THE MAIN RESULTS AND CONCLUSIONS WERE: (1) THE MOST PRODUCTIVE YEAR IS 1992, (2) THE MOST PRODUCTIVE COUNTRY ORIGINATING ARTICLE IN THIS AREA WAS THE UNITED STATES, (3) THE MOST PRODUCTIVE AUTHOR IS DAVIDSON, J.R., (4) A TOTAL OF 69 DIFFERENT SCIENTIFIC JOURNALS PUBLISHED ARTICLES IN THIS AREA. THE MOST PRODUCTIVE JOURNAL IS AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, (5) THE MOST FREQUENT TOPIC THAT ARTICLES IN THIS AREA DEALT WITH WAS THE PHARMACOLOGICAL TREATMENT AS CONTRASTED WITH PSYCHOLOGICAL TREATMENT. IS THE WYE-MOVEMENT DESENSITIZATION THE PSYCHOLOGICAL TREATMENT MORE EMPLOYED.

TITULO: LOS PROCESOS PSICOSOCIALES Y JURIDICOS DE LA VICTIMIZACION CRIMINAL

AUTOR: SORIA VERDE, MIGUEL ANGEL \ HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO

AFILIACION: UNIV. BARCELONA/TRIBUNAL SUPERIOS DE JUSTICIA, CATALUÑA

REVISTA: Anuario de Psicología Jurídica

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 4

PAGS: 101-109

AÑO: 1994

IDIOMA: ESPAÑOL

TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO DE REVISTA

RESUMEN: LA GRAN OLVIDADA ES LA VICTIMA, TANTO EN LA PSICOLOGIA

JURIDICA, COMO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA. EL DESARROLLO DE LOS SEVICIOS DE

APOYOS A LAS VICTIMAS, HA SUPUESTO LA APROXIMACION Y ECLOSION DEL PSICOLOGO EN LOS PROCESOS DE VICTIMIZACION CRIMINAL

ABSTRACT: THE GREAT FORGOTTEN IS THE VICTIM, AS MUCH IN LEGAL PSYCHOLOGY AS IN THE LEGAL SYSTEM. THE DEVELOPMENT OF SUPPORT SERVICES TO VICTIMS HAS MEANT THE APPREACH AND THE EMERGING OF THE PSYHOLOGIST IN THE PROCESSES OF CRIMINAL VICTIMIZATION.

TITULO: ESTUDI DESCRIPTIU DELS PROCESSOS PSICO-SOCIALS I JURIDICS DE LA VICTIMITZACIO CRIMINAL

TIT-TRADUCIDO: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PROCESOS PSICO-SOCIALES Y JURIDICOS DE LA VICTIMIZACION CRIMINAL

AUTOR: SORIA VERDE, MIGUEL ANGEL

AFILIACION: UNIV. BARCELONA

REVISTA: Justiforum

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (1)

PAGS: 131-138

AÑO: 1994

IDIOMA: CATALAN

TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO DE REVISTA

TITULO: LOS TRAUMAS DE GUERRA EN LOS NIÑOS DE SARAJEVO

AFILIACION: UNICEF

REVISTA: Papeles del Psicólogo: Revista del Colegio Oficial de Psicólogos

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 3 (58)

PAGS: 19-21

AÑO: 1994

IDIOMA: ESPAÑOL

TIPO-DOCUMENTO: INFORME \ REVISTA

TITULO: GUERRA: IMPACTO PSICOLOGICO EN LA INFANCIA

AUTOR: APARICI SANCHEZ, GEMA \ YUSTE MARIN, BEATRIZ

AFILIACION: PSICOLOGOS SIN FRONTERAS

REVISTA: Informació Psicológica

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (57)

PAGS: 4-6

AÑO: 1995

IDIOMA: ESPAÑOL

TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO DE REVISTA

FRASE-CLAVE: REFUGIADOS \ ACOGIMIENTO FAMILIAR

RESUMEN: EL PRESENTE ARTICULO PRETENDE DAR A CONOCER LA COLABORACION DE LA O.N.G.

PSICOLOGOS SIN FRONTERAS (P.S.F.), EN EL PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA A NIÑOS DE BOSNIA: NAVIDAD 94 PRO-BOSNIA, QUE DABA ACOGIDA, DURANTE VEINTICINCO DIAS, A

UN GRUPO DE QUINCE NIÑOS EN FAMILIAS VALENCIANAS. TRAS UNA BREVE INTRODUCCION AL CONCEPTO DE ESTRES PROTRAUMATICO, SE PRESENTA UNA DESCRIPCION DEL PROGRAMA, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ESTUVO DIRIGIDO A FACILITAR EL PROCESO DE ADAPTACION, CREANDO UN SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA. SE EXPONEN LAS ALTERACIONES PSICOLOGICAS ENCONTRADAS EN ESTOS NIÑOS, SIENDO LOS QUE HAN SUFRIDO LAS SECUELAS DE LA GUERRA MAS DE CERCA Y TIENEN UNA SITUACION FAMILIAR MAS PRECARIA, LOS QUE PRESENTAN MAS PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA. FINALMENTE, SE HACE UNA VALORACION DEL PROGRAMA EN VISTAS A FUTUROS PROYECTOS.

TITULO: CATASTROFES, SITUACIONES DE RIESGO Y FACTORES PSICOSOCIALES

AUTOR: Páez Rovira, Darío \ ARROYO GARCIA, ELENA \ FERNANDEZ SEDANO, ITZIAR

AFILIACION: UNIV. PAIS VASCO, ESPAÑA

REVISTA: Mapfre Seguridad

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (57)

PAGS: 43-55

AÑO: 1995

IDIOMA: ESPAÑOL

TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO DE REVISTA

RESUMEN: EN ESTE ARTICULO SE EXPONEN LOS RESULTADOS DE UNA ENCUESTA SOBRE UNA MUESTRA ADULTA DE LA CAV (GRAN BILBAO). LOS SUJETOS CONTESTARON SOBRE LA CATASTROFE MAS IMPORTANTE DE SU VIDA. LA MITAD DE LOS ENCUESTADOS, APROXIMADAMENTE, HABIAN SIDO TESTIGOS O PARTICIPADO EN UN HECHO TRAUMATICO QUE AFECTABA A UNA COLECTIVIDAD. EL MIEDO, EL ENFADO Y CONDUCTAS COLECTIVAS DE AYUDA Y ESCAPE ERAN FRECUENTES. LOS ENTREVISTADOS INFORMABAN HABER UTILIZADO ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO RACIONALES Y DE AUTOCONTROL, MAS QUE DE EVITACION Y DE FALTA DE, ADAPTACIONES. LOS SINTOMAS DE REMINISCENCIA, EVITACION, HIPERREACTIVIDAD E INSENSIBILIDAD SE PRESENTABAN ASOCIADOS A LA CATASTROFE CON UNA FRECUENCIA BAJA-MEDIA. LAS CONDUCTAS DE PANICO, LAS SENSACIONES DE MIEDO Y DE SENTIRSE ATRAPADO SE ASOCIAN A SINTOMAS MAYORES. EL AFRONTAMIENTO ADAPTATIVO NO LOGRA DISMINUIR LOS SINTOMAS, AUNQUE SE ASOCIO A MENORES CONDUCTAS DE PANICO.

LA OPINION SOBRE LA AYUDA E INFORMACION RECIBIDA ERA GENERALMENTE POSITIVA.

TITULO: EL DAÑO PSIQUICO: CONSIDERACIONES LEGALES

AUTOR: PEREZ PEREZ, E.

AFILIACION: INST. PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN, MIR PSIQUIATRIA

REVISTA: Psiquiatría Pública

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 7 (5) 28-31

AÑO: 1995

IDIOMA: ESPAÑOL

TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO DE REVISTA

RESUMEN: LA AUTORA REVISA EL CONCEPTO DE DAÑO PSIQUICO Y LA REPERCUSION LEGAL QUE ESTE HA TENIDO EN LOS ULTIMOS AÑOS. ANALIZA EL IMPACTO LEGAL DE LA APARICION DEL DIAGNOSTICO DEL TRASTORNO POR ESTRES POSTRAUMATICO (DSM-III, 1980) Y COMPARA DIVERSOS ESTUDIOS QUE PONEN EN DUDA LA FIABILIDAD DE DICHO DIAGNOSTICO.

ABSTRACT: MENTAL INJURY: LEGAL CONSIDERATIONS. THE AUTHOR REVIEWS THE CONCEPT OF PSYCHIC INJURY AND ITS LEGAL IMPLICATIONS IN THE PAST YEARS. SHE ANALIZES THE LEGAL IMPACT OF A NEW DIAGNOSIS, THE POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (DSM-III, 1980) AND COMPARES DIFFERENT STUDIES THAT QUESTION ITS RELIABILITY.

TITULO: Navidad en las lineas del terremoto (Nazca, 1996). Experiencia de una Brigada de Salud Mental

AUTOR: Vasquez, Freddy

AFILIACION: Inst. Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, Subprograma de Salud Mental, Lima, Peru

REVISTA: Anales de Salud Mental

PAIS-FUENTE: PERÚ
VOL-NO: Vol. 12 (1-2)
PAGS: 267-269
AÑO: 1996
IDIOMA: Español
TIPO-DOCUMENTO: Articulo de revista
FRASE-CLAVE: Terremoto
NOTAS: NO CONTIENE RESUMEN

TITULO: Raices y cicatrices en la memoria transgeneracional

AUTOR: Grynberg Robinson, Miriam
AFILIACION: Univ. Iberoamericana, Mexico
REVISTA: Psicología Iberoamericana
PAIS-FUENTE: MÉXICO
VOL-NO: Vol. 4 (3)
PAGS: 20-25
AÑO: 1996

IDIOMA: Español
TIPO-DOCUMENTO: Articulo de revista
FRASE-CLAVE: Transmision generacional

RESUMEN: En este trabajo se revisan las consecuencias de ser sobreviviente de guerra y, sobre todo, las consecuencias de la transmision del trauma a las siguientes generaciones (transmision transgeneracional). Se sabe que aquellos que han sobrevivido a una guerra y no han logrado elaborar el trauma por la vivencia, la perdida y la separacion que esto produce, lo transmiten a algunos de los miembros de las siguientes generaciones, haciendolos cargos de la elaboracion del trauma, encontrandose diferentes secuelas en los hijos e inclusive en los nietos. Se ha descubierto que no todas las familias sufren de transmision y que no todos los hijos son victimas de ella. Parece ser que esto depende del grado de elaboracion del duelo logrado por el sobreviviente y de la fuerza estructural psiquica de cada uno de los hijos. Lo que es evidente es que cuando la transmision tiene lugar se establece en formas similares. Los hijos que sufren de la transmision llevan a la carga de tener parte del mundo emocional de sus padres. Se les asigna el privilegio y la obligacion de cicatrizar y tener parte del mundo emocional de sus padres. Se les asna el privilegio y la obligacion de cicatrizar y reparar el trauma, razon por la cual se revisan las diferentes alternativas en el proceso de duelo difereido a la segunda generacion, en una linea continua que va desde aquellos hijos que fracasan en el proceso de elaboracion, estableciendo cuadros sintomatologicos similarres a los de sus padres, hasta aquellos que intentan a traves de procesos creativos elaborar el duelo transmitido. Se discute la importancia de estos procesos en los intentos reparatorios de la elaboracion del trauma y como parte del proceso terapeutico con estos pacientes.

ABSTRACT: This paper reviews the consequences of being a war survivor, and above all, it reviews the transmission of trauma to the next generations (Transgenerational Transmission). It is know that those who have survived a war and have not been able to elaborate living, loss and separation traumas, transmit them to members of the next generation, forcing them take charge of the trauma elaboration. Different sequels of this are found on children and even on grandchildren. It has been discovered that not all families suffer from transmission and that not all children are victims of it. It many seem, this dependes on the degree of mourning elaboration achieved by the survivor and by the psycho estructural strength of his children. Something evident is that when transition takes places, it does in similar manners. Children who suffer from transmission carry the load of belonging to parentes´ trauma. This article reviews the different alternatives in the mourning process delayed to the next generation, in a continuos line, which from those children who fail in the elaboration process and who present symptomatology similar to their parents, to those children who try to elaborate the transmited mourning through creative processes. This paper also discusses the importance of these processes in the

restorative attempts and as part of the therapeutic for patients.

TITULO: El genocidio y la piel

AUTOR: Bar-On, Lily

AFILIACION: Asociacion Psicoanalitica Mexicana, Mexico

REVISTA: Psicología Iberoamericana

PAIS-FUENTE: MÉXICO

VOL-NO: Vol. 4 (3)

PAGS: 26-30

AÑO: 1996

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Articulo de revista

FRASE-CLAVE: Genocidio nazi

RESUMEN: En este trabajo se plantean algunos aspectos de la trayectoria terapeutica de una mujer, sobreviven del genocidio nazi. Las terrorificas escenas y vivencias del exterminio que exceden a lo humanamente concebible, quedan censuradas en un pacto de fidelidad al silencio. La palabra silenciada y prohibida se expresa a traves de los sintomas; entre otros, una severa neurodermatitis. Este sintoma dermatitico expresa la necesidad de poner en palabras lo traumatico. A traves de la relacion terapeutica se intenta encontrar una via mas accesible al dolor, proporcionando un dialogo de piel a piel entre paciente y terapeuta. Este dialogo constituye una segunda piel, en el sentido de una segunda oportunidad para recuperar la palabra, para elaborar lo traumatico y para reconstruir las funciones dañadas en el desarrollo temprano.

ABSTRACT: In this work some aspects about the therapeutic path of a woman survivor of the Nazi Genocide are outlined. The terrifying scenes and experiences of extermination, which exceed that humanly conceivable, remain censored in a pact of fidelity to silence. The silenced and forbidden word is expressed through the symptom, among others, a severe Neurodermatitis. This dermatitic symptom expresses the need to put in words the traumatic experience. Through the therapeutic relationship the finding of a more accessible way to pain is attempted, providing a Dialogue from Skin to Skin between patient and therapist. This Dialogue constitutes a Second Skin, in the sense of a Second opportunity to recuperate the word, for elaborating the trauma and to rebuild the damaged functions in the early developments.

TITULO: Vida en la oscuridad. Un caso

AUTOR: Springer, Raquel

AFILIACION: Univ. Iberoamericana, Mexico

REVISTA: Psicología Iberoamericana

PAIS-FUENTE: MÉXICO

VOL-NO: Vol. 4 (3)

PAGS: 69-72

AÑO: 1996

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Articulo de revista

FRASE-CLAVE: Terremoto

RESUMEN: Se describe la intervencion terapeutica llevada a cabo con una victima del terremoto de 1985 en la ciudad de Mexico. Socorro (nombre ficticio), permanecio sepultada bajo los escombros durante 7 dias. Se usaron tecnicas de intervencion en crisis con la paciente, su familia y el personal medico y paramedico de la institucion en la que fue hospitalizada despues de su rescate, a fin de elaborar la situacion traumatica experimentada por todos.

ABSTRACT: This is a brief description of a therapeutic intervention which took place with a victim of 1985's earthquake in Mexico City. She, Socorro (fictitious name) was buried under a building for seven days. Techniques of crisis intervention were used with the patient, her family and the staff of the hospital where she was taken, in order to work through the traumatic situation experienced by all.

TITULO: Trastornos de estres post-traumatico. Una perspectiva de terapeuta ocupacional

AUTOR: Hall, Gillian

AFILIACION: Crawford Builiding Southbrae Drive, Divison de Terapia Ocupacional, Glasgow, Reino Unido

CONGRESO: Congreso Europeo de Terapia Ocupacional. (5º. 1996. Madrid, España) (Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales)

LIBRO: V Congreso europeo de terapia ocupacional. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 1997

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

PAGS: 57-66

AÑO: 1996

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Actas de congreso

TITULO: Demencias postraumaticas

AUTOR: Bruna Rabassa, O.

AFILIACION: Univ. Ramon Llull, Fac. Psicologia y Ciencias de la Educacion Blanquerna, Barcelona, España

CONGRESO: Reunión sobre Daño Cerebral y Calidad de Vida, Demencias. (3ª. 1996. Madrid, España)(Fundación MAPFRE Medicina)

LIBRO: Daño cerebral y calidad de vida: demencias. Madrid: Fundación MAPFRE Medicina, 1997

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

PAGS: 175-191

AÑO: 1996

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Actas de congreso

NOTAS: NO CONTIENE RESUMEN

TITULO: Trastorno por estres postraumatico

AUTOR: Paul Ochotorrena, Joaquin de

CONGRESO: Jornadas Nacionales sobre Apoyo Psicológico en Desastres. (1ª. 1997. Huesca, España)(Cruz Roja Española)

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

PAGS: 9-39

AÑO: 1997

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Actas de congreso

NOTAS: NO CONTIENE RESUMEN

TITULO: Multiplicidad tematica en la comprension psicologica de los desastres

AUTOR: Cortes, Beatriz \ Aragonés, Juan Ignacio

AFILIACION: Univ. Castilla-La Mancha, Cent. Universitario de Talavera de la Reina, Toledo, España/Univ. Complutense de Madrid, Fac. Psicologia, España

REVISTA: Papeles del Psicólogo: Revista del Colegio Oficial de Psicólogos

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (68)

PAGS: 7-14

AÑO: 1997

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Articulo de revista

RESUMEN: El articulo ofrece una revision de la literatura psicologica relacionada con la investigacion en los desastres, poniendo en evidencia la falta de un marco integrador de los diferentes hallazgos, pudiendose hablar de una multiplicidad tematica. Entre los campos que se abordan se hace referencia a las experiencias traumaticas del desastre, destacando las aportaciones desde

ambitos tan diferentes como el psicoanalisis, la dinamica de grupo, la intervencion comunitaria. En segundo termino, se presenta un modelo que relaciona el estres psicologico y el conflicto decisional y se hace una breve presentacion del papel de la psicologia social en el estudio de la toma de decisiones en las situaciones de emergencia. Finalmente, se dedica un apartado al error humano debatiendose en que medida este concepto es insuficiente para abarcar la diversidad de factores humanos implicados en los accidentes mayores.

ABSTRACT: The paper offers a review of the psychological literature related to the disaster research, revealing the lack of an integrative framework of the different findings, being possible to talk about a thematic multiplicity in the area. Firstly, the research on traumatic experience of a disaster is presented, from such different approaches as psychoanalysis, group dynamics and community intervention. Secondly, a model that relates the psychological stress to the decision making process is presented, after which there is some comments on the role of the social psychology on the study of the decision making process in emergencies situations. Finally, we discuss the human error concept and to what extent it is enough to explain the diversity of human factors involved in a mayor accident.

TITULO: Psicologia, instituciones y catastrofes

AUTOR: Puertas Lopez, Elena

AFILIACION: Ministerio del Interior, Direccion General de Proteccion Civil, España

REVISTA: Papeles del Psicólogo: Revista del Colegio Oficial de Psicólogos

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (68)

PAGS: 15-19

AÑO: 1997

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Articulo de revista

RESUMEN: En este articulo se expone la necesidad ineludible de la presencia del psicologo en el campo de los desastres, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad de riesgo creciente. Se propone una interseccion entre instituciones reguladoras en materia de desastres y el profesional de la psicologia, interseccion que debe discurrir por distintos ambitos: la Psicologia social, Psicologia clinica, formacion... y que debe constituir un firme compromiso para mejorar el actual sistema de respuesta ante catastrofes. La investigacion, la prevencion, la formacion y el apoyo a las victimas son las tareas fundamentales que el psicologo debe trabajar y perfeccionar, con el objeto de minimizar la vulnerabilidad psicologica que puede conllevar una situacion de riesgo o de desastre y ofrecer recursos saludables que fomenten una cultura preventiva de mayor conocimiento del riesgo y de autoproteccion.

ABSTRACT: This article explores the pressing need for the presence of the psychologist in the field of disasters, above all when one considers that we are living in a society in which risks are on the increase. It is proposed for professionals in disaster management and psychologists to work together. This cooperation should take place in a variety of areas, including social Psychology, Clinical Psychology, training, and so on, and should constitute a firm commitment to improving the present system of response to disasters. Research, prevention, training and victim support are the fundamental tasks that the psychologist must undertake, with the aim of mimimising the psychological vulnerability that may result from situations of risk and disaster, and of providing sound resources for fomenting a preventive culture with a better understanding of risk of self-protection.

TITULO: Despues de los desastres....., ¿que?

AUTOR: Nicolas y Martinez, Luis de

AFILIACION: Colegio Oficial de Psicologos, Delegacion de Euskadi, Grupo de Trabajo Intervencion Psicologica en Desastres, España

REVISTA: Papeles del Psicólogo: Revista del Colegio Oficial de Psicólogos

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (68)

PAGS: 51-58

AÑO: 1997

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Artículo de revista

RESUMEN: El presente artículo tiene por objetivo la reflexión sobre la planificación y gestión de los desastres por parte de la comunidad, a la luz de una breve historia de los estudios realizados sobre la catástrofe y sus consecuencias dramáticas en Europa y EEUU, así como la reseña de principales problemas que conllevan tal gestión y planificación.

ABSTRACT: This article has the aim of thinking about the planning and management of the disasters in the community and describing the main problems that this planning and management suffers, by taking a brief history of the studies (made in Europe and USA) as an example about the disasters and its dramatic consequences.

TITULO: Salud mental y desastres: consecuencias psicológicas de las explosiones ocurridas en la Fábrica Militar Río Tercero, Córdoba, Argentina

TIT-TRADUCIDO: Mental health and disaster: psychological consequences of explosions in Rio Tercero's Military Factory, Cordoba, Argentina

AUTOR: Fahrer, Rodolfo D. \ Pecci, María Cristina \ Prieto, Claudia Gómez \ Besozzi, Alejandra \ Garzarón, M. Carmen

AFILIACION: Univ. Buenos Aires, Fac. Medicina, Argentina/Hosp. de Clínicas, Dep. Salud Mental, Buenos Aires, Argentina

REVISTA: Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina

PAIS-FUENTE: ARGENTINA

VOL-NO: Vol. 43 (3) Sep

PAGS: 202-211

AÑO: 1997

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Artículo \ Estudio empírico

FRASE-CLAVE: Evaluación epidemiológica de la población afectada por catástrofes y del impacto psicológico en la salud mental, Argentina \ Argentina

RESUMEN: Se presentan aquí los resultados de una investigación epidemiológica realizada después de una serie de explosiones ocurridas en la Fábrica Militar Río III, ubicada en la ciudad del mismo nombre, en noviembre de 1995. Para evaluar las consecuencias psicológicas, se aplicó un cuestionario autoadministrable basado en los criterios del DSM-IV para estrés postraumático. Se administraron 1222 encuestas a adultos y 1195 a niños y jóvenes residentes en diferentes zonas de la ciudad. Los resultados muestran que las variables asociadas a la mayor exposición al riesgo, como residencia cercana, daños a la vivienda o lesiones, predicen mayor probabilidad de reacciones psicológicas importantes. En conclusión, convivir con el riesgo y la amenaza ambiental exige una clara planificación de intervenciones en salud mental y una constante actualización de conocimientos. Asimismo, capacitación actualizada para el personal de salud, los grupos de socorro, escuelas y otras instituciones para fortalecer redes de prevención, mitigación y rehabilitación.

ABSTRACT: Results of an epidemiological study of the psychological consequences of a series of explosions that took place in november 1995 at a military factory named Fabrica Militar Río III, located in the city of Río Tercero, Argentina, are presented here. A self-reporting questionnaire based on DSM IV criteria on post-traumatic stress disorder was administered to a 1222 adult population and 1195 children and adolescents who were residents in different areas of the city. Results show that variables associated to higher risk exposure, like living nearby, home damage or personal injuries, predict higher probability of severe psychological reactions to the event. In conclusion, living with environment hazards and risks requires to be clearly planned on mental health participation in case of a disaster, as well as constant knowledge update. Training for health

personnel, first aiders teams, schools and other institutions are needed in order to strengthen prevention, mitigation and rehabilitation networks.

TITULO: Paralisis oculomotora postraumaticas. Estudio clinico y electromiografico

AUTOR: Gonzalez, E. \ Esteban, A.

AFILIACION: Hosp. Provincial, Servicio de Neurocirugia, Madrid, España/Hosp. Provincial, Seccion de Neurofisiologia, Madrid, España

REVISTA: Archivos de Neurobiología

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 47 (4)

PAGS: 213-218

AÑO: 1984

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Articulo de revista

FRASE-CLAVE: Paralisis oculomotora

RESUMEN: Seis pacientes de los 632 (0.94%) que sufrieron un TCE sin hipertension intracraneal desarrollaron una paralisis oculomotora. Cuatro casos presentaban una lesion del VI par (en tres era bilateral) y los dos restantes del III par, con afectacion asociada del nervio trochlearis en uno de ellos. La instauracion fue inmediata al traumatismo en tres casos y tardia -entre doce y dos dias- en los tres restantes. Radiologicamente, en ningun caso existia fractura osea orbitaria ni de la base del craneo. Los estudios electromiograficos demostraron una lesion asocotmesica de intensidad variable en todos los casos. La recuperacion se produjo de manera variable en relacion con la intensidad de la lesion. Solo un caso no mostraba signos de mejoría clinica o electrofisiologica despues de los cinco meses de evolucion. en las lesiones de III par se presentaron signos de regeneracion aberrante.

ABSTRACT: Six out of 634 (0.94%) patients who sufferend a craneocerebral trauma without intracranial hypertension showed an oculomotor palsy. Lesion affected the VI cranial nerve in 4 cases (in 3 was bilateral) and the III nerve in the other 2, with an associated impairment of the n. troclearis in one of them. Palsy was immediate the trauma in 3 cases and with a dealy between 12 hours and 2 day in the other three. X-ray studies did not show any orbitary or base of the skull fractures. Elctromyography of the extrinsic ocular muscles showed denervatory signs in every case. Recovery relate to the intensity of the lesion, and only 1 case did not show clinicla or electromuographic signs of improvement after 6 month of trauma. The casos of the III clinical nerve impairment showed aberrant fiber regeneration.

TITULO: Estres postraumatico: Concepto y ambito de actuacion

AUTOR: Miguel-Tobal, Juan José

AFILIACION: Univ. Complutense de Madrid, España

CONGRESO: Semana Abierta de la Psicología. (3ª. 1996. Madrid, España) (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid)

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

PAGS: 1-14

AÑO: 1996

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Actas de congreso

NOTAS: No contiene resumen

TITULO: Estres postraumatico en conflictos belicos

AUTOR: Montero Guera, Jose Manuel

AFILIACION: Cuartel General Region Militar Centro, Centro Regional de Psicologia, España

CONGRESO: Semana Abierta de la Psicología. (3ª. 1996. Madrid, España) (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid)

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

PAGS: 70-119

AÑO: 1996
IDIOMA: Español
TIPO-DOCUMENTO: Actas de congreso
NOTAS: No contiene resumen

TITULO: Tratamiento cognitivo-conductual del estres postraumatico en adultos

AUTOR: Cano-Vindel, Antonio
AFILIACION: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Psicologia, Dep. Psicologia Basica (Procesos Cognitivos), España
CONGRESO: Semana Abierta de la Psicología. (3ª. 1996. Madrid, España) (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid)
PAIS-FUENTE: ESPAÑA
PAGS: 3-30
AÑO: 1996
IDIOMA: Español
TIPO-DOCUMENTO: Actas de congreso
NOTAS: No contiene resumen

TITULO: Avances en el tratamiento cognitivo-conductual del trastorno de estres postraumatico

AUTOR: Echeburúa Odriozola, Enrique \ Corral Gargallo, Paz de
AFILIACION: Universidad del Pais Vasco
REVISTA: Ansiedad y Estrés
PAIS-FUENTE: ESPAÑA
VOL-NO: Vol. 3 (2-3)
PAGS: 249-264
AÑO: 1997
IDIOMA: Español
TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO

TITULO: Desastres tecnologicos: estilo atribucional y estres postraumatico

AUTOR: Guardia, Joan \ Jarne, Adolfo \ Jesus Gutierrez de, Jose \ Gutierrez, Francisco Jose
AFILIACION: Universitat de Barcelona/Universiad de Guadalajara, Mexico
REVISTA: Anuario de Psicología
PAIS-FUENTE: ESPAÑA
VOL-NO: Vol. 29 (3)
PAGS: 45-58
AÑO: 1998
IDIOMA: Español
TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO
FRASE-CLAVE: Desastres tecnologicos

TITULO: El daño psicologico en la psicologia forense

AUTOR: Blay, Pablo A.
REVISTA: Investigaciones en Psicología: Revista del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología
PAIS-FUENTE: ARGENTINA
VOL-NO: Vol. 2 (1)
PAGS: 41-52
AÑO: 1997
IDIOMA: Español
TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO
FRASE-CLAVE: Psicologia forense \ Daño psiquico

TITULO: Tratamiento farmacológico, presente y futuro para el paciente con trastorno por estrés postraumático

AUTOR: Friedman, Matthew J.

REVISTA: RET. Revista de Toxicomanías

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (18)

PAGS: 5-14

AÑO: 1999

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Articulo de revista

RESUMEN: Existen muchos retos para escribir un artículo sobre la farmacoterapia del trastorno por estrés postraumático (PTSD). El problema más obvio es que la literatura publicada sobre ensayos clínicos es demasiado escasa e inconsistente para que pueda hacer recomendaciones de fiar. Segundo, lo que nosotros entendemos actualmente sobre la psicobiología del PTSD es tan complicado que es difícil predecir qué clases de fármacos pueden tener la expectativa de mejorar y qué grupo de síntomas. Tercero seleccionar el mejor fármaco implica tener en cuenta la realidad clínica que el paciente con PTSD usualmente exhibe con un espectro de diagnósticos comórbidos (por ejemplo depresión, ansiedad, trastornos de ansiedad, y dependencia o abuso de agentes químicos). A pesar de estas muchas consideraciones, los psiquiatras deben sumergirse en este mar de incertidumbres actuales y tomar las decisiones más inteligentes que puedan, sobre qué drogas o qué fármacos prescribir a sus pacientes con PTSD.

TITULO: Seguimiento de quince meses del Tratamiento de Desensibilización y Reproceso por el Movimiento de los Ojos (EMDR) en el trastorno por estrés postraumático y trauma psicológico

AUTOR: Wilson, Sandra A. \ Becker, Lee A. \ Tinker, Robert H.

AFILIACION: The Spencer - Curtis Foundation/Univ. Colorado, Estados Unidos

REVISTA: RET. Revista de Toxicomanías

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (19)

PAGS: 4-16

AÑO: 1999

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Articulo de revista

FRASE-CLAVE: Reproceso por el Movimiento de los Ojos

RESUMEN: El presente estudio consiste en un seguimiento durante 15 meses sobre los efectos de la terapia de Desensibilización y Reproceso por el Movimiento de los Ojos (EMDR) aplicada a 66 participantes, 32 de los cuales fueron diagnosticados de Trastorno por Estrés Postraumático (PTSD) con anterioridad al tratamiento. Los participantes a los que se les diagnosticó PTSD mejoraron tanto como los que no tuvieron este diagnóstico y ambos grupos mantuvieron sus progresos en los 15 meses. Durante el seguimiento de 15 meses, las tres sesiones de 90 minutos de EMDR previamente administradas (S.A. Wilson, L.A. Becker & R.H. Tinker, 1995) produjeron una reducción de un 84% en el diagnóstico de PTSD y una reducción de un 68% de los síntomas de PTSD. La medida del efecto de un tratamiento medio era de 1.59; el índice medio de cambio fiable era de 3.37. Las implicaciones del mantenimiento de los efectos del tratamiento de EMDR son discutidas.

TITULO: Psicopatología y sueño. II. Trastornos por ansiedad

AUTOR: Navarro, José Francisco \ Dávila, Guadalupe

AFILIACION: Universidad de Málaga

REVISTA: Psicología Conductual

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 6 (1)

PAGS: 103-114

AÑO: 1998

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO

FRASE-CLAVE: Sueño de ondas lentas

TITULO: Correlatos biológicos del trastorno por estrés postraumático

AUTOR: Puigcerver, Araceli

AFILIACION: Univ. Málaga, España

LIBRO: NAVARRO, José Francisco (Coord.). Bases biológicas de las psicopatologías. Madrid: Pirámide

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

PAGS: 155-167

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Libro compilado \ Capítulo de libro

RESUMEN: 1. El trastorno por estrés postraumático (PTSD) es una alteración clínica que define las secuelas neurobiológicas y psicológicas provocadas por una experiencia altamente estresante. Aunque se ha estudiado especialmente en ex combatientes de distintas guerras, también se han realizado trabajos en víctimas de diferentes tipos de eventos catastróficos. 2. El PTSD está asociado a una compleja serie de anomalías detectables en distintos sistemas biológicos. Para estudiar las anomalías neurobiológicas que acompañan al PTSD, se provocan respuestas fisiológicas en el sujeto traumatizado, haciendo que imagine o presencia escenas relacionadas con el trauma. 3. Los estudios psicofisiológicos han confirmado en el PTSD la existencia de un estado de continua hiperreactividad fisiológica automática, que se manifiesta a nivel cardiovascular (aumenta la tasa cardíaca y la presión sanguínea), electrodermal (con incrementos fásicos y tónicos en la conductancia cutánea) y electromiográfico (aumenta el tono muscular). 4. Los hallazgos neuroquímicos vinculan al PTSD con alteraciones del sistema noradrenérgico del locus coeruleus y, en general, se defiende la existencia de un estado de hiperreactividad NA en el PTSD. 5. Se han detectado también anomalías en el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal en pacientes con PTSD y estos desequilibrios neuroendocrinos se han relacionado con los trastornos en la función cognitiva y con las alteraciones en la morfología hipocampal. 6. Los estudios realizados con neuroimagen funcional han encontrado aumentos en flujo sanguíneo cerebral en estructuras límbicas y paralímbicas, estructuras relacionadas con el procesamiento del estímulo emocional y con la modulación de numerosas respuestas fisiológicas ante el estímulo traumatizante. Por último, en los estudios realizados con neuroimagen estructural se han detectado reducciones importantes en el volumen del hipocampo, una estructura cerebral muy comprometida con las funciones de la memoria y el aprendizaje.

TITULO: Long-term psychosocial consequences in first - degree relatives of people detained - disappeared or executed for political reasons in Chile. A study in Mapuce and Non-Mapuce persons

TIT-TRADUCIDO: Consecuencias psicosociales a largo plazo en familiares de personas desaparecidas o ejecutadas por razones políticas en Chile: un estudio comparando mapuches con no-mapuches

AUTOR: Pérez-Sales, Pau \ Durán-Pérez, Teresa \ Bacic Herzfeld, Roberta

AFILIACION: Univ. Católica de Temuco, Chile

DIRECCION-AUTOR: Pau Pérez-Sales. Santa Isabel, 16 - 3º B. 28012 Madrid, España.

Mailto: pauperez@chusuk.arrakis.es

REVISTA: Psicothema

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 12 (1) Supl

PAGS: 109-116

AÑO: 2000

IDIOMA: Inglés

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estudio empírico

FRASE-CLAVE: Chile

RESUMEN: Este artículo expone los resultados de un estudio caso-control sobre las consecuencias psicológicas de la detención-desaparición por motivos

políticos en personas de etnia Mapuche y No-Mapuche en la Araucanía chilena. Método. Una muestra aleatorizada de 119 familiares de detenidos desaparecidos creada a partir de un informe oficial (Informe Rettig) fue entrevistada utilizando el PSE (Psychiatric State Examination (10th edition)/CATEGO-5 System).

Se midieron el Estado Presente y la Vida antes de la aparición de los Síntomas. Resultados. Más de 20 años después de la desaparición de su familiar, un 3% de los Mapuches y un 9.7% de los no-Mapuches muestran un proceso de duelo inacabado.

Con respecto a la vida antes del diagnóstico, procesos de Duelo Patológico Depresivo y No Depresivo se daban en un 24.1 % de Mapuches y un 29.4% de no-Mapuches ($z=0.65$, $p<0.25$). Tomando en cuenta todos los diagnósticos simultáneamente, el 18.9% de los Mapuches y el 31.1% de los no-Mapuches habían tenido un trastorno afectivo vinculado a la desaparición ($z=1.5$, $p<0.06$). Aunque síntomas aislados de Trastorno de Stress Post-Traumático fueron frecuentes, el síndrome estuvo presente en sólo el 1.7% de Mapuches y el 6.5% de los no-Mapuches. Conclusiones. Después de dos décadas, las consecuencias psicológicas y psicosociales de la represión de la dictadura de Pinochet permanecen presentes. Cuando se compara estadísticamente los diagnósticos de mapuches y no mapuches emergen pocas diferencias. Estos resultados se discuten críticamente, con un especial énfasis en las implicaciones de una orientación individual-clínica frente a una orientación comunitaria psicosocial en la investigación.

ABSTRACT: We present the results of a case-control study on the psychological consequences of the politics of detention-disappearance in Mapuce and non-Mapuce persons of the Araucania region in Chile. **Methods.** A randomized sample of 119 relatives obtained from the official records of victims (Informe Rettig) were located and interviewed using the Psychiatric State Examination (10th edition) /CATEGO-5 System. Present State and Life Before Symptoms were assessed. **Results.** More than 20 years after the disappearance or execution of their relative, 3% of Mapuces and 9.7% of non-Mapuces still have uncomplete bereavement processes. With regard to the Life Before diagnosis. Pathological Depressive and Non-Depressive Bereavement process appeared in 24.1 % of Mapuces and 29.4% of non-Mapuce people ($z=0.65$, $p<0.25$). Taking all the diagnoses together, 18.9% of Mapuces and 31.1% of non-Mapuces had had an affective disorder related to the disappearance ($z=1.5$, $p<0.06$). Although isolated Post-Traumatic Stress Disorder symptoms were frequent, the complete syndrome was present in only 1.7% of Mapuces and 6.5% of non-Mapuces. **Conclusions.** After two decades, the psychological and psychosocial consequences of the repressive process remain present. When mapuces and non-mapuces are compared statistically across diagnosis, few differences arise. We discuss our results critically with special emphasis in the implications of the individual-clinical versus psychosocial-community focus in research.

TITULO: La hipnosis y los trastornos posttraumáticos

TIT-TRADUCIDO: The hypnosis and the posttraumatic disorders

AUTOR: Cardeña, Etzel \ Maldonado, José \ Galdón, María José \ Spiegel, David

AFILIACION: University of the Health Sciences, Bethesda, USA

DIRECCION-AUTOR: 4301 Jones Bridge Road, Bethesda, MD 20814 USA. ecardena@mx3.usuhs.mil

REVISTA: Anales de Psicología

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 15 (1)

PAGS: 147-155

AÑO: 1999

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Artículo \ Revisión de literatura

RESUMEN: De acuerdo con las estadísticas, casi todos nosotros experimentamos al menos un suceso traumático a lo largo de nuestra vida, pero sólo una minoría

desarrollará una condición posttraumática (por ejemplo, trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés posttraumático). El uso de la hipnosis en el tratamiento de las condiciones posttraumáticas tiene una historia larga y venerable. Sus técnicas deberían ser particularmente útiles en estos casos porque, al parecer, aumentan la eficacia de otros enfoques terapéuticos más generales y porque los pacientes posttraumáticos tienden a ser muy hipnotizables y sufrir de síntomas disociativos y otros que responden bien a las intervenciones hipnóticas. La hipnosis es particularmente adecuada para un enfoque en tres fases del tratamiento de las condiciones posttraumáticas, con técnicas como la relajación, reforzamiento del ego y procesamiento memorístico. Los teóricos y terapeutas interesados en el trauma deberían considerar un entrenamiento serio en hipnosis.

ABSTRACT: The statistics show that the majority of us will experience at least one traumatic event during our lifetime, although only a minority will develop posttraumatic conditions (e.g. acute stress disorder or posttraumatic stress disorder). Hypnosis for the treatment of posttraumatic conditions has a long and venerable history. Its techniques should be particularly useful for these conditions because they seem to augment the efficacy of general therapeutic approaches, and because posttraumatic patients tend to be highly hypnotizable and suffer from dissociative and other symptoms amenable to hypnotic interventions. Hypnosis is well suited to a three phase approach for the treatment of posttraumatic conditions, with such techniques as relaxation, ego strengthening, and memory processing. Trauma therapists and theorists should consider serious training in hypnosis.

TITULO: El síndrome postconmocional

AUTOR: Pelegrín Valero, Carmelo

AFILIACION: Hosp. Miguel Servet, Servicio de Psiquiatría, Zaragoza, España

REVISTA: Informaciones Psiquiátricas

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (158)

PAGS: 317-345

AÑO: 1999

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estado de la cuestión

FRASE-CLAVE: Síndrome postconmocional tras un traumatismo craneoencefálico

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Aproximación neurobiológica al trastorno de estrés postraumático

AUTOR: Ruiz Solís, Sebastián \ Mingote, Carlos \ Gozalo, Adolfo \ Fernández

Salas, María Jesús \ Varela, Pilar \ Gómez de la Cámara, Agustín

AFILIACION: Hosp. Universitario 12 de Octubre, Servicio de Medicina Nuclear,

Madrid, España/Hosp. Universitario 12 de Octubre, Servicio de Psiquiatría,

Madrid, España/Hosp. Universitario 12 de Octubre, Servicio de Bioquímica, Madrid, España/Hosp.

Universitario 12 de Octubre, Servicio de Inmunología, Madrid,

España/Hosp. Universitario 12 de Octubre, Unidad de Epidemiología Clínica,

Madrid, España

DIRECCION-AUTOR: S. Ruiz Solís. Hospital Universitario 12 de Octubre. Ctra. de

Andalucía. km 5,400. 28041 Madrid, España

REVISTA: Archivos de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 63 (3) Jul-Sep

PAGS: 221-240

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estudio empírico

FRASE-CLAVE: Marcadores biológicos del trastorno de estrés postraumático

empleando la tomografía computerizada por emisión de fotón único \ España

RESUMEN: Objetivo: El propósito de este estudio fue determinar la existencia de

marcadores neurobiológicos del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) empleando la SPECT cerebral y determinaciones neuroendocrinológicas e inmunológicas, estudiar la eficacia diagnóstica de estas técnicas para identificar a los pacientes que sufren este trastorno, y su aportación al diagnóstico diferencial con otras entidades psiquiátricas. Método: Hemos estudiado a 23 pacientes que cumplen criterios de TEPT según el DSM-IV y la evaluación psicométrica realizada por el Servicio de Psiquiatría, y 11 voluntarios sanos, o afectos de otros trastornos de la esfera afectiva, con acontecimientos vitales traumáticos pero que no han desarrollado un TEPT. A todos ellos se les practicaron dos SPECT cerebrales tras la inyección IV de ^{99m}Tc -HMPAO, una de ellas en condiciones basales y otra en condiciones de activación emocional mediante el recuerdo de los eventos traumáticos autobiográficos, que habrían causado el TEPT o bien otro trastorno mental diferente. Tras el procesado de las imágenes se realizó un análisis semicuantitativo del FSCr cerebral a partir de 24 regiones de interés, calculando índices de actividad relativa respecto de un área de referencia. Además se les realizaron las siguientes determinaciones analíticas: estudio inmunológico completo, función tiroidea completa, prolactina y cortisol plasmáticos, y en orina de 24 horas se estudió el ácido 5-hidroxi-indolacético (HIAA), ácido vanilmandélico (VMA), adrenalina (A), dopamina (DA) y noradrenalina

(NA). Con respecto a los parámetros bioquímicos en la metodología se detalla el análisis estadístico realizado. Resultados: Hemos observado que la media de las diferencias de FSCr entre la SPECT realizada en condiciones de activación emocional y la basal resultó ser positiva en todas las regiones estudiadas en el grupo control, y negativa en el grupo de casos excepto en el cortex visual. Hemos aplicado como prueba de significación estadística una t de Student de datos pareados, que ha demostrado que las diferencias observadas en 6 regiones del grupo de casos, así como en 4 regiones del grupo control, son estadísticamente significativas ($p < 0,05$). Así mismo se ha observado, en condiciones basales, un mayor FSCr frontal estadísticamente significativo en los pacientes con TEPT. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en hormona tiroidea T4 libre, a favor de los controles, que indica un hipotiroidismo relativo o un síndrome de T4 bajo relacionado con el estrés crónico incontrolable que caracteriza el TEPT. Así mismo se aprecia mayor TSH y HIAA en los casos respecto de los controles con un nivel de significación de 0,05. Igualmente se aprecia en los casos una moderada linfopenia respecto de los controles, con una disminución de linfocitos T citotóxicos CD8 y CD 16 (natural killer) que reflejan el estrés inmunológico con una inmunosupresión relativa con pérdida de capacidad citotóxica, si bien se trata de los resultados preliminares de un estudio en curso. Conclusiones: Los resultados anteriores indican la utilidad de la inclusión del SPECT cerebral dentro de la evaluación diagnóstica del TEPT, dado que con toda probabilidad refleja la disregulación psicobiológica que se produce en estos pacientes en respuesta a la incapacidad para una apropiada integración del trauma y su fijación en el pasado. Parece evidente el valor de la prueba para ayudar al diagnóstico diferencial con la simulación y otros trastornos mentales diferentes. El TEPT constituye un nuevo paradigma de investigación psicobiológica, al tratarse de un importante mediador patogénico en varios trastornos mentales y psicosomáticos. Al tratarse de una muestra limitada de pacientes que están en tratamiento psiquiátrico al realizarles el estudio era de esperar que los cambios bioquímicos periféricos fueran poco importantes, aunque seguimos procesando aún los datos obtenidos. ABSTRACT: Objective: The purpose of this study was to determine the existence of neurobiological markers of Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) using cerebral SPECT and neuroendocrinological and immunological analyses, to assess the diagnostic efficacy of these techniques in the identification of patients suffering from this disorder, and the value of these investigations in the differential diagnosis with other psychiatric conditions. Method: We have studied 23 patients with PTSD according to the DSM-IV criteria and to the psychometric evaluation carried out by the Psychiatry Department, and 11 healthy

volunteers or patients suffering from other affective disorders, with traumatic life events but who have not developed a PTSD. All subjects underwent two cerebral SPECT after the IV injection of ^{99m}Tc -HMPAO, one in basal conditions and the other after emotional activation using the memory of the autobiographic traumatic events which caused the PTSD or other mental disorder. After processing the images a semi-quantitative analysis was made of the rCBF (regional cerebral blood flow), using 24 areas of interest, calculating indices of relative activity with respect to a reference area. The following analyses were also carried out: full immunological study, full thyroid function tests, plasma prolactin and cortisol and a 24 hour urine analysis of: 5 hydroxy-indoleacetic acid (HIAA), vanillylmandelic acid (VMA), adrenaline (A), dopamine (DA) and noradrenaline (NA). The statistical analysis of the biochemical data is detailed in the methodology section. Results: We observed that the mean differences in the rCBF between the SPECT performed after emotional activation and the basal scan were positive in all areas studied in the control group, and negative in the case group except in the visual cortex. Student's t test for paired data was used to test for statistical significance; there were statistically significant differences ($p < 0.05$) observed between 6 areas in the cases group, and also between 4 regions in the control group. Under basal conditions, a statistically significant higher frontal rCBF was observed in the PTSD patients. Statistically significant differences were found in free T4 thyroid hormone levels, with higher levels in controls, suggesting that the uncontrollable chronic stress characteristic of PTSD is associated with a relative hypothyroidism or a low T4 syndrome. Higher TSH and HIAA levels were also found in the cases group with respect to controls, with a significance level of 0.05. A moderate lymphopenia was observed in the cases group with respect to the controls, with a decrease in cytotoxic lymphocytes CD8 and CD16 (natural killer cells), which reflects the immunological stress with relative immunosuppression and a loss of cytotoxic capacity, though it must be remembered that these are the preliminary results of an investigation which is still in progress. Conclusions: The above results indicate the utility of the inclusion of this neuroimaging technique in a protocol for the diagnostic evaluation of PTSD (Post-traumatic Stress Disorder), considering that it very probably demonstrates the psychobiological dysfunction occurring in these patients as a result of the incapacity for adequate integration of the traumatic event and its fixation in the past. It would appear to be clear that the test is of value in establishing a differential diagnosis with simulation and other different mental disorders. PTSD is a new paradigm in psychobiological investigation as it represents a significant pathogenic mediator in a number of mental and psychosomatic disturbances. Considering that this is a limited sample of patients under psychiatric treatment, we did not expect to find high levels of significance in the peripheral biochemical changes, though processing of the data is still being continued.

TITULO: Trastorno por estrés postraumático: estudio en una población de riesgo

AUTOR: Gilaberte, Inmaculada \ Baca Baldomero, Enrique

AFILIACION: Hosp. Universitario Puerta de Hierro, Servicio de Psiquiatría, Madrid, España

DIRECCION-AUTOR: E. Baca. Servicio de Psiquiatría, Clínica Puerta de Hierro. San Martín de Porres, 4. 28035 Madrid, España

REVISTA: Archivos de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 63 (3) Jul-Sep

PAGS: 259-271

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estudio empírico

FRASE-CLAVE: Trastorno de estrés postraumático en policías \ España

RESUMEN: Introducción: La población policial, dada la frecuente exposición a la

violencia que padece, puede ser considerada como grupo de riesgo para el padecimiento del trastorno por estrés postraumático. En este trabajo se investigó la incidencia y los factores de riesgo para el desarrollo del trastorno por estrés postraumático (TEPT) y la comorbilidad en la población policial de nuestro país. Material y método: Se estudiaron todos los policías que habían experimentado un suceso traumático durante el año 1990. Se utilizó una entrevista semiestructurada que contenía: datos sociodemográficos, personales y familiares, el test de personalidad de Cattell, el cuestionario de sucesos vitales de Paykel, la entrevista SCID para valorar comorbilidad y cuestionarios especiales para evaluar las características del suceso traumático y el apoyo social recibido. Se definieron tres grupos: grupo CONTROL, formado por los policías que habían sufrido un suceso estresante que no cumplía características de traumático según criterios DSM-III-R; grupo TEPT formado por aquellos policías que sufrieron un suceso traumático y desarrollaron un TEPT; los policías que habiendo sufrido un suceso traumático no desarrollaron un TEPT fueron incluidos en el grupo NO TEPT. Se realizaron análisis chi-cuadrado y t de student para comparar las características diferenciales entre los grupos y se utilizó un análisis de regresión logística para evaluar los factores de riesgo. Resultados: Durante el año 1990 un 0,066% de la policía española desarrolló un TEPT. Entre los 94 policías que sufrieron un suceso traumático 31 (32,98%) cumplió criterios DSM-III-R de TEPT. En el análisis de regresión logística, aparecieron los siguientes factores de riesgo: los sentimientos de amenaza de la vida durante el suceso (OR = 22,3), aumento de los conflictos familiares (OR = 5,6) y el cambio en las condiciones de trabajo (OR = 5,4). El apoyo social (OR = 75,8) apareció como un factor protector para esta población. El 74,2% de los afectados de TEPT presentaron al menos una patología psiquiátrica concomitante. Conclusiones: La exposición a sucesos traumáticos se sigue en casi una tercera parte de los casos del desarrollo de un TEPT en la policía. Los sentimientos de muerte durante el suceso constituyen el mayor factor de riesgo en el desarrollo de este trastorno, mientras que la presencia de un apoyo social adecuado puede actuar como un factor protector frente al TEPT. La comorbilidad de otras patologías psiquiátricas fue muy alta entre los afectados.

ABSTRACT: Introduction: The police population, given the frequency with which it is exposed to violence, may be considered an at-risk population for the development of the post-traumatic stress disorder. This study investigates the incidence and the risk factors for the development of post-traumatic stress disorder (PTSD) and the co-morbidity in the police population in this country. Material and methods: All those police personnel who had experienced a traumatic event during 1990 were studied. A semi-structured interview was used and included: socio-demographic, personal and family data, the Cattell personality test, the Paykel life events questionnaire, the SCID interview to assess co-morbidity and special questionnaires to assess the characteristics of the traumatic event and the social support received. Three groups were defined: The CONTROL group, formed by police personnel who had suffered a stressful event which did not fulfil the DSM-III-R criteria of a traumatic event; the PTSD group,

formed by those members of the police who had experienced a traumatic event and who developed a PTSD; the NO PTSD group which included all those members of the police who suffered a traumatic event but who did not develop a PTSD. The differential characteristics between the groups were analysed using the Chi-square test and Student's t test and the risk factors were assessed using logistic regression analysis. Results: During 1990, 0.066% of the Spanish police force developed a PTSD. Of the 94 members of the police who suffered a traumatic event, 31 (32.98%) fulfilled the DSM-III-R criteria of a PTSD. In the logistic regression analysis, the following risk factors were found: the feeling of a risk to life during the event (OR = 22.3), an increase in family conflicts (OR = 5.6), and a change in conditions of employment (OR = 5.4). Social support (OR = 75.8) appeared as a protective factor in this population. 74.2% of those affected by a PTSD presented at least one concomitant psychiatric pathology. Conclusions: Exposure to traumatic events is followed in almost one third of

cases by a PTSD in the police population. The feeling of a risk to life during the event was the most significant factor in the development of the disorder whilst an appropriate social support can act as a protective factor against the disorder. The co-morbidity with other psychiatric disorders was very high in the affected group.

TITULO: Tratamientos psiquiátricos de las víctimas del terrorismo

AUTOR: Sánchez González, Antonio

DIRECCION-AUTOR: A. Sánchez González. C/ Andrés Mellado, 19, 1º D. 28015 Madrid, España

REVISTA: Archivos de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 63 (3) Jul-Sep

PAGS: 297-309

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Tratamiento psiquiátrico a las víctimas de terrorismo

RESUMEN: El tratamiento psicofarmacológico de las consecuencias psicopatológicas de los atentados terroristas es un tema no abordado. En este trabajo se realiza una revisión de los artículos publicados sobre tratamiento del trastorno de estrés postraumático, se han agrupado los resultados de los estudios en función de su eficacia para tratar los diversos grupos de síntomas que integran este trastorno: experiencias intrusivas, evitación y embotamiento, aumento de activación e impulsividad; asimismo se han señalado los trabajos en los que se refiere una mejoría en la calidad o en la duración del sueño. Se postula la integración de la psicofarmacología y la psicoterapia como la mejor vía de abordar el tratamiento de las víctimas de atentados y se señalan los aspectos transferenciales y contratransferenciales que se suscitan en la utilización conjunta del tratamiento farmacológico y psicoterapéutico.

ABSTRACT: The psychopharmacological treatment of the psychological consequences of terrorist attacks is a topic which has not been addressed to date. This paper presents a revision of the articles published on the treatment of post-traumatic stress disorder; the results of these studies are grouped according to efficacy in the treatment of the different groups of symptoms which make up this disorder

(intrusive experiences, avoidance and numbing, hyperarousal and impulsivity). At the same time, those studies which report a qualitative and quantitative improvement in sleep are highlighted. The integration of psychopharmacology and psychotherapy is proposed as the best approach for the treatment of the victims of terrorist attacks, and attention is drawn to the transferential and contra-transferential aspects which arise in combined treatment using drugs and psychotherapy.

TITULO: Modelo psicopatológico y tratamiento de un caso con un trastorno de estrés postraumático

AUTOR: Graña Gómez, José Luis \ Navarro Bayón, Daniel

AFILIACION: Univ. Complutense de Madrid, España

DIRECCION-AUTOR: José Luis Graña Gómez. Dpto. de Psicología Clínica, Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid. Campus de Somosaguas, 28223 Madrid, España

REVISTA: Psicología Conductual

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 8 (2) Sep

PAGS: 329-355

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estudio de casos

FRASE-CLAVE: Tratamiento cognitivo-conductual de un caso de estrés postraumático

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Aspectos culturales del trastorno de estrés post-traumático

AUTOR: Boehnlein, J. K. \ Alarcón, R. D.

AFILIACION: Univ. Ciencias Médicas, Dep. Psiquiatría, Portland, Oregón, Estados Unidos/Univ. Emory, Escuela de Medicina, Dep. Psiquiatría y Ciencias de la Conducta, Atlanta, Georgia, Estados Unidos

REVISTA: Monografías de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (4) Jul-Sep

PAGS: 18-23

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estado de la cuestión

FRASE-CLAVE: Impacto de la cultura en aspectos de diagnóstico y tratamiento del trastorno de estrés post-traumático

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Evaluación de las propiedades psicométricas de la versión española de cinco cuestionarios para la evaluación del trastorno de estrés postraumático

TIT-TRADUCIDO: Evaluation of the psychometric properties of the Spanish version of five questionnaires for the assessment of post-traumatic stress disorders

AUTOR: Bobes García, Julio \ Calcedo-Barba, A. \ García, M. \ François, M. \ Rico-Villademoros, F. \ González, M.P. \ Bascarán Fernández, María Teresa \ Bousoño García, Manuel \ Grupo Español de Trabajo para el Estudio del Trastorno por Estrés Postraumático

AFILIACION: Univ. Oviedo, España/Univ. Complutense de Madrid, España/Hosp. Divino Vallés, Burgos, España/Hosp. Clínico, Valladolid, España/Hosp. del Aire, Madrid, España/Centro de Salud Mental de Sama de Langreo, Asturias, España/Hosp. Militar Central Gómez Ulla, Madrid, España/Hosp. 12 de Octubre, Madrid, España/Hosp. Gregorio Marañón, Madrid, España/Centro de Salud Mental El Coto, Gijón, Asturias, España/Hosp. Bellvitge, Barcelona, España

DIRECCION-AUTOR: Univ. Oviedo, Julián Clavería 6, 33006 Oviedo, España. bobes@correo.uniovi.es

REVISTA: Actas Españolas de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 28 (4) Jul-Ago

PAGS: 207-218

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estudio empírico

FRASE-CLAVE: Estudio de la validez y fiabilidad de cinco instrumentos de medida del síndrome de estrés postraumático, adaptación española

\ España \ Cuestionario para experiencias traumáticas \ Entrevista CAPS-DX \ Escala de trauma de Davidson DTS \ Escala TOP-8 \ Índice global de Duke DGRP

RESUMEN: Objetivo: evaluar las propiedades psicométricas de la versión española de los instrumentos de medida TQ, CAPS-DX, DTS, TOP-8 y DGRP para su uso en la investigación y la práctica asistencial con pacientes que padecen trastorno de estrés postraumático (TEPT). 63 pacientes diagnosticados de TEPT y 23 individuos sanos fueron reclutados y valorados. Se analizó la fiabilidad en términos de consistencia interna y test-retest (a los 15 días). La validez concurrente se analizó mediante análisis correlacionales con el número de síntomas según criterios DSM-IV y la escala CGI. La validez discriminante se evaluó comparando la puntuación obtenida en los cuestionarios de evaluación de TEPT entre pacientes y controles y entre subgrupos de pacientes según presencia de trastornos psiquiátricos concomitantes y el estado de salud en la escala CGI. Todas las subescalas de los cinco cuestionarios mostraron una adecuada

consistencia interna (alfa de Cronbach: 0,74-0,91), excepto el cuestionario TQ y los criterios B y C del cuestionario TOP-8. Además, todas mostraron adecuada fiabilidad test-retest (CCI=0,77-0,93), excepto la subescala del criterio D del cuestionario TOP-8. Los cinco cuestionarios discriminaron entre pacientes y controles y entre subgrupos de pacientes según comorbilidad y el nivel de gravedad medido mediante la escala CGI. La versión española de los cuestionarios TQ, CAPS-DX, DTS, TOP-8 y DGRP ha mostrado poseer adecuada fiabilidad y validez en la evaluación de pacientes con TEPT, aunque la entrevista CAPS-DX parece ser más adecuada para ayuda diagnóstica y el cuestionario DTS para la evaluación en la práctica asistencial habitual.

ABSTRACT: Aim: to determine the psychometric properties of the Spanish versions of the following scales for assessing PTSD patients: TQ, CAPS-DX, DTS, TOP-8, and DGRP. Data from 63 PTSD patients and 23 healthy subjects were analysed. Internal consistency and test-retest reliability (after 15 days) were calculated.

Convergent validity was analysed by correlating subjects' scores with the number of symptoms (DSM-IV) and scores on the CGI scale. Discriminative capability was analysed by comparing TQ, CAPS-DX, DTS, TOP-8, and DGRP patients' scores with scores from healthy subjects, and between patients' subgroups according to the presence or absence of psychiatric comorbidity and to the degree of severity as determined by the CGI-S. CAPS-DX, DTS, TOP-8, and DGRP showed an adequate internal consistency (Cronbach alpha: 0.74-0.91) and all of them obtained ICC between 0.77 and 0.93. The five questionnaires were able to discriminate between patients and healthy subjects, and between the patients' subgroups. The Spanish versions of the TQ, CAPS-DX, DTS, TOP-8, and DGRP have shown adequate reliability and validity for assessing PTSD patients in daily clinical practice. CAP-DX seems to be more adequate a diagnostic and DTS a severity rating scale.

TITULO: Valoración daño psíquico

AUTOR: Albarrán Olivera, Jorge

AFILIACION: Comunidad de Madrid, Defensor del Menor, España

DIRECCION-AUTOR: Avda. Constitución 10, Cobeña, Madrid, España. nines2@correo.cop.es

CONGRESO: Congreso Hispano-Alemán de Psicología Jurídica (1º. 2000. Pamplona, España) (Colegio Oficial de Psicólogos, COP)

LIBRO: I Congreso Hispano-Alemán de Psicología Jurídica = I Spanisch-Deutscher Kongress Für Rechts-Psychologie. Pamplona: Colegio Oficial de Psicólogos, 2000

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (3)

PAGS: 83-99

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Actas de Congreso \ Comunicación

FRASE-CLAVE: Peritaje judicial de la psicopatología, daño psíquico o simulación

RESUMEN: La primera parte del trabajo hace referencia al estudio de alteraciones psíquicas que determinan la existencia en el sujeto de un daño psíquico, para desarrollar las diferentes formas de valorar el daño psíquico en los trastornos que afectan el nivel intelectual del sujeto a través de los diferentes métodos para determinar el deterioro, en los trastornos mentales secundarios a los traumatismos craneoencefálicos (TCE), en los cambios de personalidad del sujeto, en los síndromes depresivos en el medio laboral y en los trastornos de estrés postraumático (T.E.P.). En la segunda parte se analiza la simulación en sus diferentes aspectos: neurosis de renta, neurosis de finalidad, neurosis funcional o neurosis de deseo, como aquellos cuadros que presentan los sujetos con la intención de fingir una alteración psíquica, unos síntomas de esta naturaleza, o un síndrome de carácter psíquico con el propósito consciente de obtener una ganancia claramente reconocible, incluyendo en algunos casos una compensación económica, o en otros, la evitación de un trabajo desagradable, que

el sujeto venía desarrollando. Por último se pasa a hacer el estudio de los pasos a seguir por el facultativo-perito judicial para la valoración de la simulación y su descubrimiento.

TITULO: La actuación del psicólogo en el procedimiento laboral. Valoración de secuelas psíquicas, por accidentes o enfermedad, que tienen repercusiones en los juzgados de lo Social:La incapacidad. Análisis de dos casos prácticos

AUTOR: Portillo Zaragoza, María Jesús

DIRECCION-AUTOR: C/ Fray Luis Amigó 2, 50006 Zaragoza, España. Psicol._jurídica@navegalia.com

CONGRESO: Congreso Hispano-Alemán de Psicología Jurídica (1º. 2000. Pamplona, España) (Colegio Oficial de Psicólogos, COP)

LIBRO: I Congreso Hispano-Alemán de Psicología Jurídica = I Spanisch-Deutscher Kongress Für Rechts-Psychologie. Pamplona: Colegio Oficial de Psicólogos, 2000

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (3)

PAGS: 107-117

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Actas de Congreso \ Comunicación

FRASE-CLAVE: Valoración de las secuelas psicológicas producidas por un accidente laboral en procesos laborales, España \ España

RESUMEN: Cada vez son más las periciales psicológicas, en los juzgados de lo social, que tienen como objeto el estudio de secuelas psíquicas en víctimas de accidentes y/o la repercusión psicológica de algunas enfermedades en el ámbito socio-laboral. En este trabajo, partimos de una revisión del marco jurídico y de los conceptos relacionados, nos adentramos en lo que supone la valoración del daño psíquico en el ámbito laboral y los problemas que se plantean (simulación, ética, dificultades en el procedimiento, falta de recursos, etc.), acabando por proponer una metodología que ha resultado válida en la práctica. Se analizan dos casos reales que obtuvieron la incapacidad a partir del informe psicológico: uno debido a accidente laboral y otro a enfermedad común.

ABSTRACT: Every time, there are many more psychological expert opinions at the labour courts, to study psychological sequels while are suffered by accident victims and for how some illnesses show psychological repercussions on labour ambit. In this research, our main concern is the juridical field. We have studied the psychical damagels valuation at labour ambit, and its underlying problems (pretenders, professional ethics, proceedings difficulties, lack of resources,...), ending up with a proper methodology. A couple of true cases have been analyzed. Botle of them were found unfitted for working due to psychological reports; the first one, as a consequence of a labour accident, and the second one as a result of a non labour illness.

TITULO: Un nuevo procedimiento terapéutico: la desensibilización por movimientos oculares y reprocesamiento

AUTOR: Serrano Pintado, Isabel \ Gómez Gazol, María Esperanza

AFILIACION: Univ. Salamanca, España

DIRECCION-AUTOR: Isabel Serrano Pintado. Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca. Avda. de la Merced, 109-131, 37005 Salamanca. Mailto:serrano@gugu.usal.es

REVISTA: Ansiedad y Estrés

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 6 (1)

PAGS: 105-116

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estudio de resultados del tratamiento

FRASE-CLAVE: Desensibilización por movimientos oculares y reprocesamiento en el tratamiento del trastornop de estrés post-traumático

RESUMEN: Desde su inclusión en 1980 en el DSM III, el desorden por estrés post-traumático (PTSD) ha ido cobrando un creciente interés, proliferando multitud de estudios sobre su etiología y tratamiento. Con las primeras técnicas surgieron los primeros problemas. Un nuevo procedimiento, la desensibilización por movimientos oculares y reprocesamiento (EMDR), empieza a perfilarse como la solución a tales dificultades. Sin embargo, al entusiasmo inicial suscitado por el mismo, le han seguido varios interrogantes que vuelven a oscurecer el panorama. En el trabajo que presentamos, en primer lugar describimos el procedimiento EMDR. En segundo lugar, presentamos algunas de las consideraciones que, hasta hoy, se han planteado sobre el mismo.

ABSTRACT: Since 1980, when the posttraumatic stress disorder was first included in the DSM-III, it generated a growing interest and lots of studies proliferated about its ethiology and treatment. With the first procedures arose the first problems. A new procedure, the eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) seemed to be the solution to such troubles. But the initial enthusiasm was followed by several new questions which darkened again the picture. In this study, the EMDR procedure is first described. Then some considerations proposed up to date, about EMDR are presented.

TITULO: Avances en la evaluación y tratamiento del trastorno de estrés postraumático

AUTOR: Bousoño García, Manuel \ Calcedo Barba, Alfredo Luis \ González García-Portilla, María Paz \ McCann, Una \ Bobes García, Julio \ Pérez, M. J.

REVISTA: Anales de Psiquiatría

CONGRESO: Congreso Nacional de Psiquiatría (5º. 2000. Zaragoza, España)

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 16 (Supl. 1) Dic

PAGS: 41-46

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Mesa redonda

FRASE-CLAVE: Evaluación y tratamiento del síndrome de estrés post-traumático

NOTAS: No contiene resumen

E-TEXTO: SI

URL: http://www.arancongresos.com/ARAN/images/archivos/ART_I_1606_C_1.PDF

TITULO: Marcadores biológicos de las neurosis

AUTOR: Masana, G. \ Gastó Ferrer, Cristóbal

AFILIACION: Hosp. Clínico Univ., Barcelona, España

REVISTA: Aula Médica Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (1)

PAGS: 34-56

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Revisión de las bases orgánicas de diferentes tipos de trastornos incluidos en el espectro de las neurosis, marcadores biológicos

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Factores asociados al desarrollo del trastorno por estrés post-traumático

TIT-TRADUCIDO: Factors associated to the development of Posttraumatic Stress Disorder

AUTOR: Coronas Borri, R. \ Santos López, J. M. \ Escoté Llobet, S. \ García Parés, Gemma

AFILIACION: Coporació Parc Taulí, Servicio de Psiquiatría y Salud Mental, Sabadell, Barcelona, España

DIRECCION-AUTOR: Gemma García Parés. Servicio de Psiquiatría, Corporació Sanitaria Parc Taulí, s/n. 08208 Sabadell, Barcelona, España

REVISTA: Actas Españolas de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 29 (1) Ene-Feb

PAGS: 10-12

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estudio empírico

FRASE-CLAVE: Factores asociados al desarrollo del trastorno por estrés

post-traumático tras un accidente de tráfico \ España

RESUMEN: Introducción: Los accidentes de tráfico son un factor de riesgo de complicaciones psiquiátricas graves en los supervivientes. Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo sobre una población de 2. 885 personas que padecieron un accidente de automóvil en la ciudad de Sabadell (España) en 1998. De éstos, seleccionamos una muestra de cincuenta personas que habían desarrollado un Trastorno por Estrés Post Traumático (TEPT) y un grupo control del mismo número de personas. Resultados: Registramos las diferencias clínicas y demográficas que influían en el desarrollo del TEPT y encontramos que el sexo femenino y los antecedentes psiquiátricos previos estaban fuertemente relacionados con la aparición y el curso del TEPT.

ABSTRACT: Introduction: Motor vehicle accidents appear to increase the risk of severe psychiatric morbidity in survivors. Material and methods: We have studied retrospectively a population of 2, 885 people who suffered an automobile accident in the city of Sabadell (Spain) in 1998. From these, we randomly selected a sample of fifty people who had developed PTSD, and a control group including the same amount of people. Results: We reviewed the clinical and demographic differences in both samples and we found out that female gender and previous psychiatric morbidity are strongly related to the onset and course of PTSD.

E-TEXTO: SI

URL: <http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.fulltext?piden=10022113>

TITULO: Estrés postraumático: hacia una integración de aspectos psicológicos y neurobiológicos

TIT-TRADUCIDO: Towards a psychological and neurobiological integration

AUTOR: Miguel-Tobal, Juan José \ González Ordi, Héctor \ López Ortega, Eduardo

AFILIACION: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Psicología, Dep. Psicología Básica II (Procesos Cognitivos), España

DIRECCION-AUTOR: jjmtobal@correo.cop.es

REVISTA: Ansiedad y Estrés

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 6 (2-3)

PAGS: 255-280

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Revisión de factores psicológicos y neurobiológicos implicados en la génesis y mantenimiento del trastorno postraumático

RESUMEN: En el presente trabajo se presenta una revisión de los aspectos psicológicos y neurobiológicos asociados al desarrollo y mantenimiento del estrés postraumático (TEP). Se revisan los principales factores facilitadores de la aparición del TEP, los aspectos cognitivos y psicofisiológicos así como las estructuras y sistemas neurobiológicos implicados en su desarrollo y mantenimiento, y los principales modelos teóricos tanto desde una perspectiva estrictamente psicológica como desde una perspectiva neurobiológica. Por último,

se destaca la importancia de los modelos integradores que permitan el análisis conjunto de los datos procedentes de la investigación actual.

ABSTRACT: The present paper presents a review of the psychological and neurobiological aspects associated to the development and maintenance of Post-traumatic Stress Disorder (PTSD). Main facilitating factors of the onset of PTSD, cognitive and psychophysiological aspects, and neurobiological structures and systems involved in the development and maintenance of PTSD are also reviewed. Main theoretical models both from psychological and neurobiological perspectives are also taken into account. Finally, it is highlighted the importance of integrative models which allow the joint analysis of data provided by current research.

TITULO: Tratamiento del estrés postraumático en ex combatientes

AUTOR: Alburquerque, Afonso de

AFILIACION: Hosp. Julio de Matos, Lisboa, Portugal

LIBRO: ECHEBURÚA, Enrique [Ed.]. Avances en el tratamiento psicológico de los trastornos de ansiedad. Madrid: Pirámide

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

PAGS: 171-187

AÑO: 1998

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Libro compilado \ Capítulo de libro

CLASIFICACION: 2323 Neurosis y trastornos de ansiedad

DESCRIPTORES: Síndrome post-traumático \ Guerra \ Diagnóstico \ Sintomatología \ Tratamiento

FRASE-CLAVE: Evaluación y tratamiento del síndrome post-traumático en ex-combatientes

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Quando a guerra parece nao ter fim: uma intervenção psicoterapêutica em perturbação stress pós-traumático de guerra

TIT-TRADUCIDO: Cuando la guerra parece no tener fin: una intervención psicoterapéutica en trastorno de estrés postraumático de guerra

AUTOR: Fernandes, Eugénia \ Maia, Ângela

AFILIACION: Universidade do Minho, Inst. Educaçao e Psicologia, Portugal

DIRECCION-AUTOR: Campus de Gualtar 4719 Braga, Portugal. eugeniaf@iep.uminho.pt

REVISTA: Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud =

International Journal of Clinical and Health Psychology

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 1 (2) May

PAGS: 379-387

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Artículo

FRASE-CLAVE: Síntomas del trastorno de estrés postraumático en veteranos de guerra, modelo de intervención psicoterapéutica

RESUMEN: Para muchos veteranos de guerra ésta nunca acaba; imágenes, pesadillas, sensaciones corporales inexplicables mantienen la vivencia de un malestar incontrolable y muchas veces casi insoportable. Más allá de esta revivencia continua, las sensaciones de embotamiento emocional, dificultades de concentración, inestabilidad y dificultad de control de los impulsos hacen difícil la vida personal, familiar y social. Se trata de una respuesta normal en personas que viven momentos de una enorme activación fisiológica y emocional, asociados a experiencias de extremo malestar, muchas veces amenazantes para la propia vida, como la situación de guerra, denominándose trastorno de estrés postraumático. En este artículo se abordan los objetivos y las fases de un modelo de intervención psicoterapéutica en sujetos con estrés postraumático de guerra.

ABSTRACT: For many war veterans, the war never ends. Images, nightmares, and

unexplainable corporal sensations maintain the existence of an almost uncontrollable and sometimes unbearable discomfort. Besides this continuous re-enactment, the emotional numbing sensations, the concentration difficulties, and the instability and difficulty in impulse control make alternative family, personal, and social life formation very difficult. This is a normal reaction in people that experience episodes of great physiological and emotional arousal associated to extreme discomfort experiences, and often life threatening, as is the case of war situations. This reaction is denominated as the Post Traumatic Stress Disorder. In this article we will approach the aims and the phases of a psychotherapeutic intervention model with subjects diagnosed as presenting Post Traumatic Stress Disorder of War.

TITULO: Reflexiones acerca de las neurosis de guerra y sus vinculaciones a la teoría de la pulsión de muerte. Sobre un chico de las Malvinas

TIT-TRADUCIDO: Reflections on the war neuroses and their relation to the theory of the death drive. About a boy who fought in the Malvinas Islands

AUTOR: Navarro, Juan

DIRECCION-AUTOR: Avda. Santa Fe 1886, 12º D, 1123 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

REVISTA: Revista de Psicoanálisis (Buenos Aires)

PAIS-FUENTE: ARGENTINA

VOL-NO: Vol. 57 (3-4) Jul-Dic

PAGS: 559-573

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Informe clínico de casos

FRASE-CLAVE: Abordaje psicoanalítico de las neurosis traumáticas a través de un caso de neurosis de guerra con sueños traumáticos, Argentina \ Argentina

RESUMEN: Este trabajo presenta una síntesis del material clínico de un paciente enfermo de neurosis traumática típica, tal como la describe clásicamente Freud. Se trata de un ex combatiente de la guerra de las Malvinas, cuya sintomatología a su regreso inhibió totalmente su vida, al punto de transformarse en un peligro para sí y para los demás. El autor se ocupa de subrayar la evolución de sus sueños traumáticos, que jalonan el curso del tratamiento, porque a través de ellos pueden seguirse las distintas situaciones patológicas y de conflicto en la forma en que fueron elaborándose hasta su resolución. Aborda, como centro del trabajo, y a propósito de dichos sueños, el fenómeno de repetición que, a la manera del juego del carretel, reconducen una y otra vez al momento del trauma; sueños traumáticos que sirven de fundamento clínico al estudio de la compulsión a la repetición y que indicarían tendencias ubicadas más allá del principio de placer. A partir de la experiencia clínica y la elaboración teórica propone que el fenómeno repetitivo de los sueños de las neurosis traumáticas son motivados por tendencias restitutivas del yo, es decir, atribuibles a las pulsiones de autoconservación, en el registro de Eros. Finalmente, el autor dedica la última parte del trabajo a exponer sus puntos de vista sobre la teoría de la pulsión de muerte.

ABSTRACT: This paper presents a summary of the clinical material of a patient who suffered a typical traumatic neurosis, as Freud classically described it. He is a veteran of the Malvinas war, whose symptomatology totally inhibited his life when he returned, to the point of becoming dangerous for himself and for others. The author emphasizes the evolution of his traumatic dreams, which mark the course of his treatment, since they make it possible to follow the different pathological and conflictive situations and the way they were gradually worked through to their resolution. The author centers his paper on the phenomenon of repetition which, like the Fort-Da game, leads back once and again to the moment of the trauma; traumatic dreams that provide a clinical foundation for the study of the repetition compulsion, and which indicate tendencies beyond the pleasure principle. On the basis of clinical experience and theoretical elaboration, the author proposes that the repetitive phenomena of the dreams of traumatic neuroses are motivated by restitutive tendencies of the ego, i.e., attributable

to the drives of self-conservation in the order of Eros. The final part of the paper sets forth the author's views on the theory of the death drive.

TITULO: Tratamiento del trastorno por estrés postraumático mediante la desensibilización por movimientos oculares

TIT-TRADUCIDO: Posttraumatic stress disorder treatment using eye movement desensitization

AUTOR: Tirapu Ustárrroz, Javier \ Alcaiza, C. \ Arrondo, A. \ Górriz, F. \ Hernández, R. \ Lapeña, P. \ Lorea, I.

AFILIACION: Fundación Argibide, Clínica Ubarmin, Pamplona, Navarra, España/Col. Oficial de Psicólogos de Navarra, Grupo de trabajo de Neuropsicología y Psicología Clínica, España

DIRECCION-AUTOR: C/ Iturrama 7, 31007 Pamplona, Navarra, España

REVISTA: Psiquis

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 22 (2)

PAGS: 28-36

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Revisión de datos sobre la eficacia de la desensibilización por movimientos oculares en casos de estrés postraumático

RESUMEN: El Trastorno por Estrés Postraumático hace referencia a una constelación de síntomas que aparecen tras la exposición a un evento estresante y que se encuentra fuera del rango de las experiencias humanas habituales. Para tratarlo se han propuesto diferentes técnicas: exposición, inundación, desensibilización, inoculación de estrés... En este artículo se expone una nueva técnica cognitivo-conductual la Desensibilización por Movimientos Oculares (DMO) que se caracteriza por su fácil aplicación y rápidos resultados. Se revisa el procedimiento, sus posibles mecanismos de acción y los estudios realizados sobre su eficacia.

ABSTRACT: Abstract

Posttraumatic Stress Disorder is characterised by intrusive symptoms, evitative behaviours and a high level of activation. This disorder appears after de person is exposed to a traumatic event. Several techniques have been used to deal with this disorder such as exposition, flooding, desensitisation and other techniques to treat anxiety. In this paper a new cognitive-behavioural technique is proposed Eye Movement Desensitization is characterised by easy application and fast results. Procedure, possible mechanisms of action and studies about its efficiency are revised.

TITULO: Trastornos por estrés postraumático

AUTOR: Hidalgo, M. I.

AFILIACION: Clínica Puerta de Hierro, Madrid, España

REVISTA: Monografías de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 13 (3) Jul-Ago

PAGS: 1-2

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Editorial

FRASE-CLAVE: Aspectos nosológicos y etiopatogénicos del trastorno de estrés postraumático

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Concepto y epidemiología del trastorno por estrés postraumático

AUTOR: Pérez-Íñigo Gancedo, J. L.

AFILIACION: Hosp. Militar Central Gómez Ulla, Serv. Psiquiatría, Madrid, España

REVISTA: Monografías de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 13 (3) Jul-Ago

PAGS: 3-12

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Concepto, incidencia y factores de riesgo del trastorno de estrés postraumático asociado a diferentes situaciones traumáticas

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Etiopatogenia del trastorno por estrés postraumático

AUTOR: Sánchez Cubas, S. \ Montoto Navarro, R.

AFILIACION: Hosp. Gral. Móstoles, Madrid, España/Centro de Salud Mental, Móstoles, Madrid, España

REVISTA: Monografías de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 13 (3) Jul-Ago

PAGS: 13-16

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Factores biológicos y psicosociales implicados en el trastorno de estrés postraumático.

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Clínica y diagnóstico del trastorno por estrés postraumático

AUTOR: Medina Amor, J. L.

AFILIACION: Hosp. Militar Central Gómez Ulla, Serv. Psiquiatría, Madrid, España

REVISTA: Monografías de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 13 (3) Jul-Ago

PAGS: 17-25

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

CLASIFICACION: 2323 Neurosis y trastornos de ansiedad

DESCRIPTORES: Síndrome post-traumático \ Etiología \ Sintomatología \ Trauma emocional \ Psicodiagnóstico \ Diagnóstico diferencial

FRASE-CLAVE: Cuadro clínico del trastorno de estrés postraumático, formas clínicas y criterios diagnósticos

NOTAS: No existe resumen

TITULO: El TEP y su estudio médico-legal

AUTOR: Gómez-Trigo Ochoa, J.

AFILIACION: Hosp. Militar Gómez Ulla, Serv. Psiquiatría, Madrid, España

REVISTA: Monografías de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 13 (3) Jul-Ago

PAGS: 26-29

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: El informe pericial en los casos de trastorno de estrés postraumático, diagnóstico y consideraciones médico-legales

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Factores pronósticos y evolución del trastorno por estrés postraumático

AUTOR: Salvador Robert, M.

AFILIACION: Hosp. Móstoles, Madrid, España

REVISTA: Monografías de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 13 (3) Jul-Ago

PAGS: 30-33

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Factores predictores del trastorno de estrés postraumático, curso del trastorno

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Tratamiento psicofarmacológico del trastorno por estrés postraumático

AUTOR: Hidalgo, M. I.

AFILIACION: Clínica Puerta de Hierro, Madrid, España

REVISTA: Monografías de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 13 (3) Jul-Ago

PAGS: 34-41

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Revisión de la eficacia de distintos psicofármacos en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Tratamiento psicológico del trastorno de estrés postraumático

AUTOR: Robles Sánchez, José Ignacio

AFILIACION: Hosp. Militar Central Gómez Ulla, Serv. Psiquiatría, Madrid, España

REVISTA: Monografías de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 13 (3) Jul-Ago

PAGS: 42-47

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Tratamientos psicológicos cognitivo-conductuales y de grupo para el trastorno de estrés postraumático

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Salud mental en situaciones de desastres. Nuevos desafíos

AUTOR: Benyakar, M.

AFILIACION: Univ. Tel-Aviv, Israel

REVISTA: Monografías de Psiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 13 (3) Jul-Ago

PAGS: 48-60

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Diferentes variables de la problemática de la salud mental en desastres y catástrofes combinando la visión de varias escuelas

RESUMEN: El presente trabajo aborda las diferentes variables de la problemática de la salud mental en desastres y catástrofes, combinando la visión de la escuela francesa, la americana y la israelí... La experiencia personal en la labor asistencial durante cinco guerras en Israel y la intervención en las

consecuencias psíquicas de atentados terroristas y desastres naturales en Israel y Argentina, me llevan a postular la profunda patogenicidad que puede tener un desastre en el psiquismo del damnificado en el caso que el abordaje y enfrentamiento con el mismo sea desvirtuado. Junto a ello una adecuada confrontación con la situación, podrá permitir a la población desarrollar sus propios recursos para que lo disruptivo de la situación no se transforme en un fenómeno patológico para el psiquismo. La problemática de la salud mental en desastres es que la cantidad de profesionales entrenados en el tema nunca es proporcional a las necesidades presentadas, ya que por cada lesionado físico por lo menos son tres que requieren de una asistencia (no tratamiento) en el área de la salud mental, el damnificado físico y dos o más familiares allegados... Sumado a la asistencia general de la población de damnificados y familiares, se encuentran los grupos de ayuda, las instituciones a cargo del salvamento, los organismos políticos que establecen los medios materiales y económico para enfrentar la situación. Prepararse para enfrentar lo desconocido es una de las múltiples paradojas abordables que nos supone el enfrentamiento a situaciones de desastres. Es de suma importancia el desarrollo de programas de salud mental con profesionales altamente capacitados en el tema, con una gran flexibilidad en su acción, con capacidad de innovar ante las situaciones, pero con un sólido fundamento basado en las diferentes experiencias del pasado... Se expone en el trabajo que los programas de salud mental deben estar dirigidos por lo que he llamado liderazgo funcional, y se deben realizar intervenciones por presencia a diferencia de las intervenciones por demanda. Hay que tener conciencia de que se está tratando no con enfermos sino con personas sanas que, de forma repentina, se enfrentan con una situación altamente patógena. Se necesita experiencia clínica, sensibilidad ante las personas y un buen entrenamiento profesional debido a que las patologías emergentes en estos casos son silenciosas... El abordaje asistencial en este tipo de situaciones es múltiple, incluye el individual, familiar, grupal, del medio ambiente, e institucional. Por ello, los profesionales deben conocer los diferentes abordajes, sin pretender transformar a los mismos en los encuadres terapéuticos tradicionales, pero sí tomando de los mismos sus principales componentes terapéuticos. Los avances en el campo de la neuropsiquiatría respecto a las transformaciones plásticas del hipocampo y la amígdala, conducirán a un abordaje más preciso acerca de las reacciones biológicas ante situaciones disruptivas, y así adecuar los tratamientos psicoterapéuticos y farmacológicos en forma más precisa. Existen formas de evitar que el damnificado permanezca ligado al dolor incommunicable que luego tendrá sus expresiones somáticas, o conductas inadaptadas, para transformarlo en sufrimiento comunicable y, de esta forma, poder abordarlo y que sea superado. Esta es una de las metas que tenemos los profesionales de la salud mental para tratar de que el mundo no perdure en su crueldad disruptiva, enajenando crónicamente al damnificado.

TITULO: Tratamientos psicológicos eficaces para el estrés post-traumático

TIT-TRADUCIDO: Efficacious psychological treatments for post-traumatic stress disorder

AUTOR: Báguena Puigcerver, María José

AFILIACION: Univ. Valencia, Fac. Psicología, España

DIRECCION-AUTOR: maria.j.baguena@uv.es

REVISTA: Psicothema

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 13 (3) Ago

PAGS: 479-492

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático, revisión de los tratamientos más eficaces

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es el de ofrecer una revisión de los tratamientos psicológicos y farmacológicos que la investigación ha probado como

más eficaces en el tratamiento del trastorno por estrés posttraumático (TEPT). Por lo que se refiere a los tratamientos psicológicos, los estudios más rigurosos se han llevado a cabo en el contexto de los acercamientos conductual-cognitivos. La evidencia empírica sugiere un mayor respaldo para la exposición prolongada (EP). También la reestructuración cognitiva y las técnicas para el manejo de la ansiedad dan lugar a efectos positivos a la hora de aliviar la sintomatología post-traumática. La investigación más reciente se dirige a la creación de programas de tratamiento que integran los distintos componentes mencionados. También, se anota la posible eficacia de la hipnoterapia. Por otra parte, se han utilizado diferentes tipos de fármacos para el tratamiento del TEPT. A pesar de los efectos beneficiosos que producen algunos de ellos para aliviar los diferentes síntomas, con frecuencia se han registrado efectos colaterales para casi todos ellos.

ABSTRACT: The aim of this paper is to offer a review of the psychological and pharmacological treatments that the research has shown as more effective to treat the post-traumatic stress disorder (PTSD). Regarding the psychological treatments, the most rigorous studies have been carried out in the context of the cognitive-behavioral approaches. The empiric evidence suggests a bigger efficacy for the prolonged exposure (PE). The cognitive restructuring and the anxiety management training produces positive effects to alleviate the posttraumatic symptomatology too. More recent studies are dedicate to design treatment programs which integrate the several mentioned components. Also, it is noted the possible effectiveness of the hypnotherapy. On the other hand, different types of drugs have been used for the PTSD treatment. In spite of the beneficial effects that some drugs produce to alleviate the different symptoms, frequently have been registered collateral effects for nearly all of them.

TITULO: Propiedades psicométricas de la versión española de la Escala Revisada de Impacto del Estresor (EIE-R)

TIT-TRADUCIDO: Psychometric properties of the Spanish version of the impact of event scale revised (EIE-R)

AUTOR: Báguena Puigcerver, María José \ Villarroya, Edelia \ Beleña, Ángeles \ Díaz, Amelia \ Roldán, Consuelo \ Reig, Rodrigo

AFILIACION: Univ. Valencia, Fac. Psicología, Dep. Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, España

REVISTA: Análisis y Modificación de Conducta

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 27 (114)

PAGS: 581-604

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estudio empírico

FRASE-CLAVE: Diagnóstico del trastorno por estrés posttraumático, validación de una escala de evaluación de situaciones estresantes, España \ España (Valencia) \ Escala Revisada de Impacto del Estresor, EIE-R

RESUMEN: El objetivo del presente artículo es explorar las propiedades psicométricas de la versión española de la Escala Revisada de Impacto del Estresor (EIE-R) presentada por Weiss y Marmar (1997). En el estudio ha participado una muestra compuesta por 1078 adultos jóvenes (749 varones y 329 mujeres) sin experiencias traumáticas. El análisis factorial (componentes principales con rotación varimax) dio lugar a la emergencia de dos factores que explicaron cerca del 59% de la varianza: intrusión/hiperactivación y evitación. La escala muestra una consistencia interna (α de Cronbach) adecuada. Los datos relativos a estabilidad temporal (coeficientes test-retest) son más discutibles. La EIE-R correlaciona positivamente con otros constructos indicadores de psicopatología, siendo los coeficientes más altos en el caso de las mujeres. En el trabajo se presta atención al tema de las diferencias relacionadas con el género en sintomatología post-traumática.

ABSTRACT: The purpose of this paper was to evaluate the psychometric properties

of the Spanish version of the Impact of Event Scale Revised (IES-R) by Weiss y Marmar (1997). In the study has participated a sample consisting of 1078 young adults (749 men and 329 women) without traumatic experiences. The factorial analysis (principal components with varimax rotation) yielded two factors that account for 59% of the total variance: intrusion/hyperactivation and avoidance. The internal consistency (Cronbach's alpha) of the IES-R is acceptable. The data about test-retest reliability are more debatable. The IES-R keep positive correlations with other constructs related with psychopathology, being the coefficients higher to the women. Moreover this paper pay attention to the issue of the gender differences in post-traumatic symptomatology.

TITULO: Psicopatología y tratamiento del trastorno por estrés postraumático

AUTOR: Hernández, Laura

AFILIACION: Univ. Nacional Autónoma de México, México

LIBRO: CABALLO Vicente E. y SIMÓN Miguel Ángel (Dirs.) Manual de psicología clínica infantil y del adolescente: trastornos generales. Madrid: Pirámide

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

PAGS: 121-136

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Libro compilado \ Capítulo de libro \ Capítulo de libro

FRASE-CLAVE: Evaluación y tratamiento conductual del trastorno por estrés postraumático

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Trastorno por estrés postraumático: una revisión del tema (Primera parte)

TIT-TRADUCIDO: Post-traumatic stress disorder: a review (part one)

AUTOR: Palacios, Lino \ Heinze, Gerardo

AFILIACION: Inst. Nal. Psiquiatría Ramón de la Fuente, México

DIRECCION-AUTOR: mailto:palacioslino@hotmail.com

REVISTA: Salud Mental

PAIS-FUENTE: MÉXICO

VOL-NO: Vol. 25 (3) Jun

PAGS: 19-26

AÑO: 2002

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Revisión de la epidemiología de los trastornos por estrés postraumático, comorbilidad psiquiátrica

RESUMEN: A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido un contacto muy estrecho con una diversidad de sucesos traumáticos. Aunque en las sociedades más modernas se ha desarrollado una convivencia más aceptable, los hechos traumáticos en la vida diaria de cualquier individuo son cada vez más frecuentes, pues problemas

habituales en las sociedades en desarrollo, como los bajos ingresos per cápita, condicionan conductas como robo con arma de fuego, secuestros u homicidios; asimismo, la desintegración familiar puede ser un factor para la violencia intrafamiliar, el tráfico y el consumo de sustancias ilícitas, o bien fenómenos climáticos como El Niño pueden dar origen a una mayor frecuencia de catástrofes naturales, como inundaciones por huracanes o tornados. En la 4ta Reunión del Grupo de Consenso Internacional sobre Depresión y Ansiedad, llevada a cabo

en Montecatini, Italia, en abril de 1999, el trastorno por estrés postraumático (TPEP) fue el tema principal debido a su alta prevalencia, impacto social y carga financiera sobre la sociedad, por lo que representa un gran problema de salud pública para países tanto en vías de desarrollo como desarrollados. Desde hace tres décadas se comenzaron a trazar las directrices biológicas del trastorno, y a desarrollarse nuevos y efectivos tratamientos. Los

estudios epidemiológicos nos permiten estimar los índices de los trastornos específicos y su efecto en la comunidad y el sistema de salud. La prevalencia que indica la exposición a sucesos traumáticos en sí es una parte importante del estudio del TPEP. Recientes estudios epidemiológicos demuestran que aproximadamente de 40 a 90% de las muestras comunitarias de adultos se han expuesto a un hecho traumático. Los índices de prevalencia en la vida del TPEP varían 5 a 15% en países del primer mundo. Cuatro a seis por ciento de la población actualmente manifiesta síntomas de TPEP, con base sólo en el peor acontecimiento traumático. El trastorno por estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que ha cobrado fuerza en las áreas de la investigación y del ámbito clínico en las últimas dos décadas por varias razones, una de las cuales es que los niveles de violencia han aumentado en el mundo de manera dramática, y otra, es que se ha reconocido su subdiagnóstico en varias poblaciones en el mundo. No todo aquel que se expone a un suceso traumático desarrolla el TPEP. Existen varios factores de riesgo que incrementan la posibilidad de su presentación y cronicidad, como experimentar el evento en etapas tempranas, que se padezcan múltiples hechos traumáticos, su severidad, el género de quien lo experimenta, una historia personal de estrés y de problemas conductuales o psicológicos, psicopatología comórbida, factores genéticos, historia familiar de psicopatología, historia de TPEP en los padres o una exposición subsecuente a sucesos medioambientales reactivantes. Por otro lado, los factores de riesgo se clasifican de acuerdo con la persona y el hecho traumático experimentado. Por ejemplo, en diferentes estudios se publica que las mujeres corren un riesgo más alto que los hombres de desarrollar un TPEP, a pesar de exponerse con menos frecuencia a las experiencias traumáticas. El grado de desarrollo psicobiológico es importante al momento de presentarse un suceso traumático, pues se ha comprobado que la edad es un factor significativo para el desarrollo del TPEP, las experiencias traumáticas en la infancia se asocian con un mayor riesgo de presentación del trastorno y con síntomas más severos. El curso clínico del TPEP es con frecuencia crónico; solamente 50% de los pacientes se recupera dentro de los dos primeros años posteriores al incidente. Muchos de quienes no se recuperan aún tendrán síntomas 15 años después. La situación en los países menos desarrollados es de particular interés, pues, debido a que los sucesos traumáticos que ahí se padecen son con frecuencia guerras prolongadas, hambre, represión política y violencia sectaria, pareciera que el TPEP sobre el curso de la vida es más crónico y el perfil de los síntomas más complejo e incapacitante que en los países desarrollados. El TPEP tiene un efecto importante en las diferentes esferas del ser humano, que se demuestra por ejemplo en los grandes costos sociales. En general, los individuos con este trastorno tienen ingresos menores, altos índices de falla escolar y más problemas interpersonales comparados con la población general. Además, la edad de inicio del trastorno mental tiene un valor predictivo sobre los logros en los ámbitos educativo, demográfico, marital y económico. Investigaciones en la población general en Estados Unidos estiman que 38% de las personas con TPEP está en tratamiento en un año determinado. La razón que más se reportó para no recibir tratamiento en el 62% restante fue que estas personas no pensaban que tuvieran un problema. Después de muchos años, la reacción traumática con frecuencia se adapta y se convierte en parte del estilo de afrontamiento del individuo. Las personas en riesgo de un TPEP con frecuencia asisten tempranamente al sistema médico, mas no al área psiquiátrica. Por último, existe menos estigmatización respecto del TPEP en comparación con otros trastornos psiquiátricos, pues se considera que los síntomas son consecuencia natural de un suceso traumático severo. Parece que la presencia de otros trastornos psiquiátricos en individuos con TPEP es la regla más que la excepción. Estudios en poblaciones clínicas y general reportan que aproximadamente de 50 a 90% de los individuos con TPEP crónico tienen trastornos psiquiátricos comórbidos. El TPEP se asocia con frecuencia con otros trastornos psiquiátricos comórbidos, como trastorno depresivo mayor (TDM), trastorno de angustia (TA), fobia social (FS), trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por uso de sustancias, principalmente alcohol (TUS), trastornos de personalidad (p. ej., limítrofe, evitativo, antisocial, etc.) y trastornos disociativos. En

resumen, parece evidente la importancia del trastorno por estrés postraumático por varios aspectos. En apariencia, el TPEP es más común de lo que se pensaba. La prevalencia en la vida para el TPEP en la población general es de alrededor de 8 a 9% y son las mujeres quienes corren un riesgo más elevado para desarrollar el TPEP. El TPEP también es más frecuente después de ciertos tipos de hechos traumáticos (p. ej. violación) sin considerar el género de los sobrevivientes. Esta es la primera parte de dos en total de que constará esta revisión. En este artículo veremos aspectos generales, desde la introducción de este trastorno en la clasificación estadounidense, así como su definición, epidemiología, curso clínico, efecto en el funcionamiento en general del individuo y su comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos.

ABSTRACT: Since early history, human beings have been closely exposed to several types of traumatic events. Although modern societies have developed a more acceptable kind of convivence, these traumatic events have become increasingly present in the everyday life of any individual in underdeveloped societies. This is due to extended problems, like a lower income per capita, which gives rise to such conducts as violent robbery, kidnapping, or murder. Similarly, family desintegration is a likely factor leading to the development of interfamily violence, and illegal substances traffic and abuse; even weather phenomena

(e.g., El Niño) may trigger a higher incidence of PTSD given the suffering brought about by hurricanes or tornados. At the Fourth Consensus Group International Meeting on Depression and Anxiety, held in Montecatini, Italy, in April 1999, PTSD was regarded as the main issue, because of its high prevalence, social impact, and financial burden on society. For these reasons, it represents an enormous public health problem in both underdeveloped and developed countries. During the last three decades, biological guidelines for PTSD have been studied and proposed, together with the development of new effective treatments. Epidemiological studies allow us to calculate the rates of specific disorders and their impact on the community and health system. The prevalence of the exposure to traumatic events themselves is an important part of PTSD study. Recent epidemiological studies have shown that about 40 to 90% individuals from adult community samples have been exposed to a traumatic event. Prevalence life rates of PTSD vary from 5 to 15% in developed countries. Nowadays, 4 to 6% of the population presents PTSD symptoms, considering only the worst traumatic event. In the last two decades, PTSD is an anxiety disorder which has called the attention in research and clinical areas due to several reasons. One of these is that the rates of violence have had a dramatic increase all over the world; another one is the identification of their subdiagnosis in several places. However, not everyone who has been exposed to a traumatic event develops PTSD. Several risk factors increase the possibility of its expression and chronicity -for instance, to experience the event at early life stages, multiple traumatic events, their severity, gender experiencing the event, personal stress and behavior, or psychological problems history, comorbid psychopathology, parents' PTSD history, or subsequent exposure to reactivant environmental events. Likewise, risk factors can be classified according to, the person involved and the traumatic event experienced. In this sense, different studies have shown women have a higher risk than men to develop PTSD, in spite of men having an increased exposure to traumatic events. The psycho-biological development level is important when a traumatic event appears, since it has been demonstrated that age is a significative factor to develop PTSD: traumatic events in childhood have been associated with a higher risk of PTSD and more severe symptoms. The clinical course of PTSD is often chronic, with only 50% of the patients recovering within two years after the incident. Most of those unable to recover will still show symptoms 15 years later. The situation in underdeveloped countries is particularly interesting, since traumatic events frequently associated with long wars, hunger, politic oppression, and sectary violence seem to make PTSD more chronic and the profile of its symptoms more complex and disabling than in developed countries. PTSD has a relevant impact on different areas of life, as is revealed for instance in its enormous social costs.

Generally, individuals who suffer PTSD earn a lower income, present high scholar failure rates, and more interpersonal problems compared to the overall population. In addition, the age of onset of the mental disorders has a predictive value over educational, birth, marriage, and economic accomplishments.

A research conducted among the overall American population estimated that 38% of the individuals with PTSD received some form of treatment during a given year.

The reason more commonly reported by the remaining 62% to refuse getting medical attention was that they did not think they had any problem at all. Often,

the traumatic reaction adapts over several years and becomes part of the individual's coping style. People at risk of PTSD commonly ask for medical help early, but do not do so in the psychiatric area. Finally, PTSD brings about less stigmatization compared to another psychiatric disorders, because their symptoms are considered as natural consequences of a severe traumatic event. Apparently, the presence of psychiatric disorders other than PTSD is the rule rather than the exception. According to clinical and general populations studies, between 50-90% of PTSD patients show comorbid psychiatric disorders. PTSD is frequently associated with comorbid psychiatric disorders, such as High Depressive Disorder (HDD),

Anguish Disorder (AD), Social Phobia (SP), Generalized Anxiety Disorder. Substance Use Disorder -mostly alcohol- (SUD), Personality Disorders (PD) (e.g., borderline, avoidance, antisocial), and Dissociative Disorders. In brief, the relevance of PTSD study becomes clear due to several aspects. Apparently, PTSD is more common than it is thought so. The life prevalence of PTSD among the general population is about 8 to 9%, and women have a higher risk to develop PTSD. Also, PTSD is more frequent after certain kinds of traumatic events (e.g., rape), not considering in this case the survivor's gender. This discussion is divided in two parts. In this first article we will analyze some general aspects like the introduction of this disorder in the American classification, together with its definition, epidemiology, clinic course, effect on the individual's general functioning, and comorbidity with different psychiatric disorders.

TITULO: Tratamiento de los trastornos de ansiedad

AUTOR: Bobes García, Julio \ Saiz Martínez, Pilar Alejandra \ González García-Portilla, María Paz \ Bousoño García, Manuel

AFILIACION: Univ. Oviedo, Dep. Medicina, Área de Psiquiatría, Asturias, España

LIBRO: CERVILLA BALLESTEROS, Jorge A. Valoración y tratamiento del enfermo mental. Madrid: Arán

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

PAGS: 213-227

AÑO: 2002

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Libro compilado \ Capítulo de libro

FRASE-CLAVE: Manejo de los principales cuadros de ansiedad, indicaciones de tratamiento farmacológico y psicoterapia

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Los sueños y el peso de los recuerdos

AUTOR: Cyrulnik, Boris

REVISTA: Mundo Científico

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (227)

PAGS: 82-83

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Artículo

FRASE-CLAVE: Sueños, imágenes mentales, emociones y recuerdo tras un suceso traumático

NOTAS: No existe resumen

TITULO: Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos

TIT-TRADUCIDO: Assessment of psychological harm in violent crime-victims

AUTOR: Echeburúa Odriozola, Enrique \ Corral Gargallo, Paz de \ Amor Andrés, Pedro Javier

AFILIACION: Univ. País Vasco, Fac. Psicología, Dep. Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, San Sebastián, España

DIRECCION-AUTOR: Avda. Tolosa 70, 20018 San Sebastián, España. mailto: ptpodece@ss.ehu.es

REVISTA: Psicothema

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 14, Supl.

PAGS: 139-146

AÑO: 2002

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Artículo

FRASE-CLAVE: Victimología, lesiones psíquicas y secuelas emocionales de los delitos violentos, vulnerabilidad psicológica, evaluación

RESUMEN: En este artículo se hace un estudio sobre las implicaciones clínicas y forenses del daño psicológico en víctimas de delitos violentos. La muestra constó de 330 víctimas afectadas por traumas psicológicos diversos (agresión sexual, violencia familiar o terrorismo). El 54.5% de todos los sujetos padecían el trastorno de estrés postraumático, que se daba con más frecuencia en las víctimas de agresión sexual y de terrorismo que en las de violencia familiar. Con la Escala de Gravedad de Síntomas (Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997a), específica para este cuadro clínico, se precisó la gravedad y el perfil psicopatológico de cada subgrupo de víctimas. Por último, se comentan las implicaciones de este estudio para la práctica clínica y forense y para las investigaciones futuras.

ABSTRACT: The aim of this paper was to review the current knowledge about the psychological harm in crime-victims, as well as to study it in a clinical sample. The

sample consisted of 330 patients affected by psychological traumas (rape, domestic violence and terrorism). Among them, the 54.5% were diagnosed of PTSD, most of all those affected by rape and terrorism. The Severity of Symptom Scale for PTSD (Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta and Sarasua, 1997a) was used to determine the severity and the psychopathological profile of PTSD in each group of victims. Finally, implications of this study for clinical and forensic practice and for future research in this field are commented upon.

TITULO: Prevalencia y tipos de trastorno por estrés postraumático en población general y psiquiátrica

TIT-TRADUCIDO: Prevalence and types of PTSD in a psychiatric and general spanish population sample

AUTOR: Orengo García, Francisco \ Rodríguez, M. \ Lahera, G. \ Ramírez, G.

DIRECCION-AUTOR: Dr. F. Orengo-García. Avda. de los Claveles, 31-2º D. E-28220 Majadahonda (Madrid). mailto:francisco.orengo@eresmas.net

REVISTA: Psiquis

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 22 (4)

PAGS: 5-12

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estudio longitudinal

FRASE-CLAVE: Se examinan dos muestras de población, general y psiquiátrica para

ver la prevalencia del trastorno por estrés postraumático en pacientes ingresados por otras patologías \ España (Madrid) \ MMSE (Mini Mental State Examination) \ BPRS (Breve Escala de Evaluación Psiquiátrica) \ CAPS-DX (Clinician Administered PTSD Scales-Diagnostica)

RESUMEN: Este estudio descriptivo transversal se realizó para investigar la prevalencia y tipología de trastorno por estrés postraumático (TEPT) en un grupo de 177 pacientes ingresados de manera consecutiva a lo largo de un año en el servicio de psiquiatría del hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Los resultados fueron comparados a su vez con los obtenidos en la evaluación del mismo trastorno en otro grupo representativo control de 90 personas extraídas de población general. Se empleó la escala CAPS-DX como instrumento de detección y diagnóstico del trastorno por estrés postraumático y la escala BPRS y el cuestionario MMSE como instrumentos de selección muestral y evaluación psicopatológica. Se obtuvo una prevalencia global del 8,47% de TEPT en la población psiquiátrica y un 2,22% en la población general. Ninguno de los casos había sido previamente diagnosticado ni constaba como diagnóstico de ingreso. El trabajo demuestra la necesidad de aumentar la sensibilidad y práctica diagnóstica del TEPT con el fin de poner en marcha programas de tratamiento especializados.

ABSTRACT: This descriptive transversal study was performed in order to investigate the prevalence and types of post traumatic stress disorder (PTSD) in 177 consecutive psychiatric patients in an inpatient setting in a general hospital (Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, Spain). The prevalence of the disorder was compared with a control sample of 90 sane volunteers from the general population. We used the Clinician Administered Posttraumatic Scales (CAPS) to diagnose the disorder and the MMSE and BPRS as instruments of screening and psychopathological evaluation. We obtain a total prevalence of 8,47% of PTSD in the psychiatric group and a 2,22% prevalence in the general population. None of the cases had been previously diagnosed or adequately consigned at the entrance evaluation. This study reflects the necessity of improvement of the diagnostic practice and sensibility for PTSD in order to provide specific treatment programs adequately.

TITULO: Desensibilización por movimiento de ojos y reprocesamiento: una década después

TIT-TRADUCIDO: Eye movement desensitization and reprocessing: a decade later

AUTOR: Ortigosa Quiles, Juan Manuel \ Quiles Sebastián, María José \ Méndez Carrillo, Francisco Xavier

AFILIACION: Univ. Nal. de Educación a Distancia (UNED), Centro Asociado de Elche, España/Univ. Murcia, España

DIRECCION-AUTOR: Dr. J. M. Ortigosa Quiles. C/ Santa Ana, 9-3^a. E-03201 Elche (Alicante)

REVISTA: Psiquis

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 23 (1)

PAGS: 39-47

AÑO: 2002

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Revisión de literatura

FRASE-CLAVE: Revisión de la producción científica acerca del método de la Desensibilización por movimiento de ojos y reprocesamiento

RESUMEN: Diez años después de que Francine Shapiro publicase su primer artículo sobre el método de desensibilización por movimiento de ojos y reprocesamiento (DMOR), el interés por su aplicación terapéutica, fundamento teórico y mecanismos fisiológicos implicados ha ido en aumento. El presente artículo realiza un análisis bibliométrico de la producción científica sobre este método al cumplirse una década desde su presentación a la comunidad científica. Los principales resultados indican que el año más productivo es 1996, el país que más ha publicado sobre el tema es Estados Unidos y la autora con mayor número de

referencias bibliográficas es Francine Shapiro. Por otra parte, la patología en la que más se ha aplicado la DMOR es el trastorno por estrés post-traumático

ABSTRACT: Ten years after Francine Shapiro edited her first article about Eye Movement Desensitization and Reprocessing method (EMDR), interest in the therapeutic application, theoretical basis and involved physiological mechanisms has increased. The present article carries out a bibliometric analysis on the scientific production about this method a decade after its presentation to the scientific community. The main results indicate that the most productive year is 1996, United States is the country that has published most with regard the subject and the author with the greater number of bibliographical references is Francine Shapiro. On the other hand, posttraumatic stress disorder is the pathology in which EMDR has been principally applied.

TITULO: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR LA REPRESION POLITICA: PROPUESTA DE UN MODELO DE ATENCION DE SALUD INTEGRAL

AUTOR: CASTILLO, MARIA ISABEL \ GOMEZ, ELENA

AFILIACION: INST. LATINOAMERICANO DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS (ILAS)

CONGRESO: Congreso Interamericano de Psicología. (25^a. 1995. San Juan, Puerto Rico) (Sociedad Interamericana de Psicología)P. 123

AÑO: 1995

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Resumen \ Actas de congreso

TITULO: TRAUMA Y PSICODINAMISMOS EN VICTIMAS DE LA TORTURA

AUTOR: NEUMAN, ELISA

AFILIACION: FUND. AYUDA SOCIAL DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS

CONGRESO: Congreso Interamericano de Psicología. (25^a. 1995. San Juan, Puerto Rico) (Sociedad Interamericana de Psicología)377

AÑO: 1995

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Resumen \ Actas de congreso

TITULO: PSICOLOGIA DEL TERRORISMO LA PERSONALIDAD DEL TERRORISTA Y LA PATOLOGIA DE SUS VICTIMAS

ALONSO-FERNANDEZ, FRANCISCO EDITORIAL MASSON-SALVAT

MEDICINA, MADRID, 1994

AUTOR: CALCEDO ORDOÑEZ, ALFREDO

REVISTA: Psicopatología15, 2, 84

AÑO: 1995

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Reseña bibliografica \ Revista