

Subfamilia Acanthodrilinae

Lombrices de tierra.


Algunas de agua dulce.

Excepcionalmente se encuentran en playas o en el litoral.

Subfamilia Acanthodrilinae

Forma del cuerpo (en sección transversal):


- Generalmente, de forma cilíndrica.



Subfamilia Acanthodrilinae

Poros dorsales:


- Generalmente, presentes. Una hilera en la línea medio – dorsal del cuerpo; un único poro en cada surco intersegmentario.



Subfamilia Acanthodrilinae

Clitelo:


- En forma de silla de montar o anular.
- Con una extensión de 6 a 7 segmentos.
- Situado entre los segmentos 12 y 18.



Subfamilia Acanthodrilinae

Tubérculos pubertarios:


- Ausentes.
- Con frecuencia presentan marcas genitales o poroforos.



Subfamilia Acanthodrilinae

Poros masculinos:


- Normalmente con un par en el segmento 18.
- Intraclitelaes o en el borde posterior del clitelo.



Subfamilia Acanthodrilinae

Poros prostáticos:

- Normalmente pareados:
 - Un par en el segmento 17 y otro en el segmento 19.
 - Un par en el segmento 17.
 - Un par en el segmento 19.
- Excepcionalmente se localizan por detrás del segmento 19.



Subfamilia Acanthodrilinae

Molleja:

- Generalmente con 1 a 3 mollejas (esofágicas o premollejas) situadas al comienzo del esófago.
- Ocasionalmente son vestigiales o ausentes.
- Carecen de mollejas intestinales (postmollejas).



Subfamilia Acanthodrilinae

Glándulas calcíferas:

- Se presentan con mucha frecuencia.

Subfamilia Acanthodrilinae

Próstatas:

- Presentes.
- Con estructura tubular.
- De origen ectodérmico.
- Con un canal central.
- Uno o dos pares en los segmentos 17, 19 ó 17 y 19.



Subfamilia Acanthodrilinae

Espermatecas:


- Presentes o ausentes.
- Pareadas.
- Sin divertículos.
- Intraparietales o invadiendo la cavidad celómica.



Subfamilia Acanthodrilinae

Nefridios:


- De tipo **holonefridio**.



Subfamilia Acanthodrilinae

Setas:

- Disposición lumbricina: cuatro pares por segmento.
- A veces con 5 ó 6 pares.
- Excepcionalmente con disposición periquetiana: numerosas setas por segmento.



Subfamilia Acanthodrilinae

Circulatorio:

- Generalmente presentan vaso supraesofágico.
- Último par de corazones laterales por detrás del segmento 11.

