

Familia Biwadrilidae

Lombrices de agua dulce.

Familia Biwadrilidae

Forma del cuerpo (en sección transversal):

- Cilíndrico.
- “Swollen” lateralmente en la región de los poros masculinos

Línea lateral:

- Presente.
- Entre las hileras de setas *b* y *c*.

Familia Biwadrilidae

Poros dorsales:

- Ausentes.

Familia Biwadrilidae

Clitelo:

- Anular.
- Muy largo.
- Desde el segmentos (14) 15 al 31 (34).

Familia Biwadrilidae

Tubérculos pubertarios:

- Ausentes.

Familia Biwadrilidae

Poros masculinos:

- Situados sobre poroforos cuadrangulares.
- En el segmento 13.

Familia Biwadrilidae

Poros de las espermatecas:

- Ausentes.

Espermatoforos:

- Presentes.
- De forma cónica a “thecal”.
- Se presentan en pares cerca de los poros masculinos; principalmente en la parte dorsal y dorso lateral de la pared del cuerpo.

Familia Biwadrilidae

Molleja:

- Ausentes.

Familia Biwadrilidae

Glándulas calcíferas:

- Ausentes.

Familia Biwadrilidae

Próstatas:

- Presentes.
- De forma lobular.
- En el segmento 13.

Glándulas setales:

- Pareadas.
- De forma cilíndrica.
- Descargan a través de las setas genitales, ventrales a los conductos prostáticos.

Familia Biwadrilidae

Espermatecas:

- Ausentes.

Familia Biwadrilidae

Sistema circulatorio:

- Vaso supraesofágico presente.
- Vaso subneural ausente.

Familia Biwadrilidae

Nefridios:

- De tipo **holonefridio (meganefridios)**.