

Familia Lumbricidae

Forma del cuerpo (en sección transversal):


- Generalmente, de forma cilíndrica.
- A veces con la parte posterior aplanada dorso ventralmente.
- Excepcionalmente, cuadrangular, octogonal o trapezoidal.



Familia Lumbricidae

Poros dorsales:

- Generalmente, presentes. Una hilera en la línea medio – dorsal del cuerpo; un único poro en cada surco intersegmentario.
- En la subfamilia Diporodrilinae, un par de poros en cada surco intersegmentario, dorso-laterales.



Familia Lumbricidae

Clitelo:


- En forma de silla de montar.
- Con una extensión de 4 a 32 segmentos.
- Situado entre los segmentos 17 y 52.



Familia Lumbricidae

Tubérculos pubertarios:

- Presentes.
- En forma de banda o en forma de papilas.



Familia Lumbricidae

Poros masculinos:

- Preclitelaes.
- Un par en el segmento 15.
- Excepcionalmente en los segmentos 18 ó 19.



Familia Lumbricidae

Poros de las espermatecas:

- De 2 a 8 pares.
- Situados entre los surcos intersegmentarios 5/6 a 19/20.
- Localizados entre la línea de setas *a* y la línea medio – dorsal del cuerpo.
- Lo más frecuente es que presenten dos pares, en los surcos intersegmentarios 9/10 y 10/11, a la altura de la línea de setas *cd*.

Familia Lumbricidae

Molleja:

- Presente por detrás del esófago (molleja intestinal o postmolleja).
- Ocupa uno o dos segmentos de extensión.
- Situada en los segmentos 17 y 20.

Buche:

- Situado por delante de la molleja.
- Ocupa uno o dos segmentos de extensión.
- Situado en los segmentos 15 y 17.



Familia Lumbricidae

Glándulas calcíferas:

- Intramurales.
- Localizadas en algunos o en todos los segmentos 9, 10 – 15.



Familia Lumbricidae

Próstatas:

- Ausentes.

Familia Lumbricidae

Espermatecas:

- Presentes o ausentes.
- Pareadas.
- Sin divertículos.
- Intraparietales o invadiendo la cavidad celómica.

Familia Lumbricidae

Nefridios:

- De tipo **holonefridio**.

