

Curso de Taxonomía de Oligoquetos Anatomía interna.

Ana G. Moreno, Catalina de Mischis y Ernestina Teisaire. © 2002.

Sistema Nefridial:

Típicamente existen un par de **nefridios** por cada segmento dispuestos de forma **intercalar**, es decir, el nefrostoma se sitúa en el segmento anterior y el resto del nefridio en el segmento posterior.



En algunas especies los nefridios se modifican en la parte anterior del cuerpo, aumentan de tamaño y forman un conjunto de numerosas asas.

Abiertos: Cuando poseen nefrostoma.

Cerrados: Cuando no tienen nefrostoma.

Exonefridios: Cuando desembocan en el exterior del cuerpo a través de los poros nefridiales (nefridioporos).

Enteronefridios: Cuando desembocan en el tubo digestivo.



Curso de Taxonomía de Oligoquetos Anatomía interna.

Ana G. Moreno, Catalina de Mischis y Ernestina Teisaire. © 2002.

Holonefridios (meganefridios): Un par por segmento.

Vesiculados: Cuando presentan vesícula

Avesiculados: Cuando no presentan vesícula

También se mira si presentan uno o varios nefrostomas (**plectonefridios**), en este último caso hay que anotar el número de nefrostomas



Ana G. Moreno ©

Meronefridios (micronefridios): Más de un par por segmento, de dos a centenas de pares.

Meganefridios: Cuando son mucho mayores que los otros (**Micromeronefridios**)

Hay que anotar:

Tipo de nefridio

Número de meronefridios


Estructura de los nefridios

forma general del nefridio y de la vejiga

Número y estructura de los nefrostomas

Posición del primer nefridio

Modificaciones de los nefridios



Ana G. Moreno ©