

## RAYA SANTIAGUESA

### Nombres comunes o comerciales

**Castellano:** raya santiaguesa. **Andalucía:** raya santiaguesa, san Pedro, raya vera. **Asturias:** escayuda. **Baleares:** rajada vestida. **Cataluña:** rajada vestida. **País Vasco:** arraia.

**Alemán:** kuckucksroche.

**Francés:** raie fleurie.

**Griego:** piva.

**Inglés:** cuckoo ray.

**Italiano:** razza cucolo.

**Portugués:** raia de dois olhos.

### Código FAO

RJN.

### Nombre científico

*Leucoraja naevus* (Müller & Henle, 1841).

### Sinonimias

*Raja naevus*, *Raja circularis*, *Raja quadrimaculata*.

### Clasificación

Phylum Chordata  
Superclase Gnathostomata  
Clase Chondrichthyes  
Subclase Elasmobranchii  
División Neoselachii  
Subdivisión Batoidea (=hypotremata)  
Orden Rajiformes  
Familia Rajidae

### Descripción

Cuerpo aplanado dorsoventralmente, con las aletas pectorales soldadas a la cabeza y al tronco formando un disco más o menos romboidal. Cabeza con hocico y rostro corto y poco puntiagudo; ángulo rostral obtuso. Ojos y espiráculos situados dorsalmente, los últimos inmediatamente detrás de los ojos. Boca en posición ventral. Dientes pequeños, juntos y agudos. Con cinco hendiduras branquiales situadas en posición ventral. Los laterales del disco (aletas escapulares o pectorales) son

redondeados. Con aletas pelvianas. Pedúnculo caudal largo, más o menos en forma de látigo. Con dos aletas dorsales pequeñas situadas al final de pedúnculo caudal. Aleta caudal reducida. Sin aleta anal. Numerosos dentículos en la piel, algunos transformados en escudos o agujones. Los escudos se sitúan sobre todo cerca del hocico, en la zona medio dorsal y en las proximidades de los laterales de las aletas pectorales. Existen además dos filas de agujones en la parte dorsal del pedúnculo caudal (no existe fila medio dorsal). Coloración del dorso grisáceo, pardo o amarillenta. Presenta dos ocelos muy patentes en el dorso, oscuros, de contorno irregular, con manchas amarillentas. Vientre blanquecino. Tamaño máximo 71 cm, comúnmente 40 cm.

Puede confundirse con la raya de espejo (*Raja miraletus*) y con la raya manchada (*Raja polystigma*).

### **Biología**

Demersal, marino. Se alimenta de todo tipo de animales bentónicos. La reproducción es ovípara. Los huevos están protegidos por una cápsula córnea más o menos rectangular que depositan en la arena o en el fango siendo las puestas de hasta 100 huevos.

### **Distribución**

Atlántico oriental: desde Kattegat, parte norte del Mar del Norte, Irlanda, Gran Bretaña, hasta Senegal. También en el Mediterráneo occidental hasta Túnez y oeste de Grecia; rara en el Mediterráneo oriental.

**Rango de profundidad:** 20-500 m.

### **Principales formas de consumo**

Fresco o congelado. Normalmente despiezado.

**Denominación nutricional** (azul: >5% en grasas; blanco: < 5% en grasas)

¿?

### **Formas de pesca**

Palangre, arrastre y enmalle.

### **Categoría lista roja -IUCN (Estado de conservación)**

Preocupación menor (LC).