

OBSERVACIONES DE AVES RARAS EN ESPAÑA, 2001

Eduardo DE JUANA*
y el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología

RESUMEN.—*Observaciones de aves raras en España, año 2001.* Informe número 18 del Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología. Presenta 260 nuevos registros, correspondientes a 108 especies, con un porcentaje de aceptación del 84,2 %. Entre los de mayor interés cabe destacar una observación de Guión Africano *Crex egregia* en la isla de Tenerife (Canarias), que es primera de la especie en el Paleártico Occidental, y una de Ibis Eremita *Geronticus eremita* en las Marismas del Guadalquivir, año 1958, única en Europa. También se presentan los primeros registros en España de Serreta Capuchona *Lophodytes cucullatus* (en Canarias, de origen desconocido), Chorlitejo Pecuario *Charadrius pecuarius* (en la Península), Correlimos Acuminado *Calidris acuminata* (Península) y Añapero Yanqui *Chordeiles minor* (Canarias), así como las segundas o terceras citas españolas homologadas de Zampullín Picogrueso *Podilymbus podiceps*, Eider Real *Somateria spectabilis*, Pigargo Europeo *Haliaeetus albicilla* (Islas Baleares), Polluela Sora *Porzana carolina*, Arao Aliblanco *Cephus grylle*, Bisbita de Hodgson *Anthus hodgsoni*, Curruca Sahariana *Sylvia nana* (Canarias), Corneja Cenicienta *Corvus (corone) cornix* y Escribano Carirrojo *Emberiza bruniceps* (de origen desconocido). Y para las Islas Canarias, las primeras citas homologadas de Pagaza Piquirroja *Sterna caspia* y Curruca Mirlona *Sylvia hortensis*. Finalmente, destacan también seis citas de Corredor Sahariano *Cursorius cursor*, que incluyen los primeros casos de nidificación conocidos en Europa.

SUMMARY.—*Report on rare birds in Spain in 2001.* This is the 18th annual report of the Spanish Ornithological Society's Rarities Committee. It considers 260 new records, relating to 108 species, with an acceptance rate of 84.2 %. Highlights include a record of African Crane *Crex egregia* in Tenerife island (Canaries), first for the Western Palearctic, and a capture of Bald Ibis *Geronticus eremita* in the Marismas del Guadalquivir, year 1958, unique in Europe. Here included there are also the first Spanish records of Hooded Merganser *Lophodytes cucullatus* (in the Canaries, of unknown origin), Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius* (Peninsular Spain), Sharp-tailed Sandpiper *Calidris acuminata* (Peninsular Spain) and Common Nighthawk *Chordeiles minor* (Canaries), as well as the second or third Spanish records of Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps*, King Eider *Somateria spectabilis*, White-tailed Eagle *Haliaeetus albicilla* (Islas Baleares), Sora Crane *Porzana carolina*, Black Guillemot *Cephus grylle*, Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*, Desert Warbler *Sylvia nana* (Canaries), Hooded Crow *Corvus (corone) cornix* and Red-headed Bunting *Emberiza bruniceps* (origin unknown). For the Canary Islands there are the first records of Caspian Tern *Sterna caspia* and Orphean Warbler *Sylvia hortensis*. Finally, also noteworthy are the six records of Cream-coloured Courser *Cursorius cursor*, which include the first breeding cases known so far in Europe.

INTRODUCCIÓN

El informe de este año 2001, que hace el número 18, reúne 260 citas nuevas, correspondientes a 108 especies. Como es habitual, repite además otras ya publicadas en el informe previo, porque afectan tanto al 2000 como al 2001. La cifra de nuevas citas supone un segundo puesto tras el 2000, que llegó a 327 citas, número que fue excepcional porque, como quizás se recuerde, en ese año hicimos un esfuerzo muy especial a la hora de desatascar registros pendientes (entre otras cosas, revisamos casi 50 registros de Garceta Dimorfa *Egretta gularis*). Pero, en la

comparación con años más habituales, la cifra del 2001 queda a bastante distancia de las 181 citas de 1999 o las 163 de 1998. Poco a poco se incrementa, afortunadamente, la cantidad y calidad de la información que recibimos en el Comité de Rarezas, lo que desde luego tiene que ver con el notable aumento en la afición a observar aves que es evidente en nuestro país en los últimos tiempos, pero también, probablemente, con las mejoras en los equipos de óptica y fotografía, y con las facilidades actuales para recibir y transmitir información vía internet. Un gran porcentaje de los registros de aves raras los recibimos ahora por correo electrónico,

* Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología, 9.^a planta. Universidad Complutense de Madrid. C/. José Antonio Novais, 2. E-28040 Madrid, España. e-mail: edejuaana@bio.ucm.es

acompañados con frecuencia de fotografías digitales, que permiten una evaluación mucho más cómoda y rápida siempre que, por supuesto, concurren las debidas garantías sobre la procedencia de los documentos gráficos y la ausencia de manipulación en ellos. En el interés de adaptar nuestra labor a esta nueva situación, de cara sobre todo a incrementar la eficacia a la hora de recibir citas y a la de tramitarlas con prontitud, el Comité de Rarezas está estudiando diversas posibilidades, liderado aquí por uno de sus miembros más entusiastas, Ricard Gutiérrez. Para empezar, el Comité cuenta ya con una página web dentro de la de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), cuya dirección es www.seo.org, y tanto aquí como en la página personal de Ricard Gutiérrez (www.rarebirds-pain.net) es posible encontrar información sobre la labor del Comité, consultar informes anteriores, ver la lista de especies sometidas a homologación y descargar fichas para documentar y enviar con más facilidad las observaciones de aves raras.

Animamos a nuestros colaboradores a utilizar también estos medios. Además de, por supuesto, a seguir enviándonos sus registros. Nuestras cifras van siendo importantes, pero aún quedan a cierta distancia de las habituales en otros países europeos (por ejemplo, los 260 registros de este informe vienen a ser, aproximadamente, la mitad de los que se aparecen en el informe de este mismo año en Francia y la cuarta parte de los del informe del Reino Unido). Si queremos documentar de la forma mejor y más fiable posible las llegadas a nuestro país de aves accidentales (y de migrantes habituales pero con cifras extremadamente bajas) es necesario que crezca aún más el porcentaje de observaciones que se documentan y que se someten a homologación, y esto es responsabilidad de todos cuantos se interesan con seriedad por el estudio científico de nuestra avifauna.

De las 260 citas nuevas estudiadas, 219 han sido homologadas, con lo que el porcentaje de aceptación alcanza el 84,2 %. Este porcentaje es ligeramente superior a lo habitual en los últimos tiempos (en el 2000 fue sólo del 77,7 %, por el peso que tuvieron las citas atrasadas, más difíciles, pero en el período 1995-1999 la media fue 82,8 %). La progresiva mejora en la calidad de la información también se tiene que ir notando en este aspecto.

Entre todos los registros de este informe tiene sin duda especial relevancia el relativo al Guión Africano *Crex egregia* observado en la isla de Tenerife, que es primero para la especie en todo el Paleártico Occidental. Única para Europa es la cita ya antigua de un Ibis Eremita *Geronticus eremita* cobrado en las Marismas del Guadalquivir (Valverde, 1959), que ahora se homologa tras el estudio de la piel del ejemplar, conservada en la Estación Biológica de Doñana. De Canarias vienen este año los primeros registros para el conjunto de España de las especies Añapero Yanqui *Chordeiles minor* y Serreta Capuchona *Lophodytes cucullatus*, si bien de esta última no es posible asegurar la procedencia natural. Son peninsulares, por otra parte, las primeras citas de Chorlitejo Pecuario *Charadrius pecuarius* y de Correlimos Acuminado *Calidris acuminata*. Ya son segundas o terceras citas españolas homologadas las que aparecen en este informe relativas a Zampullín Picogruaso *Podilymbus podiceps* (un ave en La Rioja y una o dos en Galicia), Eider Real *Somateria spectabilis* (Galicia), Pigargo Europeo *Haliaeetus albicilla* (Islas Baleares), Polluela Sora *Porzana carolina* (cita andaluza, antigua, homologada a partir del estudio de la piel de un ejemplar también en la EBD), Arao Aliblanco *Cephus grylle* (Galicia), Bisbita de Hodgson *Anthus hodgsoni* (Andalucía), Curruca Sahariana *Sylvia nana* (Canarias), Corneja Cenicienta *Corvus (corone) cornix* (Cataluña) y Escribano Carirrojo *Emberiza bruniceps* (Andalucía, cita también antigua, referente a un ejemplar en las colecciones de la EBD y que, como suele ocurrir con esta especie, no es posible asegurar que no corresponda a un pájaro escapado). Dentro de las especies que tan sólo se consideran en el ámbito canario, se presentan aquí las primeras citas homologadas de Pagaza Piquirroja *Sterna caspia* y Curruca Mirлона *Sylvia hortensis*. Y para terminar, muy destacables son también las seis citas de Corredor Sahariano *Cursorius cursor*, que tienen que ver con 18 aves y al menos con tres casos de nidificación, en la provincia de Almería, que son los únicos casos que hasta la fecha se han documentado en Europa.

No ha variado este año la composición del Comité de Rarezas, integrado por David Bigas i Campas (Deltebre, Tarragona), José Ignacio Dies Jambriño (Valencia), Elías García Sánchez (Oviedo/Uvieu), Gorka Gorospe Rom-

bouts (Pamplona), Ricard Gutiérrez Benítez (Barcelona), Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez (La Laguna, Tenerife) y José Luis Rabuñal Patiño (A Coruña). Como Secretario actuó un año más Eduardo de Juana, con la ayuda, esta vez, de Ángela García López.

Agradecemos a la Estación Biológica de Doñana las facilidades dadas para revisar su colección de pieles de aves y tomar fotografías de las mismas. Gracias también a la Sociedad Española de Ornitología, por su constante apoyo, y como siempre, a cuantos nos enviaron sus notas de campo para evaluación, que son los que en primera instancia hacen posible el trabajo del Comité de Rarezas.

LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTROS HOMOLOGADOS

La lista que sigue se ha elaborado de acuerdo con los siguientes criterios:

- En cada observación se consignan, por orden, 1) provincia; 2) localidad; 3) número de aves observadas (si no se indica otra cosa es una sola), 4) edad y sexo si se conocen (para datos primaverales-estivales sólo se expresa edad cuando no se trata de plumaje nupcial); 5) indicaciones en el caso de que el ave o aves hubieran sido cazadas, trampeadas o encontradas muertas, y si se conservan y dónde; asimismo, si existen fotografías entre la documentación en poder del Comité; 6) fecha(s); 7) observador(es), en general no más de tres.
 - Se publican sólo datos considerados seguros, aunque también observaciones indeterminables a nivel específico en géneros de gran dificultad como *Diomedea* (albatros) o *Limnodromus* (agujetas).
 - Las cifras entre paréntesis dispuestas a continuación del nombre de la especie indican los registros/individuos homologados ya por el Comité para los conjuntos de España peninsular-islas Baleares (PB) y Canarias (C) en: 1) años anteriores a 2001; 2) año 2001 (sin incluir los registros de 2000-2001 que ya aparecieron en el informe de 2000).
 - De no mediar indicación en otro sentido las fechas se refieren todas a 2001.
- La secuencia taxonómica seguida es, salvo pequeñas modificaciones, la de Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic*, 1978).
 - Un breve comentario sobre cada especie intenta situar las observaciones consideradas en relación a lo que se conoce sobre el estatus de la especie en España y a lo ya dicho en informes anteriores, indicando al principio, entre paréntesis, lo esencial del área de cría en el mundo.
- La propiedad de los datos contenidos en el informe corresponde a los diferentes observadores, que deben ser citados como autores en la bibliografía.

A) ESPECIES CONSIDERADAS PARA EL CONJUNTO DE ESPAÑA

Zampullín Picogruaso

Podilymbus podiceps (PB: 0/0, 3/3; C: 1/1, 0/0)

A Coruña. Ribeira, laguna de Vixán, ad., 3 de agosto (C. Vidal Rodríguez). Laxe, laguna de Traba, probable ad., 1 de diciembre a 16 de marzo de 2002 (J. L. Rabuñal Patiño y otros).


La Rioja. Logroño, embalse de La Grajera, ad., fotos, 19 de febrero hasta por lo menos enero de 2002 (según referencias, ya desde octubre de 2000 o incluso antes) (I. Gámez Carmona; D. González Fernández; A. Onrubia y otros).

(América). De golpe, las tres primeras observaciones en la península Ibérica, aunque ya teníamos una en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife, enero de 1991 (Trujillo *et al.*, 1995). Las poblaciones más septentrionales de esta especie son migradoras e invernan principalmente en el sur de los Estados Unidos y en México, siendo a ellas a quienes cabe atribuir los pocos casos de divagancia registrados en Europa. Mitchell & Young (1997) reúnen 19 citas a este lado del Atlántico, repartidas entre Islandia (1), Irlanda (2), Gran Bretaña (15) y Francia (1), aunque ahora se llevan ya 36 en Gran Bretaña (Rogers *et al.*, 2002) y 7 en Francia (Frémont *et al.*, 2003). Casi todas son de otoño o invierno, aunque no faltan casos, como el nuestro de La Rioja, de larga permanencia. Con relación a los registros gallegos, la proximidad de fechas y lugares hace pensar en que puedan corresponder los dos a un mismo ejemplar.

Zampullín Cuellirrojo

Podiceps auritus (PB: 49/78, 5/25; C: 0/0, 0/0)

Cantabria. Marismas de Santoña, 17 aves, 1 de febrero, con 9 aves el 16 de enero y el 19 de febrero (J. M. Pérez de Ana); hasta cinco aves, fotos, 18 de



Zampullín Picogrueso *Podilymbus podiceps*. Laguna de Vixán, Ribeira (A Coruña), agosto de 2001. Dibujo: C. Vidal.

noviembre a 13 de enero de 2002, con tres aves el 18 de noviembre (F. Arce González, J. Bedía y P. Mazón), cuatro el 21 de noviembre (D. González Fernández), cinco el 23 de noviembre (J. M. Pérez de Ana), tres el 17 de diciembre (J. M. Pérez de Ana) y dos el 13 de enero (A. Rodrigo García y M. A. García Matellanes).

Pontevedra. Estuario del Miño, A Guarda, ad., 16 de noviembre de 2000 a 21 de febrero (C. Vidal Rodríguez, R. Salvadores y T. Salvadores).

Vizcaya. Ría de Guernica (Gernika), Gauteguiz de Arteaga, 18 de noviembre (U. Labirua). Portugalete, parte interior de El Abra, fotos, 27 de diciembre (D. González Fernández).

2000:

Pontevedra. Véase arriba.

1996-1997:

Asturias. Ría del Eo, puerto de Castropol (Castropol), dos, 25 de noviembre de 1996 a 2 de febrero de 1997 (E. García Sánchez y otros/C.O.A.).

1995-1996:

Vizcaya. Desembocadura del Nervión (El Abra), Guecho (Getxo), dos, foto, desde 9 de diciembre de 1995 hasta primeros de marzo de 1996 (I. Zuberogoitia, J. Zuberogoitia y A. Ramos).

(Holártico boreal). Nuevo récord para Santoña, con 17 aves, y citas en Galicia, Asturias y el País Vasco.

Paño de Wilson

Oceanites oceanicus (PB: 10/48, 1/7; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Mar a 20 millas al NW de Sada, al menos siete, foto, 5 de agosto (P. Gutiérrez Varga, A.

Gutiérrez, E. Fraga, P. Pita, M. Pose e I. Torre/Sterna-Ferrol).

1999:

Pontevedra. Baiona, cabo Silleiro, al menos cinco, 24 de octubre (C. Vidal Rodríguez, A. Lomeña Rodríguez y J. Martínez Cedeira).

(Antártida e islas subantárticas). Detectado cada año en Galicia desde 1996. Todas las citas entre julio y octubre.

Rabijunco Etéreo

Phaethon aethereus (PB: 0/0, 0/0; C: 10/12, 1/2)

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Pájara, punta de Jandía, dos ads., 19 de enero (S. Kaiser y R. Kaiser).

1992:

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, ad., recogido y liberado más tarde, foto, 11 de enero (F. Rodríguez Godoy).

(Mares tropicales en Atlántico, Índico y Pacífico). Hay registros homologados cada año entre 1992 y 2000, pero sólo los de ahora son de pleno invierno. Una fotografía del ejemplar de 1992 está publicada en Martín & Lorenzo (2001). Hace muy poco se ha homologado la primera cita para Gran Bretaña (Rogers *et al.*, 2002), pero nosotros no tenemos ninguna peninsular.

Pelícano Común

Pelecanus onocrotalus (PB: 11/13, 1/2; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. Villafranco del Guadalquivir, finca Veta la Palma, dos ads., 12 de junio (F. Chiclana Moreno y D. Muñoz).

(Europa sudoriental, Asia y África). **Origen desconocido.** Para esta localidad ya se homologó una

cita de tres adultos en enero de 1999 (*Ardeola*, 48: 120) que, según parece, llevaban allí tiempo. Probablemente los de ahora son parte de aquéllos puesto que, de acuerdo con Fernando Ibáñez Fernández de Angulo, dos o tres adultos se han estado viendo regularmente en Veta la Palma y otras localidades de las Marismas, como el *lucio* de Marilópez, al menos entre julio de 1999 y septiembre de 2001.

Pelicano Rosado

Pelecanus rufescens (PB: 8/5, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Cádiz. Benalup de Sidonia, embalse de Celemín, 3 de abril (N. Winqvist, S. Schubert y S. Skoog).

(África al sur del Sáhara). **Origen desconocido.** Un punto desde el que podrían llegarnos aves escapadas es la "reserva africana" de Sigean, en el sureste de Francia, muy cerca de la frontera española, donde una colonia en semilibertad de esta especie cuenta con decenas de ejemplares (información de R. Gutiérrez Benítez).

Garceta Dimorfa

Egretta gularis (PB: 30/30, 4/4; C: 1/1, 1/1)

I) Aves que muestran caracteres de la subespecie *Egretta gularis gularis*:

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, charca de Maspalomas, ad., fotos, 12, 17 y 22 de mayo (F. del Campo, M. A. Suárez Farias y D.J. Alfonso Vargas y J. M. Villar), 24 de junio y 5 de julio (A. Weller).

Tarragona. Delta del Ebro, Sant Carles de la Ràpita, punta de La Banya, ad., fotos, 19 de junio y al parecer ya desde el 25 de mayo (C. Domingo, R. Gutiérrez, E. Guinart y F. López).

1970:

Huelva. Marismas del Guadalquivir, Hato Blanco, a orillas del Caño de Guadimar, ad., capturado, se conserva en la colección de la Estación Biológica de Doñana, foto, 14 de junio (F. Hiraldo Cano/Estación Biológica de Doñana).

II) Aves que muestran caracteres intermedios entre *Egretta garzetta* y *E. gularis* (posibles híbridos): **Málaga.** Málaga, desembocadura del Guadalhorce, 19 de agosto, 31 de agosto y 8 de septiembre (A.M. Paterson, A. Serrano Lavado y otros); mismo lugar, ave diferente, 9 de septiembre (A.M. Paterson y A. Paterson Fermosell).

Valencia. Albufera de Valencia, entre el *tancat* de Recatí (Sueca) y el Racó de l'Olla, 1er. verano, fotos, 13 de junio a 21 de agosto (J.I. Dies Jambrino).



Garceta Dimorfa *Egretta gularis gularis*, ad. Delta del Ebro, junio de 2001. Foto: R. Gutiérrez.

2000:

Barcelona. Delta del Llobregat, Cal Roc, 18 de septiembre a 29 de noviembre, quizás ya desde el 12 de agosto en la vecina localidad de Molins de Rei (X. Larruy, J. Becarés, R. Gutiérrez, G. Siré y otros).

(Paleotropical). Destaca la segunda cita canaria (la anterior es de Tenerife, 1988). El registro de 1970 en las Marismas del Guadalquivir, uno de los primeros en España, se homologa a partir del artículo de Hiraldo (1971a).

Marabú Africano

Leptoptilos crumeniferus (PB: 9/9, 7/7; C: 0/0, 0/0)

Granada. Órjiva, ad., fotos, 20 de septiembre (A.J. Heras Pino).

Huelva. Almonte, El Rocío, fotos, 3 de mayo (A. Andersson y K. Smedberg).

Huesca. Albelda/Tamarite de Litera, ad., fotos, 30 de marzo, visto por la mañana en la localidad de Albelda y por la tarde en la de Tamarite (M. A. Martín Arnau y C. Liberos Saura). Binéfar, ad., fotos, 31 de marzo y 1 de abril (V. Vistué Castarlenas).

Jaén. Andújar, La Ropera, dos ads., hay fotos y vídeo, al menos entre 22 de marzo (F. J. Martín Barranco) y 14 de abril (M. A. Díaz Portero).

Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Aznalcázar, Lucio del Lobo (Reserva Biológica de Guadimar), ad., fotos, 22 y 23 de junio (S. López Sánchez y M. J. Rueda Cabrera; F. Ibáñez Fernández de Angulo).

Zaragoza. Ejea de los Caballeros, vertedero y proximidades, ad., fotos, 20 de junio a 19 de julio, fecha esta última en que aparece electrocutado en una torre de alta tensión donde solía posarse (C.-J. Palacios, O. Ceballos y A. Palacios).

(África al sur del Sáhara). **Origen desconocido.** Este número excepcional de citas podría estar relacionado con un escape que se produjo al parecer en un núcleo zoológico existente en Castillo de las Guardas, provincia de Sevilla, durante la primavera de este año (noticias no contrastadas hablan de seis aves, escapadas de la «Reserva Natural El Castillo de las Guardas»). Las observaciones de Huesca corresponden a un mismo ejemplar (hay 5 km entre Albelda y Tamarite de Litera y 12 km entre esta segunda localidad y Binéfar), ejemplar que también podría haberse visto, entre marzo y mayo, en localidades cercanas de la misma provincia y la vecina Lleida (según R. Gutiérrez Benítez).

Tántalo Africano

Mycteria ibis (PB: 1/1, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Badajoz. Montijo, embalse de Los Canchales, ad., fotos, 24 a 28 de agosto (T. Álvarez Delgado y otros; A. Pérez Acevedo y otros).

(África al sur del Sahara y Madagascar). **Origen desconocido.**

Ibis Eremita

Geronticus eremita (PB: 1/1, 0/0; C: 0/0, 0/0)



Ibis Eremita *Geronticus eremita*, ad. Marismas del Guadalquivir, julio de 1958, piel en la Estación Biológica de Doñana. Foto: E. de Juana.

1958:

Sevilla. Marismas del Guadalquivir, entre Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa, ad., piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 11723A), fotos, en la etiqueta figura «13-jul-58» (J. Valverde; fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(Marruecos y Oriente Próximo). Esta observación es del máximo interés, puesto que supone el único registro documentado de la especie en España y Europa. Fue dada a conocer por el profesor José Antonio Valverde, recientemente fallecido, en uno de los primeros números de *Ardeola*. Hay alguna discrepancia entre lo que señalan el trabajo correspondiente (Valverde, 1959) y el etiquetado del ejemplar en la colección, puesto que el primero da como localidad «El Juncal... al SE de Villamanrique de la Condesa» y como fecha de captura el 11 de julio, y el segundo consigna «La Junquera, Aznalcázar» y fecha de 13 de julio. En ambos casos se indica que el ave era una hembra. Valverde opina en relación al hallazgo que «se trataba sin duda de un ave errática, solitaria, que probablemente había llegado a la región aquel mismo día, puesto que no se la había visto antes» y que «es lo más probable que procediera de las colonias marroquíes del Bajo Muluva, los montes de Zekkara o de Foum el Kheneg (Atlas Medio), que distan del punto de captura unos 400 km». Hoy en día, por desgracia, todas esas colonias hace tiempo que desaparecieron y las posibilidades de una llegada natural de la especie al sur de Europa son mínimas. Además de una exigua representación en Siria y en Turquía, las únicas poblaciones actuales de este ibis, en situación crítica, son las del Parque Nacional de Souss-Masa, en el sur de Marruecos. Como accidental se ha citado también en Azores y Cabo Verde (Snow & Perrins, 1998).

Espátula Africana

Platalea alba (PB: 7/6, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1997:

Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Villafranco del Guadalquivir, Brazo de la Torre, ad., fotos, 1 de agosto (L. García/Estación Biológica de Doñana).

(África al sur del Sahara). **Origen desconocido.**

Flamenco Enano

Phoenicopterus minor (PB: 6/5, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Toledo. Villacañas, laguna Larga, ad., 19 de abril y 12 de mayo (A. López López, L. López Pérez, M. Mata y J. D. Acevedo Barberá).

(África al sur del Sahara). **Origen desconocido.** Es posible que este individuo sea el mismo que se vio en abril y mayo del año anterior en otras lagunas manchegas próximas.

Cisne Vulgar

Cygnus olor (PB: 22/49, 4/9; C: 0/0, 0/0)

Cádiz. Jerez de la Frontera, laguna de Medina, seis ads., 12 de agosto (G. García Pérez y S. Calvo Ladrero), con únicamente dos los días 14 de abril (A. Winnem, A. Maeland, H. Meyer y B. Jacobsen), 30 de junio (S.C.V. Geelhoed, G. van Leeuwen y W.T. de Nubel) y 1 de noviembre (F. Chiclana Moreno, M. Romero y J. Martín Rodríguez).

Guipúzcoa. Irún, Txingudi, Parque Ecológico de Plaiaundi, 1er. inv., 13 de diciembre y según referencias desde comienzos de mes (M. Etxaniz Aginagalde).

Madrid. Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, inm., fotos, 30 de octubre a 9 de noviembre (E. Castillejos Rodríguez, J. A. García Monge, R. Calderón Sáez y otros).

Sevilla. Villafranco del Guadalquivir, finca Veta la Palma, ad., foto, 12 de junio (F. Chiclana Moreno) y 20 de septiembre (M.J. Sánchez Rodríguez, C. Alonso, S. Neuvonen y M. Vázquez Castro).

(Europa y Asia, en latitudes medias). **Origen desconocido.** El año 2002 es el último para el que se considerarán citas de esta especie, retirada ya de la lista de rarezas.

Cisne Cantor

Cygnus cygnus (PB: 17/50, 1/2; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Camariñas, ría, dos ads., 28 de diciembre de 2000 a 3 de enero (J. Martí Aledo y X. del Acebo).

2000:

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, dos ads., 16 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño y N. de Castro Casasola). Camariñas, véase arriba.

(Paleártico boreal). Cabe la posibilidad de que las tres citas se refieran a las mismas aves.

Ánsar Piquicorto

Anser brachyrhynchus (PB: 20/26, 4/4; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Embalse de Cecebre, fotos, al menos entre 21 de diciembre de 2000 y 1 de marzo (D. González Fernández y otros).

Vizcaya. Ría de Guernica (Gernika), 3 de enero (M. Garrigós y J. M. Pérez de Ana).

Zamora. Villafáfila, lagunas, 31 de enero (O. Infante Casado y C. Aldea Dorado); misma localidad, ad., 29 de diciembre (J. Gayo D'Iom; A. Rodrigo García y J. M. Pérez García).

2000:

A Coruña. Véase arriba.

Cantabria. Marismas de Santoña, al menos entre el 2 y el 23 de enero (M. Garrigós, J. M. Pérez de Ana, S. Alarcón y J.C. Lorenzo; I. Gámez Carmona y otros/Club Ornitológico de La Rioja).

1967:

Huelva. Reserva Biológica de Doñana, cazado, piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 11961A), fotos, 10 de febrero (M. González; fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(Groenlandia, Islandia y Spitsbergen). El ave de Cecebre era muy mansa y se asociaba con gansos domésticos, lo que levanta dudas sobre su procedencia. La de Huelva es una de las dos que según Hiraldo (1971b) se cobraron en El Puntal de Doñana el 10 de febrero de 1967, aunque la etiqueta consigna 10 de diciembre.

Ánsar Chico

Anser erythropus (PB: 4/4, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1971:

Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Aznalcázar, marismas de Las Nuevas, ad., capturado vivo y conservado posteriormente en cautividad, foto, primeros de marzo (J. Hidalgo y P. Rodríguez).

(Paleártico boreal, desde el norte de Escandinavia). Registro ya antiguo, que se homologa a partir de lo dicho en Hidalgo & Rodríguez (1971), donde se hace ver que ya antes de ser capturado el individuo se mostraba manso y andaba con gansos domésticos.

Ánsar Careto

Anser albifrons (PB: 23/72, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1989:

Sevilla. Marismas del Guadalquivir, «Los Caracoles al lado de Mari López», 1er. inv., piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 16406A), fotos, en la etiqueta figura «a princip. ene-89» (M. Máñez y E. de Juana).

1969:

Huelva. Marismas del Guadalquivir, ad., piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 11963A), fotos, en las etiquetas figura como *Anser erythropus*, macho, con localidad «Reserva Biológica Doñana» y fecha «16-feb-69» (M. Máñez y E. de Juana).

(Holártico boreal). La especie salió de la lista de rarezas en 1994, pero se consideran citas anteriores. El ejemplar de 1969 sería, por los datos biométricos que figuran en la etiqueta, el *Anser albifrons* que cita Hiraldo (1971b) como obtenido en Las Nuevas.

Ánsar Indio

Anser indicus (PB: 14/19, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Zamora. Villafáfila, ad., fotos, 29 de diciembre (D. González Fernández; J. Gayo D'Ílom).

1969:

Huelva/Sevilla. Marismas del Guadalquivir, dos, cazados, foto, primeros de diciembre (J. Castroviejo).

(Asia central). **Origen desconocido.** El registro de 1969 en las Marismas del Guadalquivir, primero para España, se homologa a partir de lo publicado por Castroviejo (1971).

Barnacla Canadiense

Branta canadensis (PB: 11/13, 3/4; C: 0/0, 0/0)

Álava. Labastida, gravera junto al río Ebro, dos, 3 de mayo (J. M. Fernández García); Vitoria-Gasteiz, lagunas de Salburúa, 16 de noviembre (J. A. Gainza-rain y R. Ruiz).

Zamora. Villafáfila, lagunas, fotos, 19 de noviembre de 2000 a 22 de diciembre (M. A. Rouco Fernández; A. Rodrigo García y M. A. García Matellanes; M. Juan Martínez y D. González Fernández; M.J. Sánchez Rodríguez; T. Sanz).

2000:

Zamora. Véase arriba.

(Norteamérica, introducida en islas Británicas y Escandinavia). **Origen desconocido.**

Barnacla Cuellirroja

Branta ruficollis (PB: 4/5, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Zamora. Villafáfila, lagunas, ad., 1 y 6 de diciembre (A. Rodrigo García y M. A. García Matellanes).

1969:

Huelva/Sevilla. Marismas del Guadalquivir, ad., cazado, foto, finales de octubre (J. Castroviejo).

(Siberia). **Origen desconocido.** El registro de 1969 en las Marismas del Guadalquivir, primero para España, se homologa a partir de lo consignado en Castroviejo (1971). Hace mucho que no llegaban citas de esta especie, correspondiendo las anteriores a Villafáfila (diciembre de 1988-enero 1989 y enero-febrero 1991) y a la laguna de Gallocanta (noviembre de 1989).

Ganso del Nilo

Alopochen aegyptiacus (PB: 13/20, 4/8; C: 0/0, 0/0)

Cáceres. Casatejada, embalse de Arrocampo, dos, 3 de marzo (J. Briz Lázcoz).

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany*s del Matà y otras zonas, tres, foto, 23 de abril a 11 de junio (J. Martí Aledo y otros).

Islas Baleares. Isla de Mallorca, Albufera de Mallorca, uno (en compañía de una hembra de *Tadorna ferruginea*), 12 de diciembre de 2000 a 13 de enero (A. Stagg y P. Vicens, cita ya publicada en el informe de 2000); Albufera de Mallorca, dos (en compañía de cinco *T. ferruginea*), 11 de diciembre (A. Stagg).

Madrid. Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, ad., 10 a 16 de septiembre (A. Roca Vidal) y 20 de octubre (G. Solís Fraile, R. Cerrato Rosales y P. Vergara Fernández).

(África subsahariana y Egipto, introducido en Gran Bretaña y los Países Bajos). **Origen desconocido.**

Tarro Canelo

Tadorna ferruginea (PB: 66/139, 3/8; C: 3/28, 2/2)

Granada. Salobreña, desembocadura del río Guadalfeo, dos, fotos, 25 de julio (S.F. Valverde Ramos).

Islas Baleares. Isla de Mallorca, Albufera de Mallorca, dos hembras y un macho, desde diciembre de 2000 hasta 13 de enero (el macho y una hembra) y el 23 de febrero (la otra hembra) (A. Stagg y P. Vicens, cita ya publicada en el informe de 2000); Albufera de Mallorca, cinco (en compañía de dos *Alopochen aegyptiacus*), 11 de diciembre (A. Stagg).

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, un ave, estanque en la carretera de Arinaga, 27 de junio a 4 de julio (M. A. Suárez Farias y F. del Campo); mismo lugar y charca próxima, dos, macho y hembra ads., fotos y vídeo, 1 a 17 de noviembre (M. A. Suárez Farias, J. García Mozón y F. del Campo).

Valladolid. Peñaflor de Hornija, laguna, macho, fotos, 16 y 17 de junio (A. Torés y R. Escudero).

Zamora. Villafáfila, dos, 21 de enero (J.C. Guerra Velasco y L. Hurtado Vergara) y 24 de enero (T. Sanz), aves vistas desde septiembre de 2000 (citas publicadas en el informe de dicho año).

2000:

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *basca* de El Gall Marí y *estany*s de El Matà, hembra, 10 a 18 de septiembre (J. Martí Aledo y otros).

Zamora. Véase arriba.

1998:

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany* de El Cortalet, hembra, 27 y 28 de noviembre (J. R. Sanz, J. Martí Aledo y otros).

1982:

Huelva. Doñana, macho, piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 4806A), fotos, en la etiqueta figura como localidad «Reserva Biológica de Doñana» y como fecha «07-Ago-82» (fotos de E. de Juana y M. Máñez).

1967:

Huelva. Parque Nacional de Doñana, macho, piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 12107A), fotos, en la etiqueta figura como localidad «Doñana» y como fecha «26-sep.-67» (fotos de E. de Juana y M. Máñez).

1958:

Huelva. Parque Nacional de Doñana, hembra, piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 12102A), fotos, en la etiqueta figura como localidad «La Algaidilla, R.B. Doñana» y como fecha «26-Oct.-1958» (fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(Asia centro-occidental, con pequeñas áreas en sureste de Europa y noroeste de África). **Origen desconocido.** El año 2002 es el último para el que se tomarán en consideración los registros correspondientes a esta especie. Con relación a los que aparecen en el presente informe, las aves de Gran Canaria podrían tener un origen natural, ya que las fechas coinciden con la época en que se van de Fuerteventura los ejemplares que se reproducen allí (Martín & Lorenzo, 2001). Asimismo, de las tres citas antiguas correspondientes a Doñana, las de 1958 y 1967 seguramente pertenecen a ejemplares silvestres, que por

aquella época llegaban regularmente a las Marismas del Guadalquivir, procedentes según parece del norte de África (Valverde, 1960).

Pato Mandarín

Aix galericulata (PB: 17/37, 1/1; C: 0/0, 1/1)

Granada. Albolote, embalse de Cubillas, macho ad., 21 de septiembre (J. Pérez Contreras y J. M. Rivas Fernández).

Navarra. Cabredo, embalse, macho ad., 12 de diciembre de 2000 a 15 de enero (J. López de Luzuriaga García, cita ya publicada en el informe de 2000).

(Paleártico oriental, introducido en Gran Bretaña). **Origen desconocido.**

Silbón Americano

Anas americana (PB: 14/17, 3/4; C: 4/0, 0/0)

Cantabria. Marismas de Santoña, macho, 19 de octubre (J. M. Pérez de Ana).

Lugo. Foz, ría de Foz, dos machos, 27 de diciembre (J. Gayo D'lom).

Palencia. Boada de Campos, laguna, macho, 4 de marzo (C. Gutiérrez Expósito y F. Jubete).

(Norteamérica). Hay citas todos los años a partir de 1996. En Gran Bretaña tienen ya tantas, 343 entre 1958 y 2001, que la especie se deja de considerar rareza (Rogers *et al.*, 2002).

Cerceta Americana

Anas carolinensis (PB: 15/13, 2/2; C: 6/6, 0/0)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Insua, macho, 22 y 23 de diciembre, y 13 de enero y 2 de marzo de 2002, probablemente ya desde el 11 de noviembre (J. L. Rabuñal Patiño).

Palencia. Boada de Campos, laguna, macho, 23 de febrero (E. Gómez Crespo/Junta de Castilla y León).

(Norteamérica). La de Palencia es primera cita para Castilla y León. Ahora llevamos, además, 14 en Galicia, seis en Canarias, una en Cantabria y una en Extremadura.

Ánade Sombrío


Anas rubripes (PB: 8/3, 0/0; C: 1/1, 0/0)

A Coruña. Ortigueira, ría, macho, fotos, 26 de noviembre de 2000 a 4 de marzo de 2001 (J. A. Gutiérrez Pita y otros/Sterna-Ferrol; cita ya publicada en el informe de 2000).

(Norteamérica). Este macho es muy probablemente el mismo registrado en inviernos anteriores en las cercanas lagunas de Cospeito (temporadas 96/97 y 97/98) y ría de Foz (temporadas 1998-99 y 1999-2000), por lo que rehacemos en consecuencia la contabilidad de las aves.

Cerceta Aliazul

Anas discors (PB: 23/25, 1/1; C: 4/6, 0/0)



Cerceta Aliazul *Anas discors*, macho. Marismas del Guadalquivir, febrero de 1972, piel en la Estación Biológica de Doñana. Foto: E. de Juana.

Almería. El Ejido, Cañada de Las Norias, macho, 17 de marzo (C. Gutiérrez Expósito y M. Paracuellos).

Pontevedra. Corrección: las observaciones referentes a la localidad de O Grove publicadas en los informes de 1999 (*Ardeola*, 48: 124) y de 2000 (*Ardeola*, 49: 153) corresponden a un mismo ejemplar, hecho que se ignoró en la contabilidad de las citas.

1972:

Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Puebla del Río, Isla Mayor, *lucio* de Cantaritas, macho, piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 22066A), fotos, en la etiqueta figura «Feb. 1972» (M. Máñez y E. de Juana).

(Norteamérica). El ejemplar de 1972, en la provincia de Sevilla, es seguramente el mismo al que se refieren García *et al.* (1989) como matado por cazadores y conservado en la EBD.

Porrón Acollarado

Aythya collaris (PB: 15/26, 2/2; C: 25/31, 1/1)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, hembra, 7 de diciembre de 2001 a 27 de enero de 2002 (a partir del 13 de enero en compañía de una segunda hembra) (J. L. Rabuñal Patiño).

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, charca de Maspalomas, macho de 1er. inv., foto, 28 de enero (M. A. Suárez Farias y F. del Campo).

Pontevedra. Sanxenxo, graveras de Rouxique, macho, fotos, 12 de enero a 18 de marzo (C. D. Romai Cousido, E. Martínez Sabarís y otros; D. González Fernández).

(Norteamérica). De las 17 citas homologadas para la Península, siete corresponden a Galicia, seis a Asturias, tres a Andalucía y una a Aragón.

Porrón Bola

Aythya affinis (PB: 2/2, 0/0; C: 6/15, 0/0)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Arona, charca de El Fraile, dos hembras, 17 de febrero (J. A. Lorenzo, cita ya publicada en el informe de 2000).

(Norteamérica).

Eider Real

Somateria spectabilis (PB: 3/3, 0/0; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Laxe, puerto, macho de 1er. inv., fotos y vídeo, 10 de diciembre de 2000 a 1 de abril de 2001 (M. Cabero Muñoz y otros, cita ya publicada en el informe de 2000).

1980:

A Coruña. Ponteceso, ría de Corme y Laxe, macho de 1er. inv., 9 y 16 de marzo (J. L. Rabuñal Patiño).

(Holártico, circumpolar). La novedad aquí es la cita de 1980, nada menos, que ahora «rescata» su autor tras haber podido ver otro macho de primer invierno en la misma localidad, dos décadas después.

Pato Havelda

Clangula hyemalis (PB: 45/71, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1991:

Huelva. Parque Nacional de Doñana, playa, hembra de 1er. inv., piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 18367A), fotos, en la etiqueta figura como fecha 22 de noviembre (fotos de E. de Juana y M. Máñez).

1979:

Pontevedra. Ría de Vigo, ensenada de San Simón, hembra de 1er. inv., piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 2004A), fotos, en la etiqueta figura como fecha 2 de diciembre (fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(Holártico boreal). La especie salió de la lista de rarezas ya en 1994 pero, como es la norma, se siguen considerando todas las observaciones que puedan llegar correspondientes a ese año o años anteriores.

Negrón Careto

Melanitta perspicillata (PB: 12/13, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2000:

Pontevedra. Nigrán, frente a la playa de Arealoura, hembra de 1er. inv., 23 de diciembre de 1999 a 3 de enero (C. Vidal Rodríguez, A. Lomeña Rodríguez, R. Salvadores Ramos y otros). O Grove/Sanxenxo, bahía de A Lanzada, hembra de 1er. inv., 9 de enero a 10 de marzo (C. D. Romai Cousido y otros).

1999:

Pontevedra. Nigrán (véase arriba).

(Norteamérica). Dos nuevas citas para Galicia, que ya suma nueve.

Serreta Chica

Mergellus albellus (PB: 17/27, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2000:

Tarragona. Delta del Ebro, Port dels Alfacs, hembra/1er. inv., 23 de enero (N. Imbernón García y J. Daranas Llopart).

(Paleártico boreal). Primera cita homologada para Cataluña, aunque se conocen varias observaciones más, algunas recientes (Ferrer *et al.*, 1986; Clavell, 2002).

Serreta Grande

Mergus merganser (PB: 20/52, 1/3; C: 0/0, 0/0)

Huelva. Huelva, marismas del Odiel, espigón Juan Carlos I, tres, 16 de diciembre (D. Aguado Macías).

1994:

Girona. Roses, puerto de Santa Margarida, dos, hembras o aves de 1er. inv., 21 de noviembre (J. Martí Aledo).

(Paleártico boreal). Primera cita homologada para Andalucía, de una localidad donde es habitual durante el invierno la presencia de Serreta Mediana *M. serrator*.

Serreta Capuchona

Lophodytes cucullatus (PB: 0/0, 0/0; C: 0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Adeje, charca de riego en Playa Paraíso (El Pinque), 1er. inv., fotos, 11 de diciembre (D. Lupton y B. Lancaster), 12 de diciembre (E. García del Rey) y al menos hasta 16 de febrero de 2002 (R. Fray).

(Norteamérica). **Origen desconocido.** Primera observación homologada para las islas Canarias y el conjunto de España. En Europa se considera esta especie accidental rara, con citas al menos para Islandia, Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia y Bulgaria), pero también se piensa que muchas de las observaciones deben corresponder a ejemplares escapados de colecciones de anátidas, donde la presencia de la especie es común (e.g. Alström *et al.*, 1991; Snow & Perrins, 1998). En el presente caso, la situación atlántica de las Canarias y las fechas, de pleno invierno, jugarían a favor de una hipotética llegada natural.

Malvasía Canela

Oxyura jamaicensis (PB: 25/69, 2/8; C: 0/0, 0/0)

Álava. Embalse de Ullíbarri-Gamboa, cinco, 27 de septiembre de 2000 a 5 de abril (el 27 de septiembre hay dos machos ads. y el 1 de noviembre, dos machos y tres indeterminados; los machos son abatidos el 28 de noviembre y el 12 de diciembre, y dos de los indeterminados —que resultan ser hembras ads.— el 19 de diciembre y el 5 de abril) (A. Onrubia, J. R. Alonso, T. Andrés, N. Ruiz de Azúa, M. Sáenz de Buruaga y J. Villasante).

Navarra. Pamplona, barrio de Mendillorri, estanque de El Lago, tres, macho ad. y dos juvs. de sexo indeterminado, foto, 21 a 25 de agosto (uno de los juvs. sólo está los días 21 y 22, y los otros dos ejemplares son abatidos el día 25 y enviados a la Estación Biológica de Doñana) (A. Onrubia, I. Fortes, C. Almingol, G. Berasategui y otros).

2000:

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, macho en eclipse, 15 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño).

Álava. Véase arriba.

(América, introducida en Gran Bretaña). Nueve aves en total, de las que se matan seis. La de A Coruña es la primera para Galicia.

Pigargo Europeo*Haliaeetus albicilla* (PB: 1/1, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Islas Baleares. Isla de Mallorca, sierra de Tramuntana, finca de Moncaire y embalse de Cúber (Escorca), inm., fotos, desde últimos de diciembre hasta al menos 16 de febrero de 2002 (M. Rebassa, X. Gassó, J. M. Rebassa y A. Sastre Serra).

(Paleártico y Groenlandia). Segundo registro homologado en España, después del referente a otro inmaduro cazado en las marismas de Santoña el 3 de diciembre de 1944 (*Ardeola*, 46: 135-136). Primera, por tanto, para las Baleares, para donde hay datos antiguos, no demasiado convincentes, que hablan incluso de posible reproducción en el pasado. Una nota sobre esta observación, con fotos, en Rebassa (2001).

Busardo Moro*Buteo rufinus* (PB: 10/11, 3/2; C: 2/2, 0/0)

Huelva. Almonte, carretera entre El Rocío y Villamanrique de la Condesa, posible ad., 7 de mayo (G. McIvor).

Sevilla. La Lantejuela, probable ad., 7 de enero y aparentemente el mismo, 16 de octubre y en fechas posteriores de 2002 (F. Chiclana Moreno).

2000:

Zaragoza/Tarragona. Fayón (Faió), cola del embalse de Riba-roja, ad., 8 de junio (Ll.J. Anguera).

1999:

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, proximidades de La Oliva, fotos, 14 de abril (W. Pompert).

(Sureste de Europa, Asia y norte de África). Otro buen conjunto de citas el del presente informe. El ave de Fuerteventura, 1999, parecía claro *cirtensis*. La de Sevilla llevaba una anilla metálica en la pata izquierda, al menos durante la observación de octubre (¿origen cautivo?).

Busardo Calzado*Buteo lagopus* (PB: 4/4, 0/0; C: 0/0, 0/0)**1998-1999:**

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, Castelló d'Empúries, prados de Can Comes y La Muga Vella, juv., 19 de octubre a 16 de marzo (J. Martí Aledo, J. R. Sanz, L. Torner, J. Espigulé y otros).

(Holártico boreal). Las citas homologadas hasta ahora, sólo cuatro, corresponden todas a Cataluña y no desbordan el período invernal del año (octubre-marzo).

Águila Moteada*Aquila clanga* (PB: 14/14, 0/0; C: 0/0, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, Les Llaunes, juv., fotos, 18 de diciembre de 2000 a 7 de enero (J. Martí Aledo y otros, cita ya publicada en el informe de 2000).

(Eurasia septentrional, desde Polonia al este de Siberia).

Polluela Sora*Porzana carolina* (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)**1975:**

Sevilla. La Puebla del Río, Brazo del Este, ad., piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 11856A), fotos, en la etiqueta figura como fecha 30 de diciembre y como colector Luis García (L. García; fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(Norteamérica). Se trata del ejemplar dado a conocer en García *et al.* (1987), donde se precisa que era un macho (aunque tal circunstancia no figure en las etiquetas ni pueda inferirse del estudio de las fotografías). Es la observación más antigua de la especie en España; había otras dos, una de 1988 para la provincia de A Coruña (Laxe, 10 de abril) y otra de 1990 para la de Barcelona, pero la segunda se desecha en este mismo informe (ver más adelante).

Guión Africano*Crex egregia* (PB: 0/0, 0/0; C: 0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, ciudad de Santa Cruz de Tenerife, parque García Sanabria, ad., probable macho, ave encontrada en mal estado y que muere al día siguiente, siendo entregada para su conservación al Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, fotos, 23 de noviembre (J. A. Lorenzo Gutiérrez y Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Tenerife).

(África al sur del Sahara). Sorprendente cita, que es primera no ya para las Canarias y España, sino para todo el Paleártico. Se trata de una especie que efectúa movimientos complejos y todavía no bien conocidos, relacionados con las lluvias, y que para los países más próximos a las Canarias se ha señalado en Gambia (residente raro), Senegal (sólo tres citas) y Mauritania (probable divagante al extremo sureste), con reproducción en la franja del Sahel, en general, entre julio y septiembre (Del Hoyo *et al.*, 1996; Taylor & van Perlo, 1998). Migra de noche y algunas veces aparecen individuos sedimentados en el interior de ciudades, tal como esta vez ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife.

Calamoncillo Africano*Porphyryula alleni* (PB: 6/6, 0/0; C: 6/6, 0/0)**1978:**

Sevilla. La Puebla del Río, ad., piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 1207A), fotos, 15 de enero, en la etiqueta figuran como localidad «Isla Mayor», como colector «familiar de Pepe Clarita» y como fecha «10-marzo-79», con la anotación «en cautividad hasta el 10 de marzo de 1979» (J. A. Amat; fotos de E. de Juana y M. Máñez).

1975:

Murcia. La Alberca/Benaján, ad., piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 23712A), fotos, en la etiqueta figura como fecha



Guión Africano *Crex egregia*, ad. Santa Cruz de Tenerife, noviembre de 2001. Foto: J. A. Lorenzo.

«14-dic.-75» y como colector «M. Hernández» (J. Calderón; fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(África al sur del Sahara). Dos citas ya históricas, de ejemplares cuyas pieles se conservan en la colección de la Estación Biológica de Doñana, Sevilla. Corresponden a las publicaciones de Calderón (1976) y Amat (1979a). Serían cronológicamente la segunda y la tercera de la especie en España, tras la de Guirao (1859). El ejemplar de Murcia se capturó como adulto de sexo indeterminado; el de Sevilla sería un macho, de acuerdo con las etiquetas -en las que constan las medidas de los testículos-, pero no sabemos su edad en el momento de la captura, puesto que la publicación de referencia no indica nada al respecto y el ave permaneció más de un año en cautividad.

Corredor Sahariano

Cursorius cursor (PB: 10/12, 5/17; C: no se considera)

A Coruña. Ponteceso, playa de A Barra, ad., foto, 16 de septiembre (C. D. Romai Cousido, J. M. Fafián, J. Velasco, J. L. Rabuñal y otros).

Almería. Huércal-Overa, «estepas» de El Saltador, dos ads., probablemente un macho y una hembra, 22 de abril (J. P. Enciso Cascales y J. M. Gómez Sánchez). Tabernas, al menos once aves, con observación el 28 de mayo de siete de ellas, siendo una un pollo recién eclosionado, fotos (G.J. Gelling y A. Kuiten), y con más observaciones a lo largo de junio y julio que incluyen el seguimiento de dos nidos, de los cuales uno fracasa y en el otro nacen dos pollos, más tarde desaparecidos (C. González, J. Manrique y M. Ortega; A. Paterson; J. P. Enciso Cascales).

Cádiz. San Roque, Sotogrande, ad., fotos, 18 y 19 de abril (R. A. Rackliffe).

Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce, dos, 10 de abril (B. López Soler y A. Tamayo Guerrero).

1870:

Málaga. Localidad no precisada de la provincia, juv., capturado, se conserva naturalizado en el Instituto Nuestra Señora de la Victoria (Málaga), foto, 28 de agosto (M. Garrido).

(Norte de África y suroeste de Asia). En este excepcional conjunto de citas se incluyen varios casos de reproducción en la provincia de Almería, suma-

mente interesantes puesto que son los únicos conocidos hasta el momento en Europa. Una foto de uno de los nidos encontrados, conteniendo un pollo recién nacido y un huevo, se ha publicado en *La Garcilla*, 112: 12-13 (foto de fecha 24 de junio, debida a J. P. Enciso). Las aves observadas en Huércal-Overa también desarrollaron comportamiento de distracción, indicativo de probable reproducción. En 2002, prospecciones en estas áreas almerienses han dado resultado negativo (J. Manrique, com. pers.). Todas las observaciones andaluzas (Almería, Cádiz y Málaga) podrían derivar de una invasión en abril, mientras la gallega es ya de septiembre. También se incluye aquí un dato antiguo, de una captura en Málaga efectuada a finales del siglo XIX y que probablemente corresponde al ejemplar que señalan Irby (1895) y Gil Lletget (1945) (una foto de este ejemplar, montado, está publicada en Garrido & Alba, 1997). Es asimismo destacable la primera cita para Galicia.

Chorlitoje Pecuario

Charadrius pecuarius (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Toledo. Villacañas, lagunas, macho, probable ad., 12 de marzo (C. A. Torralo Moreno) y 17 de marzo (R. García, J. Martínez de Aramayona, P. Tapias, J. Tormos y J. Ruiz Rodrigo; J.C. Marín Santos, J.E. Sánchez Díaz e I. Torres).

(África). Primera observación para España y la península Ibérica. Sería, además, la tercera en Europa, después de las de Noruega, mayo de 1913 (Snow & Perrins, 1998) y Francia, marzo-abril de 2000 (Frémont *et al.*, 2002). El área de cría de este chorlitoje es principalmente afrotropical, aunque tiene una

pequeña población en Egipto (Del Hoyo *et al.* 1996) a partir de la cual, quizás, movimientos dispersivos son responsables de una larga serie de observaciones en Israel, donde la especie se ve cada año, sobre todo en invierno, y de tres citas en Chipre. En el resto de África parece residente, pero localmente se señalan movimientos de naturaleza indeterminada y se conocen tres observaciones en Marruecos, en enero-marzo de 1990 (cuatro aves), enero de 1991 y marzo de 1999 (Bergier *et al.*, 2000).

Chorlito Dorado Americano

Pluvialis dominica (PB: 12/12, 2/2; C: 12/12, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, arrozales de El Matà, 1er. verano, fotos, 16 a 22 de abril (J. Martí Aledo y otros; R. Gutiérrez, R. Armada, J. L. Copete, F. López y A. Ramal).

Valencia. Albufera de Valencia, *tancat* de La Ratlla, ad., fotos, 11 de septiembre (B. Dies, J. L. Terrasa y J.I. Dies).

2000:

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Insua, juv., 22 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño).

(Norteamérica septentrional). La observación de los Aiguamolls es la primera segura para Cataluña, aunque tenemos una cita de otro posible ejemplar, en marzo de 1995 en la desembocadura del Tordera, que se homologó como *Pluvialis dominica/fulva* (*Ardeola*, 44: 128).

Avefría Sociable

Vanellus gregarius (PB: 17/17, 0/0; C: 1/1, 0/0)



Chorlitoje Pecuario
Charadrius pecuarius, macho. Laguna de Villacañas, marzo de 2001. Foto: J. C. Marín.

Huesca. Belver de Cinca, 22 de enero, probablemente el ejemplar señalado el 24 de diciembre de 2000 (J. J. Bafaluy Zoriguel, cita ya publicada en el informe de 2000).

(Sureste de Rusia y Asia centro-occidental).

Correlimos Semipalmado/de Alaska

Calidris pusilla/mauri (PB: 1/1, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1980:

Pontevedra. Moaña, playa, 14 de febrero (J. A. de Souza Bazarra, comunicado por C. D. Romai Cousido).

(Norteamérica).

Correlimos Culiblanco

Calidris fuscicollis (PB: 11/11, 2/2; C: 7/7, 0/0)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Insua, juv., 11 y 12 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño).

Huesca. Fraga, arrozales de Fondo de Llitera, ad., 16 y 21 de octubre (S. West y T. Nievas).

1999:

Pontevedra. Vigo, Xunqueira do Lagares, 1er. inv., 26 y 31 de octubre (R. Salvadores, A. Lomeña, J. M.M. Mariño y C. Vidal).

(Norteamérica boreal). Dos nuevos registros para Galicia, que ya lleva ocho, junto al primero para Aragón. Los tres son de octubre, mes que acumula casi la mitad del total. En Marruecos se ha homologado hace no mucho la primera cita: embalse de Idriss, 21 de septiembre de 1999 (Bergier *et al.*, 2000).

Correlimos Pectoral

Calidris melanotos (PB: 96/105, 5/7; C: 15/15, 0/0)

Alicante. San Fulgencio, El Hondo de Amorós, dos juvs., 19 y 20 de septiembre (J. Ramos Sánchez y S. Arroyo); Elche, Parque Natural de El Hondo, charca de La Contadora, juv., fotos, 20 y 22 de septiembre (J. Ramos Sánchez).

Cuenca. Villalba del Rey, embalse de Buendía, 3 de septiembre (F. Bindrich y A. Müller).

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany* Europa, dos, foto de uno, 29 de abril a 7 de mayo de 2001 (J. Muñoz; J. Martí Aledo, D. Burgas, B. Minobis y otros).

Salamanca. Villar de Gallimazo, Azud de Riobobos, ad., probable hembra, fotos, 16 y 17 de mayo (M. A. Rouco Fernández, E. Carrasco y O. Infante).

2000:

Alicante. Parque Natural de El Hondo, embalse de Levante, juv., 8 y 11 de septiembre (J. Ramos Sánchez y otros).

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany* Europa, juv., 29 y 30 de septiembre (J. Martí Aledo y otros/PNAE).

1999:

Alicante. Parque Natural de El Hondo, juv., fotos, 17 de septiembre (J. Ramos Sánchez, S. Arroyo y L.F. Sarmiento).

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, laguna de El Cortalet, ad., 27 y 28 de agosto (G. Delcroix, J. Martí Aledo y otros/PNAE; J. Campderròs, A. Burgas y F. Mármol); *estany* de Túries, juv., 5 de octubre (J. Martí Aledo/PNAE).

1980:

A Coruña. Carballo, marisma de Baldaio, juv., 28 de septiembre (J. A. de Souza Bazarra, comunicado por C. D. Romai Cousido).

(Norteamérica). Interesantes conjuntos de citas, de varios años, para los humedales de Elche (Alicante) y el Ampurdán (Girona). Destacan también dos citas de provincias muy en el interior (Cuenca y Salamanca).

Correlimos Acuminado

Calidris acuminata (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Valencia. Albufera de Valencia, Sueca, *tancat* de La Longa, ad., fotos, 1 a 3 de septiembre (B. Dies, J.I. Dies y otros).

(Noreste de Siberia). Excelente observación, muy bien documentada, que es primera para España e Iberia. Este correlimos siberiano es un divagante muy raro en Europa, donde Mitchell & Young (1997) recopilan sólo 37 registros, repartidos entre Gran Bretaña (21), Noruega (4), Suecia (4), Finlandia (1), Dinamarca (2), Irlanda (1), Bélgica (1), Holanda (1), Austria (1) y Francia (1), aunque en Gran Bretaña alcanzaron 26 en el 2000 (Rogers *et al.*, 2001) y en Francia, 5 en 2001 (Frémont *et al.*, 2003). Es curioso que en Francia se hayan producido registros en los tres últimos años, y dos en este último (uno de ellos en septiembre, como el nuestro). Las áreas de invernada de esta especie, muy oriental, se sitúan en Australasia, y no está claro si las aves que nos llegan a Europa vienen todas desde el este, con el rumbo migratorio cambiado, o si bien algunas lo hacen desde el oeste, pasando sobre Norteamérica a altas latitudes (Vinicombe & Cottridge, 1996). La mayor parte de los datos, al igual que en esta primera cita española, corresponden a aves adultas y caen entre julio y septiembre.

Correlimos Falcinelo

Limicola falcinellus (PB: 10/10, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1985:

Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce, ad., foto, 17 de agosto (A. Mariscal, comunicado por M. Garrido).

(Escandinavia, Finlandia y áreas de Siberia). Una fotografía de este ejemplar está publicada en Garrido & Alba (1997).

Correlimos Canelo

Tryngites subruficollis (PB: 19/20, 0/0; C: 5/5, 0/0)

1976:

A Coruña. Arteixo, embalse de Sabón, juv., 23 de septiembre (J. A. de Souza Bazarra, comunicado por C. D. Romai Cousido).

(Norteamérica). El registro homologado más antiguo de la especie en España.

Agachadiza Real

Gallinago media (PB: 6/8, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany*s de El Matà y *clo*sa de El Puig, foto, 12 de abril (J. Martí Aledo, T. Montràs y otros).

(Desde Escandinavia y Polonia hasta Siberia occidental). Tercer registro homologado para Cataluña.

Agujeta Escolopácea

Limnodromus scolopaceus (PB: 9/9, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1975:

A Coruña. Arteixo, embalse de Sabón, juv., 7 de octubre (J. A. de Souza Bazarra, comunicado por C. D. Romai Cousido).

(NE de Siberia y extremo N de Norteamérica). Registro ya antiguo, que de hecho es el primero conocido para España y la península Ibérica.

Agujeta Escolopácea/Gris

Limnodromus scolopaceus/griseus (PB: 7/8, 0/0; C: 1/1, 0/0)

1977:

A Coruña. Santa Eugenia de Ribeira (Santa Uxía de Riveira), marisma de O Carregal, juv., 16 de septiembre (J. A. de Souza Bazarra, comunicado por C. D. Romai Cousido).

1974:

A Coruña. Carballo, marisma de Baldaio, 20 de abril (J. A. de Souza Bazarra, comunicado por C. D. Romai Cousido).

(Norteamérica y Siberia).

Archibebe Patigualdo Grande

Tringa melanoleuca (PB: 6/6, 0/0; C: 2/2, 0/0)

A Coruña. Ortigueira, ría, 8 de diciembre de 2000 a 13 de mayo de 2001 (C.O. Sterna-Ferrol, cita ya publicada en el informe de 2000).

(Norteamérica).

Archibebe Patigualdo Chico

Tringa flavipes (PB: 28/28, 4/5; C: 4/4, 1/1)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, juv. con muda iniciada, 20 y 21 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño). Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Insa, juv. en plena muda, 21 de octubre a 4 de noviembre (J. L. Rabuñal Patiño).

Alicante. Elche, El Altet, Fondet de la Senieta, dos, ambos de 1er. inv., fotos, 17 a 20 de noviembre, con

uno que continúa hasta el 14 de diciembre (J. Ramos Sánchez, A. Quiles García y otros).

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *clo*sa de El Puig, probable 1er. verano, foto, 13 a 16 de junio (J. Martí Aledo, T. Montràs y otros).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Arona, Las Galletas, charca de El Fraile, juv., 5 a 8 de octubre (D. Lupton y T. Clarke).

2000:

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Insa, juv., 21 y 22 de septiembre (J. L. Rabuñal Patiño).

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empodà, *estany*s de El Matà y proximidades, 7 a 9 de abril (J. Martí Aledo y otros/PNAE).

(Norteamérica). Año que bate todas las marcas. La cita de Alicante es la primera que, en nuestro país, hace referencia a dos aves al tiempo.

Andarríos del Terek

Xenus cinereus (PB: 28/29, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Tarragona. Delta del Ebro, 1er. inv., agosto de 2000 a 1 de marzo de 2001 (J.D. Acevedo Barberá y D. Bigas, cita ya publicada en el informe de 2000); Delta del Ebro, Sant Carles de la Ràpita, barra del Trabucador y salinas, fotos, 19 y 25 de septiembre (P. Plans Rubió; G. Rault).

Valencia. Albufera de Valencia, *marjales* de Silla y Sollana, 1er. inv., fotos, 7 a 15 de septiembre en Silla y 23 a 25 de septiembre en Sollana (B. Dies, J.I. Dies y otros).

2000:

Tarragona. Véase arriba.

1998:

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany* Europa, ad., 7 a 26 de septiembre (P. Fioramonti, J. Martí Aledo y otros).

(Siberia, Rusia europea y parte de Finlandia). Las citas peninsulares que llevamos se reparten por comunidades así: trece en Cataluña, ocho en Andalucía, cuatro en Valencia, dos en Baleares, una en Cantabria y una en Castilla-La Mancha.

Andarríos Maculado

Actitis macularia (PB: 6/6, 0/0; C: 5/6, 0/0)

1998:

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, laguna de El Gall Marí, ad., 24 de agosto (T. Montràs Janer, comunicado por J. Martí Aledo/PNAE).

(Norteamérica). Primera cita homologada para Cataluña.

Págalo Rabero

Stercorarius longicaudus (PB:22/27, 1/1; C: 2/4, 0/0)

Vizcaya. Mar al norte de Bilbao, a la vista de tierra, juv., 10 de septiembre (J. Hanlon y otros, comunicado por D. Gray/ORCA).



Andarríos del Terek *Xenus cinereus*. Delta del Ebro, septiembre de 2001. Foto: G. Rault.

2000:

A Coruña. Mar a 18 millas del cabo de Estaca de Bares, Mañón, juv., foto, 3 de septiembre (C. Vidal Rodríguez y R. Salvadores Ramos).

(Holártico boreal). La de Vizcaya es la primera cita que se homologa para el País Vasco.

Gaviota Guanaguare

Larus atricilla (PB: 19/18, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Alicante. Torrevieja, salinas, 1er. inv., foto, 18 de enero a 23 de febrero (J. Ramos Sánchez, M.Á. Pavón, S. Arroyo y A. Quiles).

(Norteamérica). Primera observación para la Comunidad Valenciana.

Gaviota Pipizcan

Larus pipixcan (PB: 4/4, 1/1; C: 2/2, 0/0)

Barcelona. El Prat de Llobregat, campos inundados de Cal Roc, 1er. verano, fotos, 11 a 19 de mayo (J. Castelló, X. Macià, M. Iranzo, R. Gutiérrez, F. López y otros).

(Norteamérica). No teníamos observaciones peninsulares de esta gaviota desde 1991, cuando, curiosamente, se vio una en la misma localidad que ahora, aunque en pleno invierno (*Ardeola*, 40: 187). Llevamos hasta el momento dos observaciones en Cataluña, tres en Andalucía y dos en Canarias.

Gaviota de Bonaparte

Larus philadelphia (PB: 6/4, 1/1; C: 1/1, 0/0)

A Coruña. Camariñas, playa de Area da Vila, 1er. inv., 27 de enero (J. L. Rabuñal Patiño).

2000:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, Los Llanos de Aridane, Puerto Naos, 1er. inv., 27 de noviembre (S.M. de Jager y P.J. Holt).

(Norteamérica). Estas son la primera cita para las islas Canarias y la cuarta para Galicia. Las otras tres que llevamos homologadas son asturianas, y corresponden probablemente a un mismo ejemplar, que se vio en Gijón entre enero y marzo de 1990 y en diciembre del mismo año. Todas nuestras citas son invernales (noviembre a marzo).

Gaviota de Delaware

Larus delawarensis (PB: 86/153, 5/5; C: 10/12, 2/1)

A Coruña. Camariñas, playa de Area da Vila, 1er. inv., foto, 30 de diciembre de 2000 (J. Martí Aledo y X. Del Acebo) y probablemente el mismo, 21 y 27 de enero (J. L. Rabuñal Patiño). Narón, Neda, ría de Ferrol, ad., 27 de enero a 9 de abril (A. Gutiérrez Pita y otros/Sterna-Ferrol). Oleiros, Santa Cruz, 1er. verano, fotos, 1 de marzo (D. González Fernández). Cariño, playa, 2.º verano, 1 de abril (A. Gutiérrez Pita y E. Fraga López/Sterna-Ferrol).

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, charca de Maspalomas, 1er. inv., 6 de enero (E. Seitz); playas de El Inglés, Juan Grande y Maspalomas, probablemente el mismo individuo, ya en muda a 1er. verano, fotos, 4 a 10 de abril (A. Michalik).

Pontevedra. Baiona, Marisma de A Ramallosa, 1er. inv., fotos, 19 de diciembre (C. Vidal Rodríguez).

2000:

A Coruña. Camariñas, véase arriba.

Pontevedra. Baiona, playa de Ladeira, 1er. inv., fotos, 24 de diciembre (C. Vidal Rodríguez y J. Fernández Leiras).

1997:

Asturias. Outur (concejo de Valdés), 2.º inv., 2 a 22 de enero (E. García Sánchez e I. Pérez Tuya).

(Norteamérica). Esta vez predominan con mucho los datos de Galicia. El de Gran Canaria es el primero homologado para esa isla.

Gaviota Groenlandesa

Larus glaucoides (PB: 19/19, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Guipúzcoa. Zumaia/Getaria, 1er. inv., fotos, 1 a 8 de febrero (A. Leiza Alberdi, J. A. Escudero e I. Manterola).

(Noreste del Canadá y Groenlandia). Tercera cita homologada para el País Vasco.

Gavión Hiperbóreo

Larus hyperboreus (PB: 70/82, 6/5; C: 3/3, 0/0).

A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira, 1er. verano, fotos, 3 de abril (A. Gutiérrez Pita, P. Gutiérrez y A. López/Sterna-Ferrol); 3er. verano, fotos, 7 de abril (A. Gutiérrez Pita, E. Fraga, P. Gutiérrez y P. Pita/Sterna-Ferrol). Cariño, playa, 1er. verano, fotos, 22 de abril (A. Gutiérrez Pita, P. Gutiérrez, P. Pita y otros/Sterna-Ferrol); Malpica de Ber-

gantiños, puerto, ad., 9 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño).

Cantabria. Santander, inm. 1er. o 2.º verano, fotos, 5 de abril (K. Shaw).

Vizcaya. Guecho (Getxo), playa de La Bola, 1er. inv., fotos, 1 de febrero (G. Ocio).

2000:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, Puerto de Tazacorte, 2.º inv., ejemplar debilitado que se lleva a un centro de recuperación y muere al poco rato, fotos, 27 de noviembre (A. Rodríguez-Cáceres y F. M. Medina/Unidad de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma).

1997:

Asturias. Carreño, ría de Aboño, ad., 16 de enero a 1 de febrero (M. A. Fernández Pajuelo, J. A. García Cañal, E. García Sánchez y M. Quintana Becerra/COA).

(Holártico circumpolar). Parece que el ejemplar de Valdoviño de 3 de abril, un primer verano, es el mismo que más tarde se vio en Cariño. A destacar la cita canaria, primera para La Palma y una de las pocas en el archipiélago.

Charrán Real

Sterna maxima (PB: 11/14, 1/1; C: 0/0, 0/0)



Gaviota Groenlandesa *Larus glaucoides*, 1.º inv. Zumaia/Getaria, febrero de 2001. Foto: A. Leiza.



Charrán Real *Sterna maxima*, ad. Tarifa, septiembre de 2001. Foto: J. Hermans.

Cádiz. Tarifa, playa de Los Lances, ad., fotos, 14 de septiembre (G. Schreur, J. Hermans y otros).

1996:

Ceuta/Cádiz. Mar de Alborán, 18-19 millas al E de Ceuta, aproximadamente 35.º56' N/4.º55' W, 9 de octubre (P. Abelló).

(América y costas de África occidental). El ave de Tarifa muestra caracteres de la subespecie africana, *albididorsalis*. El patrón que emerge de las doce citas que llevamos, de las que diez son andaluzas y otras diez caen entre junio y primeros de octubre, permite pensar en aves que se acercan en dispersión posnupcial a partir de Mauritania (la excepción es un ave recogida en Cataluña y en el mes de diciembre... ¡que resultó llevar anilla de Estados Unidos!).

Arao Aliblanco

Cephus grylle (PB 1/1, 1/1;; C: 0/0, 0/0)

Pontevedra. Baiona, mar desde cabo Silleiro, ave que pasa en vuelo a unos 600 m de distancia, 27 de diciembre (C. Vidal Rodríguez).

(Atlántico Norte y Ártico). He aquí la segunda cita española de la especie. La primera corresponde también a la provincia de Pontevedra, concretamente a un ave de primer invierno vista en Sanxenxo en 1992 ¡también un 27 de diciembre! (*Ardeola*, 41: 113). El Arao Aliblanco cría ya a partir de las islas Británicas, pero en Francia se considera invernante ocasional, con sólo 39 datos en el siglo XX y el más meridional de ellos en el departamento de Charente-Maritime (Dubois *et al.*, 2000), a bastante distancia de nuestras costas.

Tórtola Senegalesa

Streptopelia senegalensis (PB: 6/6, 2/4; C: 13/22, 1/1)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, junto a Castillo del Romeral, ave atropellada en la carretera, foto, 11 de marzo (R. Barone Tosco y D. Verde van Ouytsel).

Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce, dos, 6 y 10 de mayo (A.M. Paterson, G. Oliosio y M. Clarke).

Tarragona. Salou, parque de atracciones Port Aventura, dos, 28 de abril (I. Gámez Carmona).

(África y suroeste de Asia). **Origen desconocido.**


Añapero Yanqui

Chordeiles minor (PB: 0/0, 0/0; C: 1/1, 0/0)

1972:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Laguna, Las Mercedes, 1er. inv., encontrado muerto, fotos, diciembre (J. J. Bacallado; comunicado por J. A. Lorenzo).

(Norteamérica y Centroamérica). Primer registro para las islas Canarias y el conjunto de España (Martín & Lorenzo, 2001). De este ejemplar se habían tomado unas diapositivas, pero se creyó que correspondían a un chotacabras del género *Caprimulgus* hasta que, muchos años después, un examen atento de las mismas por parte de Juan Antonio Lorenzo descubrió la verdadera identidad. Se trata de una especie cuyas poblaciones norteamericanas migran para pasar el invierno en América del Sur, dando lugar a muy raros casos de divagancia en el Paleártico Occidental. Mitchell & Young (1997) recopilan quince registros para Europa, y Le Grand (1983), dos para las Azores, siendo todos ellos otoñales (de mediados de septiembre a principios de noviembre). Para Francia hay sólo una cita, de septiembre de 1998 (Veyrunes, 1999).



Añapero Yanqui *Chordeiles minor*. Isla de Tenerife, diciembre de 1972. Foto: J. J. Bacallado.

Vencejo de Chimenea

Chaetura pelagica (PB: 2/3, 0/0; C: 0/0, 0/0)

Corrección: las citas publicadas en el informe anterior aparecieron bajo el nombre de Vencejo Espinoso, cuando el nombre recomendado por la Sociedad Española de Ornitología (*Ardeola*, 47: 127) es el que figura arriba.

Vencejo Moro

Apus affinis (PB: 20/32, 2/2; C: 8/9, 0/0)

Cádiz. Tarifa, playa junto al camping «Río Raya», 1 de junio (S. C. V. Geelhoed, G. v. Leeuwen y W. T. de Nobel); Tarifa, Bolonia, 25 de julio (A.M. Paterson y A. Paterson Fermosell).

(África, Oriente Medio y sur de Asia). Dos nuevas observaciones en el área donde se comprobó la reproducción durante el 2000. Recientemente se ha homologado el primer registro francés, en Córcega, mayo de 2001 (Frémont *et al.*, 2003).

Bisbita de Richard

Anthus richardi (PB: 50/151, 2/4; C: 3/3, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, Castelló d'Empúries, prados de can Comes, tres (al menos dos de 1er. inv.), 23 de octubre (J. Martí Aledo).

Pontevedra. Sanxenxo, Rouxique, 1er. inv., capturado para anillamiento, fotos, 5 de diciembre

(A. Fernández Cordeiro y E. Martínez Sabarís/Grupo de Anillamiento Anduriña).

2000:

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Insua, 27 de septiembre (J. L. Rabuñal Patiño). Laxe, laguna de Traba, 7 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño).

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, prados de Can Comes, 1er. año, 20 de octubre (J. Martí Aledo/PNAE).

1999:

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Insua, 9 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño). Laxe, laguna de Traba, 30 de octubre y probablemente el mismo individuo, 6 de noviembre (J. L. Rabuñal Patiño).

(Centro y este de Asia). Al contrario que en años anteriores, ningún individuo inverna en el entorno de la laguna de Traba en 1999-2000 ni en 2000-2001, pero sí se hicieron observaciones correspondientes a los pasos otoñales. También van aquí la segunda y tercera citas homologadas para Cataluña.

Bisbita de Hodgson

Anthus hodgsoni (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2000:

Huelva. Almonte, Reserva Biológica de Doñana, Palacio de Doñana, trampeado para anillamiento, 13



Bisbita de Hodgson *Anthus hodgsoni*. Doñana, diciembre de 2000. Foto: P. J. Belman.

de diciembre (P.J. Belman, J. L. Arroyo Matos y H. Garrido Guil; J. Román).

(Asia central y oriental). Segunda observación española y primera en la península Ibérica. La anterior se produjo en la isla de Mallorca los días 10 y 11 de octubre de 1990 (*Ardeola*, 39: 80). Es una especie relativamente frecuente como divagante de otoño en Europa Occidental, y así en el Reino Unido contabilizan ya 240 citas (Rogers *et al.*, 2002) y en Francia ocho (Frémont *et al.*, 2003).

Lavandera Boyera

Motacilla flava (PB: 8/9, 0/0; C: 0/0, 0/0)

Ave con caracteres de la subespecie *Motacilla flava feldegg*:

2000:

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, lagunas de El Matà, macho, 23 de abril (J. Martí Aledo e I. Batet / PNAE).

(Europa sudoriental y Asia anterior). Nueva observación catalana, ya van cinco, y otra vez en típica fecha primaveral.

Lavandera Cetrina

Motacilla citreola (PB: 14/14, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Barcelona. Manresa, estanque de Llac de l'Agulla, juv./1er. inv., 19 de agosto (M. Llobet Marimón y A. Ollé Torner).

2000:

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, El Cortalet, juv./1er. inv., fotos, 17 de septiembre (R. Armada).

(Ucrania, Rusia oriental y Asia). En Francia llevan sólo diez citas (Frémont *et al.*, 2003).

Collalba Desértica

Oenanthe deserti (PB: 2/2, 1/1; C: 11/16, 0/0)

Barcelona. El Prat de Llobregat, aeropuerto, macho de 1er. inv., fotos, 13 a 17 de enero, probablemente ya el 3 de enero, atrapado y anillado el día 17 (F.X. Santauefemia, R. Gutiérrez, F. López y otros).

(Norte de África, Oriente Medio y suroeste de Asia). Tercera observación homologada en la Península, siendo las anteriores de Andalucía (Chiclana, 3 de abril de 1985) y las islas Columbretes (15-17 de abril de 1990). En esta ocasión la fecha es de pleno invierno. La mayor parte de las registradas en Europa son otoñales, de octubre y noviembre, pero las hay de diciembre e incluso, unas pocas, de enero (Vinicombe & Cottridge, 1996).

Carricero Agrícola

Acrocephalus agricola (PB: 5/5, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, atrapado para anillamiento, fotos, 8 de abril (O. Clarabuch, G. Gargallo y otros).

1999:

Tarragona. Delta del Ebro, Amposta, laguna de l'Encanyissada, 1er. inv., atrapado para anillamiento, fotos, 11 de diciembre (C. Jensen Marcet, T. Aparicio, J.I. Barrachina, E. Caballé, D. Espejo y otros).

(Asia, con pequeñas poblaciones en Bulgaria y Rumanía). Dos observaciones más para Cataluña, que lleva ya cuatro frente a dos Andalucía. La de los Aiguamolls es la primera que tenemos primaveral.

Curruca Sahariana

Sylvia nana (PB: 0/0, 0/0; C: 2/2, 1/1)



Carricero Agrícola *Acrocephalus agricola*. Aiguamolls de l'Empordà, abril de 2001. Foto: O. Clarabuch.

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Antigua, Caleta de Fustes, 16 de febrero (R. Åkesson).

(Sahara y Asia central). Tercera observación homologada (las anteriores en Fuerteventura, abril de 1993, y Tenerife, marzo de 1997). A Europa Occidental esta especie llega muy poco, sobre todo en el otoño y, según parece, con aves de la subespecie nominal, de distribución asiática.

Mosquitero de Pallas

Phylloscopus proregulus (PB: 4/4, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Melilla. Islas Chafarinas, isla de Isabel II, atrapado para anillamiento, fotos, 29 de abril (J. M. Igual Gómez, I. Afán y G. Martínez Salcedo).

1997:

Islas Baleares. Isla de Mallorca, Artà, Torre de Aubarca, 26 de octubre (J. Barnard).

(Centro, este y sur de Asia). Por fin una cita de otoño...

Mosquitero Bilistado

Phylloscopus inornatus (PB: 26/26, 1/1; C: 6/6, 0/0)

Castellón. Islas Columbretes, isla Grossa, 1er. inv., capturado para anillamiento, fotos, 27 de octubre (C. Jensen Marcet).

(Norte y este de Siberia y Asia central). Primer dato homologado para las Columbretes.

Papamoscas Collarino

Ficedula albicollis (PB: 25/25, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Islas Baleares. Isla de Cabrera, macho de 2.º año, atrapado para anillamiento, foto, 19 de abril (J. M. González Mulet, R. Fernández y E. Ramos); macho,

21 de abril (J. M. González Mulet, R. Fernández y E. Ramos).

2000:

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Antigua, barranco de La Torre, macho, 14 de mayo (P. Rozemeijer y W. Rummens; enviado por T. Clarke).

(Europa central y oriental y partes de Turquía, el Cáucaso e Irán). Junto a los habituales machos de primavera en Baleares, la primera cita canaria.

Alcaudón Isabel

Lanius isabellinus (PB: 3/3, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Alicante. Crevillente, Parque Natural de El Hondo, proximidades de la charca de La Raja, atrapado para anillamiento, fotos, 6 de diciembre (M. López Maciá, I. García Peiró, O. Aldeguer Peral y F. García-Gutiérrez Castejón).

(Asia). Cuarta observación española, que por primera vez tiene que ver con un ejemplar anillado. La fecha es tardía, dado que las citas otoñales en Europa suelen caer entre septiembre y mediados de noviembre (Alström *et al.*, 1991). Las nuestras anteriores corresponden a septiembre de 1994 y 1997, y a noviembre de 1999.

Corneja Cenicienta

Corvus (corone) cornix (PB: 3/3, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1993:

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany de Vilaüt*, 27 de marzo (T. Folguera y J. Martí Aledo/PNAE).

(Paleártico). Esta es sólo la tercera observación homologada para España e Iberia. Las anteriores son de Prat de Llobregat (Barcelona), 19 de abril de 1989, y Arzúa (A Coruña), 27 y 28 de abril de 1990. Las tres, por tanto, norteñas y primaverales.

Estornino Rosado

Sturnus roseus (PB: 7/7, 3/3; C: 1/1, 0/0)

Alicante. Benidorm, 15 de enero (B. Beolens y M. Beolens).

Islas Baleares. Isla de Cabrera, 12 de mayo (R. Mas y J. M. González Mulet); isla de Mallorca, Palma de Mallorca, huerto en Son Pax Vell, 5 de noviembre (R. Mas Ferrer).

(Sureste de Europa y suroeste de Asia). Este año ha sido de invasión, con grupos numerosos en Bulgaria y Rumanía, hasta 18 citas homologadas en



Camachuelo Carminoso *Carpodacus erythrinus*, juv. Villanueva del Rosario, Málaga, septiembre de 2001. Foto: J. A. Cortés.

Francia, que suman 48 aves (Frémont *et al.*, 2003) y 57 citas en Gran Bretaña (Rogers *et al.*, 2002).

Camachuelo Carminoso

Carpodacus erythrinus (PB: 18/18, 2/2; C: 0/0, 0/0)

Islas Baleares. Isla de Cabrera, juv., atrapado para anillamiento, foto, 9 de septiembre (M. McMinn, A. Rodríguez, J. A. Palomar y M. Hinojosa).

Málaga. Villanueva del Rosario, juv., atrapado para anillamiento, fotos, 12 de septiembre (J. A. Cortés y otros/Grupo de Anillamiento SEO-Málaga).

(Norte y centro de Europa, y Asia). La extensión areal de la especie hacia el oeste de Europa parece haberse detenido o incluso, dado marcha atrás. En Francia, por ejemplo, llegaron a contarse 34-37 machos cantores en 1994, pero no se ha vuelto a ver ninguno desde 1999 (Dubois *et al.*, 2001; Frémont *et al.*, 2003). De ahí probablemente nuestros cuatro registros en 1995, tres en 1996, uno en 1997, uno en 1998 y ya ninguno en 1999 y 2000.

Escribano Pigmeo

Emberiza pusilla (PB: 21/21, 3/3; C: 0/0, 0/0)

Albacete. Albacete, canal de El Salobral, 1er. inv., atrapado para anillamiento, fotos, 12 de diciembre (A.J. Lara Pomares y A. Fajardo Sánchez).

Girona. Platja d'Aro, ad., atrapado para anillamiento, foto, 27 de enero (C. Álvarez Cros, M. Álvarez Cros, J. M. Bas Lay, P. Pons y C. Wendenburg).

Islas Baleares. Isla de Cabrera, 1er. inv., atrapado para anillamiento, foto, 1 de octubre (M. McMinn, A. Rodríguez Molina, J. A. Palomar y M. Hinojosa).

(Nordeste de Europa y Siberia). La observación de Girona es plenamente invernal, la primera que tenemos para el mes de enero.

Escribano Carirrojo

Emberiza bruniceps (PB: 3/3, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1967:

Cádiz. Sanlúcar de Barrameda, macho, piel en la colección de la Estación Biológica de Doñana (n.º 21297A), fotos, en la etiqueta figura 10 de noviembre (pero ver abajo) y como colector, Luis Hidalgo (L. Hidalgo; fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(Asia central y oriental). **Origen desconocido.** Este ejemplar es el mismo que Hidalgo (1971) señala como capturado cerca de la playa de Sanlúcar de Barrameda «entre 20 y 29 de octubre de 1967» y que se conservó vivo durante mucho tiempo, pasando tras su muerte a formar parte de la colección de la EBD. En las etiquetas aparece como hembra, pero su plumaje es de macho. Las otras dos observaciones homologadas corresponden a Cataluña, de donde además se conoce la cita de un macho cogido en Masnou (Barcelona) el 12 de noviembre de 1962 (Maluquer, 1967).

B) ESPECIES CONSIDERADAS SÓLO PARA LAS ISLAS CANARIAS

Tarro Blanco

Tadorna tadorna (1/2, 2/2)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, embalse de Ayagaures, macho ad., vídeo, 7 a 13 de enero (J. García Monzón y otros); San Bartolomé de Tirajana, Aldea Blanca, hembra ad., vídeo, 1 a 6 de diciembre (M. A. Suárez Farias, J. García Monzón y otros).

(Europa y Asia). **Origen desconocido.** Cerca hay una colección zoológica (información de Juan Antonio Lorenzo) y la cita anteriormente homologada corresponde sospechosamente a esa misma localidad.

Cernícalo Patirrojo

Falco vespertinus (1/1, 1/1)

Las Palmas. Isla de Lanzarote, mar a unas 20 millas al norte del islote de Alegranza, macho de 1er. verano, foto, se posa en un barco de pesca y es entregado a la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote (E. Mateo, comunicado por J. A. Lorenzo Gutiérrez).

(Este de Europa y Asia). La anterior observación homologada también es de Lanzarote.

Archibebe Fino

Tringa stagnatilis (1/1, 1/1)

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Triquivijate, 18 de abril (J.C. Warwick y S.P. Warwick).

(Europa oriental y sur de Siberia). El anterior también de Fuerteventura, pero en diciembre.

Gaviota Picofina

Larus genei (1/1, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Santa Cruz, playa de Las Teresitas, ad., 22 de enero (P. Hottola, remitido por T. Clarke).

(África occidental, sur de Europa y oeste de Asia). La cita homologada previa corresponde igualmente a Tenerife.

Pagaza Piquirroja

Sterna caspia (0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, desembocadura del barranco de Tirajana, ad., fotos y vídeo, 1 a 31 de diciembre (M. A. Suárez Farias, J. García Monzón, A. Hernández Cordero y otros).

(Europa en los mares Báltico y Negro, y puntos de Asia, África, Madagascar, Australasia y Norteamérica). Primera cita homologada para las Canarias. Las aves europeas descienden en invierno hasta el África

Occidental tropical, aunque algunas permanecen ya en el suroeste de Iberia. Además, cerca de Canarias hay una pequeña población reproductora, en el Bac d'Arguin, Mauritania. Como accidental se ha citado la especie en Madeira y Cabo Verde (Snow & Perrins, 1998).

Curruca Mirlona

Sylvia hortensis (0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, Telde, campo de golf de Cortijo, macho ad., 9 de noviembre (M. A. Suárez Farias).

(Sur del Paleártico, desde Iberia y el Magreb hasta Pakistán). Primera observación homologada para Canarias, de donde se conocen muy pocos registros previos (Martín & Lorenzo, 2001). Hay también citas en Madeira (Snow & Perrins, 1998). Poblaciones nidificantes muy próximas a las islas Canarias aparecen en el sur de Marruecos.

REGISTROS NO HOMOLOGADOS

1960: Curruca Sarda *Sylvia sarda*; L'Estartit (Girona), hembra, 23 de mayo (sólo un dibujo, muy detallado, que muestra rasgos que no están de acuerdo con la especie; la cita es una de las varias que se señalaron para la Costa Brava entre 1960 y 1965, citas que hoy en día no parecen plenamente fiables; véase Wallace & Sage, 1969, y Shirihai *et al.*, 2001).

1971: Vencejo Moro *Apus affinis*; Cortijo de la Plata, Zahara de los Atunes (Cádiz), 24 de marzo (descripción demasiado breve, aunque los pocos rasgos anotados concuerdan con la especie).

1992: Pigargo Europeo *Haliaeetus albicilla*; Bunyola, Mallorca (Islas Baleares), ad., 6 de agosto (descripción insuficiente).

1994: Águila Pomarina *Aquila pomarina*; península de Formentor, Mallorca (Islas Baleares), cuatro, dos ads. y dos juvs., 22 a 29 de septiembre (la descripción no permite excluir al Águila Moteada *A. clanga*, siendo, por otra parte, extraño el número de aves involucrado). **Gaviota Groenlandesa** *Larus glaucooides*; Zumaia (Guipúzcoa), 2.º inv., foto, mes de mayo (la foto, excelente, corresponde a un individuo albino de otra especie grande de gaviota, tipo *Larus cachinnans*).

1998: Chorlito Mongol Chico *Charadrius mongolus*; Corralejo, isla de Fuerteventura (Las Palmas), 26 de abril (descripción excesivamente superficial). **Avión Roquero Africano** *Ptyonoprogne fuligula*; Cañada de Las Norias, El Ejido (Almería), dos, fotos, 2 de mayo (descripción muy breve, y fotos en vuelo que parecen corresponder mejor a *P. rupestris*, especialmente porque axilares e infracorberteras alares se ven muy oscuras por comparación al resto del ala; una nota sobre esta observación, con fotos,

se ha publicado en *Kartierung medit. Brutvögel*, 2: 39-43).

1999: Paño de Madeira *Oceanodroma castro*; playa de Los Lances, Tarifa (Cádiz), cadáver en la playa, 4 de noviembre (la descripción no permite excluir satisfactoriamente otras especies de paños). **Correlinos Común** *Calidris alpina hudsonia*; El Médano, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 20 de diciembre (descripción insuficiente). **Correlinos Cuchareta** *Eurynorhynchus pygmaeus*; salinas de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), tres, vídeo, 16 de septiembre (la calidad del vídeo no permite seguridad sobre la identificación, y se trata de una especie muy rara, nunca antes señalada en el Paleártico Occidental). **Alondra de Dupont** *Chersophilus duponti*; península de Jandía, isla de Fuerteventura (Las Palmas), dos, aparente comportamiento de cría, 17 de marzo (información insuficiente para tratarse de una especie nunca antes citada en las islas Canarias). **Cascanueces** *Nucifraga caryocatactes*; Aprikan, Valle de Koartango (Álava), 27 de noviembre (descripción insuficiente).

2000: Busardo Calzado *Buteo lagopus*; estany Puudent, isla de Formentera (Islas Baleares), 11 de noviembre (descripción insuficiente). **Halcón Borní** *Falco biarmicus*; P.I.R.S. (Tajo), isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 22 de noviembre (descripción insuficiente). **Correlinos de Alaska** *Calidris mauri*; O Grove (Pontevedra), 1er. inv., 21 de noviembre (observación breve y descripción que no permite seguridad). **Bisbita de Richard** *Anthus richardi*; El Rocío, Almonte (Huelva), dos ads., 30 de diciembre (descripción insuficiente).

2001: Zampullín Cuellirrojo *Podiceps auritus*; bahía de Roses, Castelló d'Empúries (Girona), dos ads., 3 de febrero (descripción insuficiente). **Pardela Chica** *Puffinus assimilis*; mar a unas 80 millas náuticas al N de Santander (Cantabria), 16 de agosto (descripción insuficiente). **Rabijunco Etéreo** *Phaethon aethereus*; Arrecife, isla de Lanzarote (Las Palmas), dos ads., mes de marzo (descripción insuficiente). **Avetoro Lentiginoso** *Botaurus lentiginosus*; junto a la Estanca de Dos Reinos, Carcastillo (Navarra), ad., 15 de junio (descripción insuficiente y fecha atípica). **Garceta Dimorfa** *Egretta gularis*; embalse de Brozas (Cáceres), ad., foto, 14 de septiembre (observación lejana, con descripción y foto que no permiten descartar un ejemplar híbrido). **Ánsar Chico** *Anser erythropus*; laguna, Boada de Campos (Palencia), ad., 6 de febrero (descripción insuficiente). **Silbón Americano** *Anas americana*; desembocadura del Guadalhorce (Málaga), hembra, 21 de octubre (la descripción no excluye plenamente un hembra de Silbón Europeo *Anas penelope*). **Tarro Canelo** *Tadorna ferruginea*; playa de Los Lances, Tarifa (Cádiz), cuatro, 30 de diciembre (descripción insuficiente). **Pato Havelda** *Clangula hyemalis*; Costa Tequise, isla de Lanzarote (Las Palmas), dos, 9 de junio (descripción muy incompleta y localidad y fecha del

todo atípicas). **Pigargo Vocinglero** *Haliaeetus vocifer*; Castilblanco (Badajoz), foto, 16 de julio (ni la foto, muy lejana, ni la descripción permiten asegurar la identidad del ave). **Gavilán Griego** *Accipiter brevipes*; Sant Fruitós de Bages (Barcelona), macho, 1 de agosto (descripción insuficiente). **Busardo Calzado** *Buteo lagopus*; Malgrat de Mar (Barcelona), 22 de diciembre (algunos de los rasgos señalados no se ajustan a la especie). **Águila Moteada** *Aquila clanga*; Desierto de las Palmas (Castellón), 25 de septiembre (información insuficiente). **Halcón Bor-ni** *Falco biarmicus*; entre Navalvillar de Pela (Badajoz) y Logrosán (Cáceres), macho, foto y vídeo, 17 y 31 de enero (la documentación disponible no permite eliminar otras posibilidades, incluyendo las de un híbrido como los que se emplean en cetrería); Cabo de Gata (Almería), 23 de marzo (la descripción corresponde esencialmente a un ad. de la especie, pero algunos rasgos, en especial un fuerte contraste entre las primarias oscuras y el resto del ala, no están de acuerdo y, como en el caso anterior, sugieren la posibilidad de un híbrido). **Gaviota Cabecinegra** *Larus melanocephalus*; Telde, isla de Gran Canaria (Las Palmas), ad., 11 de noviembre (descripción insuficiente). **Gaviota de Delaware** *Larus delawarensis*; Marismas del Odiel (Huelva), ad., 21 de marzo (descripción insuficiente); río Guadiana a su paso por Badajoz (Badajoz), 1er. inv., 11 de noviembre (algunos rasgos, por ejemplo tamaño como de Gaviota Sombría *L. fuscus*, están en desacuerdo con la especie). **Vencejo Moro** *Apus affinis*; El Hondo de Amorós, San Fulgencio (Alicante), dos, 5 de mayo (la descripción señala ausencia de color blanco en la región gular, lo que no es propio de esta especie). **Bisbita de Richard** *Anthus richardi*; proximidades de la laguna de La Tancada, delta del Ebro (Tarragona), 21 de febrero a 1 de marzo (aunque algunos rasgos, entre ellos la voz, apuntan ciertamente al Bisbita de Richard, la descripción no permite una seguridad total); Formentor, Pollensa (Pollença) (Islas Baleares), 6 de mayo (la descripción sugiere la posibilidad de un Bisbita Campestre *Anthus campestris* de 2.º año calendario). **Lavandera Boyera** *Motacilla flava feldegg*; Parc Natural del Cap de Creus, Roses (Girona), macho, 5 de mayo (la tonalidad gris que la descripción señala para la nuca corresponde más bien a la raza *thunbergi*, algunos de cuyos machos presentan cabeza muy negra). **Carricero Agrícola** *Acrocephalus agricola*; Constantina (Sevilla), 16 de agosto (descripción insuficiente). **Mosquitero Tro-quiloide** *Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus*; Marjal del Moro, Sagunto (Valencia), 1er. inv., 22 de octubre (la descripción no permite descartar al Mosquitero Bilstado *Phylloscopus inornatus*). **Papamoscas Papirrojo** *Ficedula parva*; mar a 19 millas al oeste de Formentera (Islas Baleares), macho ad., 18 de noviembre (malas condiciones de observación y descripción breve, que no concuerda del todo con la especie).

RECONSIDERACIÓN DE REGISTROS DE INFORMES ANTERIORES

1990: Polluela Sora *Porzana carolina*; delta del Llobregat (Barcelona), ad., 25 de abril (cita publicada en *Ardeola*, 39: 77). El autor de la observación no ofrece suficientes garantías y algunos rasgos de la descripción no se ajustan a los conocimientos actuales sobre la identificación de la especie.

BIBLIOGRAFÍA

- ALSTRÖM, P., COLSTON, P. & LEWINGTON, I. 1991. *A field guide to the rare birds of Britain and Europe*. HarperCollins Publishers. London.
- AMAT, J. A. (1979a). Captura de *Porphyryla alleni* en las Marismas del Guadalquivir. *Doñana, Acta Vertebrata*, 6: 131.
- BERGIER, P., FRANCHIMONT, J., THÉVENOT, M. et la Commission d'Homologation Marocaine. 2000. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine Numéro 5 (1999). *Porphyrio*, 12: 47-56.
- CALDERÓN, J. 1976. Segunda cita en España de *Porphyryla alleni* (Thomson, 1842). *Doñana, Acta Vertebrata*, 3: 99-101.
- CASTROVIEJO, J. 1971. Primeras capturas del Anser indico (*Anser indicus*) y de la Barnacla cuellirroja (*Branta ruficollis*) en España. *Alauda*, 39(1): 74-77.
- CLAVELL I CORBERA, J. (2002). *Catàleg dels ocells dels Països Catalans*. Lynx Edicions. Barcelona.
- COSTA, H., BOLTON, M., CATRY, P., MATIAS, R., MORE, C. C. & TOMÉ, R. 2000. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Rareidades referente aos anos de 1997 y 1998. *Pardela*, 9: 3-27.
- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. & SARGATAL, J. (eds.) 1996. *Handbook of the Birds of the World*, vol. III. Lynx, Barcelona.
- DUBOIS, P. J., LE MARÉCHAL, P., OLIOSO, G. & YÉ-SOU, P. 2000. *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan. París.
- FERRER, X., MARTÍNEZ-VILALTA, A. & MUNTANER, J. 1986. *Història natural dels Països Catalans*. Vol. 12, Ocells. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
- FRÉMONT, J.-Y. et le CHN. 2002. Les oiseaux rares en France en 2000. *Ornithos*, 9(1): 2-33.
- FRÉMONT, J.-Y. et le CHN. 2003. Les oiseaux rares en France en 2001. *Ornithos*, 10(2):49-83.
- GARCÍA, L., CALDERÓN, J. & CASTROVIEJO, J. 1989. *Las aves de Doñana y su entorno, con especial referencia a la invernada 1985/86*. Cooperativa Marismas del Rocío, El Rocío (Huelva).
- GIL LLETGET, A. 1945. Sinopsis de las aves de España y Portugal. *Trab. Inst. Cienc. Nat. «José de Acosta»*, tomo I n.º 2, Madrid.

- GARRIDO, M. & ALBA, E. 1997. *Las aves de la provincia de Málaga*. Diputación Provincial de Málaga. Málaga.
- GUIRAO, A. 1859. Catálogo metódico de las aves observadas en una gran parte de la provincia de Murcia. *Mems. R. Acad. Ciencias E. F. y N.*, tomo IV, parte 3.^a.
- HIDALGO, J. & RODRÍGUEZ, P. 1971. Captura de un *Anser erythropus* en las marismas del Guadalquivir. *Ardeola*, 16: 254-255.
- HIDALGO, L. 1971. Captura de un *Emberiza aureola* en Cádiz. *Ardeola*, 15: 155-156.
- HIRALDO CANO, F. 1971a. Primera captura segura de *Egretta gularis gularis* en España. *Ardeola*, 15: 103-107.
- HIRALDO CANO, F. 1971b. Observaciones y capturas en las Marismas del Guadalquivir de *Anatidae* raras o excepcionales en la Península Ibérica. *Ardeola*, 15: 121-122.
- IRBY, L. H. 1895. *The Ornithology of the Straits of Gibraltar*, 2.^a ed. Taylor & Francis, Londres.
- LE GRAND, G. 1983. Bilan des observations sur les oiseaux d'origine néarctique effectuées aux Açores (jusqu'en janvier 1983). *Rev. Univ. Açores Ser. Cienc. Nat.*, 4: 73-83.
- MALUQUER MALUQUER, S. (1964). Primera captura de *Emberiza bruniceps* en la Península Ibérica. *Ardeola*, 9: 156-157.
- MARTÍN, A. & LORENZO, J. A. 2001. *Aves del archipiélago Canario*. Francisco Lemus, Editor. La Laguna.
- MITCHELL, D. & YOUNG, S. 1997. *Photographic handbook of the birds of Britain and Europe*. New Holland. London.
- REBASSA, M. 2001. Observació d'una àguila marina *Haliaeetus albicilla* a Mallorca l'hivern 2001-2002. *Anuari Ornitològic de les Balears*, 16: 29-34.
- ROGERS, M. J. and the Rarities Committee. 2001. Report on rare birds in Great Britain in 2000. *British Birds*, 94: 452-504.
- ROGERS, M. J. and the Rarities Committee. 2002. Report on rare birds in Great Britain in 2001. *British Birds*, 95: 476-528.
- SHIRIHAI, H., GARGALLO, G., HELBIG, A., HARRIS, A. & COTTRIDGE, D. 2001. *Sylvia warblers: identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia*. Christopher Helm, London.
- SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (eds.) 1998. *The birds of the Western Palearctic. Concise edition*. Oxford University Press. Oxford.
- TAYLOR, B. & VAN PERLO, B. 1998. *Rails. A guide to the rails, crakes, gallinules and coots of the world*. Pica Press. Mountfield.
- TRUJILLO, D., BARONE, R. & SIVERIO, F. 1995. Aves nuevas: Zampullín Picogruaso *Podilymbus podiceps*. *La Garcilla*, 94: 30-31.
- VALVERDE, J. A. 1959. Cuatro interesantes especies en Andalucía. 1. Captura de *Geronticus eremita* en las marismas del Guadalquivir. *Ardeola*, 5: 143-145.
- VALVERDE, J. A. 1960. *Vertebrados de las Marismas del Guadalquivir*. Archivos del Instituto de Aclimatación, CSIC. Almería.
- VEYRUNES, F. 1999. Un Engoulevent d'Amerique *Chordeiles minor* à Ouessant: première mention française. *Ornithos*, 6: 134-135.
- VINICOMBE, K. & COTTRIDGE, D. 1996. *Rare birds in Britain and Ireland. A photographic record*. HarperCollins Publishers. Londres.
- WALLACE, D. I. M. & SAGE, B. L. (1969). Las aves de la Costa Brava (Cataluña). *Ardeola*, 13: 151-170.