ISQUEMIA AGUDA DE LOS MIEMBROS

Es la interrupción brusca del aporte sanguíneo miembro por obstrucción súbita de una arteria

ISQUEMIA AGUDA DE LOS MIEMBROS

- Es la 2^a causa de mortalidad en patología arterial después de los AAA.
 - Precisa de tratamiento urgente.
 - Si es dentro de las primeras 6 horas, disminuye la morbimortalidad de forma significativa.
-

ISQUEMIA AGUDA DE LOS MIEMBROS

- ❑ A las tres horas: deficit neurológico periférico (parestesias) por isquemia de nervios sensitivos
 - ❑ A las 6 horas: deficit de motilidad, necrosis muscular, acidosis metabólica, mioglobinuria, IRA
 - ❑ Si se revasculariza: normalidad.
-

ETIOLOGÍA

EMBOLIA

TROMBOSIS

TRAUMATISMO

EMBOLIA

- Es el desprendimiento de un fragmento de un trombo y que se va a enclavar a distancia dónde el vaso es más pequeño que el fragmento que navega por el árbol arterial.
-

Embolia: Causas

- ❑ Cardiopatías (85%): Cardiopatía en F.A., arritmias, infarto antiguo, miocardiopatías, endocarditis, tumores cardíacos (mixomas auriculares)
 - ❑ Arteriales: aneurismas, placas de ateroma, úlceras arteriales
 - ❑ Venosas: embolia paradójica
 - ❑ Otras: tumores, gas, grasa.. Traumatismos.
-

TROMBOSIS ARTERIAL

- Oclusión aguda de una arteria por la formación de un trombo in situ

 - ETIOLOGÍA:
 - ATEROSCLEROSIS: 80%
 - ANEURISMAS ARTERIALES
 - TRAUMATISMOS
-

ISQUEMIA AGUDA. CLÍNICA Y EXPLORACIÓN

- Dolor súbito constante
 - No tolera el decúbito. Cuelga el pie de la cama.
 - Palidez, Parestesias, Impotencia funcional, Disminución de la movilidad, Disminución de la temperatura, Ausencia de pulsos distales a la obstrucción
 - Afectación sistémica si evoluciona.
-

Diagnóstico

- ❑ Clínica, exploración
 - ❑ Antecedentes de cardiopatía, no antecedentes de claudicación, exploración normal en el miembro contralateral = embolia, sino trombosis.
 - ❑ Doppler: ausencia de flujo (no circulación colateral)
 - ❑ Arteriografía: obligatoria en caso de sospecha de trombosis. En casos de embolias, si se sospecha en otros territorios.
-

TRATAMIENTO. EMBOLIA.

- ❑ Anticoagulación: heparina sódica iv
- ❑ Embolectomía con catéter de Fogarty
- ❑ Trombolisis con urokinasa (?)

- ❑ ANTICOAGULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL FOCO EMBÓLICO
-

TRATAMIENTO. TROMBOSIS

- Anticoagulación con heparina sódica iv
 - Arteriografía
 - Cirugía arterial directa:
 - By pass venoso, prótesis (dacron, ptfe)
 - Tromboendarterectomía.
 - Trombolisis con urokinasa, ATP, stent.
-

ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA

- ❑ Oclusión brusca de la arteria mesentérica superior, generalmente por embolia. Más raro por trombosis.
 - ❑ Cuadro de máxima gravedad que conduce a la muerte del paciente en pocas horas si no se trata.
-

Clínica. Exploración

- Dolor abdominal brusco, después continuo de difícil localización.
 - Defensa abdominal no localizable.
 - Distensión abdominal
 - Sensación de enfermedad grave.
 - Silencio abdominal
 - Diarrea (a veces)
-

Diagnóstico

- Clínica, exploración.
 - Antecedentes de cardiopatía embolígena.
 - Asintomático previamente.
 - Si antecedentes de angina intestinal: trombosis.
 - Analítica: Leucocitosis (30.000), acidosis metabólica que no revierte con bicarbonato.
 - Rx simple de abdomen (silencio abdominal, niveles, gas en Porta).
 - Arteriografía urgente.
-

Tratamiento

- ❑ Embolia: embolectomía mesentérica superior con cateter de Fogarty
 - ❑ ¿Trombolisis con urokinasa in situ?

 - ❑ Trombosis: by pass aorto-mesentérico (vena, prótesis). TEA (lesiones cortas)
 - ❑ Trombolisis(?) ATP, Stent.
-

Tratamiento

- ❑ Second look:
 - ❑ Después de revascularización: si no hay recuperación completa, reabrir a las 24 horas y proceder: resección intestinal de los segmentos no recuperados.
 - ❑ Si se plantea second look, NUNCA obviarlos.
-