

OBSERVACIONES DE AVES RARAS EN ESPAÑA, 2002

Eduardo DE JUANA*
y el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología

RESUMEN.—*Observaciones de aves raras en España, año 2002.* Informe número 19 del Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología. Presenta 263 registros nuevos, correspondientes a 109 especies, con un porcentaje de aceptación del 79,5%. Contiene los primeros registros homologados para España de seis especies: Petrel Antillano *Pterodroma hasitata* (Galicia), Correlimos Batitú *Bartramia longicauda* (Canarias), Pájaro-gato Gris *Dumetella carolinensis* (Canarias), Ruiseñor azul *Luscinia cyane* (Cataluña), Zorzal Papi-negro *Turdus ruficollis atrogularis* (Cataluña) y Carricero de Blyth *Acrocephalus dumetorum* (Andalucía). También son de especial interés las segundas observaciones homologadas de Avetorillo Plomizo *Ixobrychus sturmi*, Tórtola Oriental *Streptopelia orientalis* y Mosquitero Sombrío *Phylloscopus fuscatus*, y las terceras de Piquero Pardo *Sula leucogaster*, Negrón Común de la subespecie americana *Melanitta nigra americana* y Bisbita de Hodgson *Anthus hodgsoni*, así como la primera para Canarias del Avetoro Lentiginoso *Botaurus lentiginosus* y la primera para Baleares de la Agujeta Escolopácea *Limnodromus scolopaceus*. El Comité ha decidido retirar de la lista de especies sometidas a homologación, a partir del año 2005, al Zampullín Cuellirrojo *Podiceps auritus* y, con relación a las islas Canarias, a la Cerceta Pardilla *Marmaronetta angustirostris* y la Tórtola Senegalesa *Streptopelia senegalensis*.

SUMMARY.—*Report on rare birds in Spain in 2002.* This is the 19th annual report of the Spanish Ornithological Society's Rarities Committee. It considers 263 new records pertaining to 109 species, with an acceptance rate of 79.5%. Species new to the Spanish list are Capped Petrel *Pterodroma hasitata* (Galicia), Upland Sandpiper *Bartramia longicauda* (Canary Islands), Grey Catbird *Dumetella carolinensis* (Canary Islands), Siberian Blue Robin *Luscinia cyane* (Catalonia), Dark-throated Thrush *Turdus ruficollis atrogularis* (Catalonia) and Blyth's Reed Warbler *Acrocephalus dumetorum* (Andalucía). Here included there are also the second accepted records of Dwarf Bittern *Ixobrychus sturmi*, Oriental Turtle Dove *Streptopelia orientalis* and Dusky Warbler *Phylloscopus fuscatus*, and the third ones for Brown Booby *Sula leucogaster*, the American race of the Common Scoter *Melanitta nigra americana* and the Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*, as well as the first accepted record of American Bittern *Botaurus lentiginosus* in the Canary Islands and the first of Long-billed Dowitcher *Limnodromus scolopaceus* in the Balearics. From 2005 onwards the Spanish Rarities Committee will no longer consider the Slavonian Grebe *Podiceps auritus* and, regarding to the Canaries, the Marbled Teal *Marmaronetta angustirostris* and the Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*.

INTRODUCCIÓN

Este es el informe número 19 del Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología. Sale con algún retraso con respecto al calendario habitual, puesto que se publica en el segundo número anual de *Ardeola* en lugar de en el primero, pero tal retraso, que tiene que ver con las celebraciones durante el presente año del 50 aniversario de la Sociedad, confiamos en recuperarlo pronto al publicar el informe del 2003 en el primer número del *Ardeola* de 2005. Contiene el presente informe 263 registros nuevos, que tratan sobre un total de 109 especies. Con respecto a otros años son cifras prácticamente idénticas a las del 2001, que fue espe-

cialmente bueno (260 registros y 108 especies), y confirma así la tendencia al alza que se registra en los últimos tiempos. En la contabilidad no se incluyen algunos registros que por afectar tanto a 2002 como a 2001 ya se publicaron en el informe anterior y vuelven a aparecer en éste.

Se homologan en total 209 registros, correspondientes a 91 especies. El índice de aceptación resulta así de un 79,5%, inferior al 84,2% del 2001, pero muy similar al del conjunto de los últimos años.

En todos los informes aparecen citas especialmente relevantes, en general por ser las primeras que se homologan para nuestro país con relación a determinadas especies. En este sen-

* Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología, 9ª planta. Universidad Complutense de Madrid. C/. José Antonio Novais, 2. E-28040 Madrid, España. E-mail: edejuaana@bio.ucm.es

tido el actual viene cargado de primicias, con nada menos que seis especies que se incorporan a la lista española: Petrel Antillano *Pterodroma hasitata* (observado en alta mar frente a las costas de Galicia), Correlimos Batitú *Bartramia longicauda* (islas Canarias), Pájaro-gato Gris *Dumetella carolinensis* (también en Canarias), Ruiseñor azul *Luscinia cyane* (Cataluña), Zorzal Papinegro *Turdus ruficollis atrogularis* (Cataluña) y Carricero de Blyth *Acrocephalus dumetorum* (Andalucía). También contiene el informe las segundas observaciones homologadas de Avetorillo Plomizo *Ixobrychus sturmi*, Tórtola Oriental *Streptopelia orientalis* y Mosquitero Sombrío *Phylloscopus fuscatus*, y las terceras de Piquero Pardo *Sula leucogaster*, Negrón Común de la subespecie americana *Melanitta nigra americana* y Bisbita de Hodgson *Anthus hodgsoni*. Así como, con referencia a nuestros archipiélagos, las primeras de Avetoro Lentiginoso *Botaurus lentiginosus* para Canarias y de Agujeta Escolopácea *Limnodromus scolopaceus* para Baleares. Especial interés tiene también a nuestro juicio la observación de un águila en Doñana aparentemente híbrida entre Águila Moteada *Aquila clanga* y Águila Pomerana *Aquila pomarina*.

Hubo con relación al ejercicio del 2002 una renovación en el seno del Comité. Después de nada menos que 15 años causó baja José Luis Rabuñal Patiño, que por otra parte ha sido en este tiempo el observador que, con diferencia, ha aportado mayor cantidad de citas propias. La extraordinaria calidad de sus descripciones de campo sólo tiene parangón en el cuidado, ponderación y ecuanimidad que ha sabido aplicar a la hora de evaluar las de otros observadores. Para los demás miembros del Comité de Rarezas, José Luis ha sido en este largo tiempo, desde 1988, un verdadero maestro además de un excelente compañero. Vaya para él desde aquí, por lo tanto, nuestro más profundo agradecimiento. Para sustituirlo se incorporó Pablo Gutiérrez Varga (de Ferrol, provincia de A Coruña). Los otros componentes del Comité durante este ejercicio 2002 fueron David Bigas i Campas (Deltebre, Tarragona), José Ignacio Dies Jambro (Valencia), Elías García Sánchez (Oviedo), Gorka Gorospe Rombouts (Pamplona), Ricard Gutiérrez Benítez (Barcelona) y Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez (La Laguna, Tenerife). Como Secretario actuó un año más Eduardo de Juana y como Secretario

Adjunto, por primera vez, Ricard Gutiérrez. Nuevamente se pudo contar con la muy eficaz ayuda en las tareas de secretaría de Ángela García López.

Tal como anunciábamos en el informe anterior, en este año pusimos en marcha un nuevo procedimiento para circular y evaluar los registros vía internet, del que se responsabilizó el citado Secretario Adjunto. Pese a haber padecido serios problemas con los equipos informáticos, que ralentizaron todo el proceso, el procedimiento en cuestión ha parecido muy prometedor, sobre todo por la rapidez que proporciona —en ausencia de problemas— y las facilidades que comporta de cara a los observadores que han conseguido reunir suficientes pruebas fotográficas. De manera que nuestra intención es mantenerlo y aún potenciarlo de cara al futuro. Recordamos que este procedimiento se apoya en la página web personal www.rarebirdspain.net.

Otra de las tareas llevadas a cabo últimamente por el Comité de Rarezas ha sido la actualización de la Lista Patrón de las Aves de España, por encargo de la Junta Directiva de SEO/BirdLife. Para ello el Comité designó a una parte de sus miembros —Eduardo de Juana, Ricard Gutiérrez y Juan Antonio Lorenzo— e invitó a colaborar a Jordi Clavell y José Luis Copete, miembros del Grupo de Aves Exóticas (GAE), un grupo de trabajo de SEO especializado en la recopilación y estudio de observaciones referentes a especies de aves exóticas (individuos escapados o liberados). De cara a dicha lista, ya próxima a publicarse, se decidió seguir al pie de la letra las recomendaciones en materia taxonómica emanadas de la Asociación de Comités de Registros y Rarezas Europeos (AERC), que en estos momentos cuenta con un Comité Asesor Taxonómico (AERC-TAC) formado por las entidades equivalentes de los comités británico (BOURC-TSC), francés (CAF), holandés (CSNA) y sueco (STC-Tk), y por el investigador alemán Dr. Andreas Helbig. Estas recomendaciones, apoyadas por amplios razonamientos y exhaustiva bibliografía, pueden consultarse en la página web de la AERC, www.aerc.be. Como es lógico, el presente informe se adecua ya a la nueva lista y a las citadas recomendaciones taxonómicas, entre las que se cuenta una nueva secuencia con Anseriformes y Galliformes por delante de los demás órdenes.

Con relación a la lista de aves sometidas a homologación, o lista de rarezas, el Comité ha decidido retirar al Zampullín Cuellirrojo *Podiceps auritus* para el conjunto de España y a la Cerceta Pardilla *Marmaronetta angustirostris* y a la Tórtola Senegalesa *Streptopelia senegalensis* para las Canarias. Mientras la Cerceta Pardilla no era rareza en el resto de España, la Tórtola Senegalesa sí, por lo que seguirá siendo considerada con relación a la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. Estas retiradas se harán efectivas a partir del 1 de enero de 2005, de manera que desde entonces el Comité de Rarezas sólo pedirá y estudiará las citas sobre estas especies correspondientes a 2004 o años anteriores.

El Comité de Rarezas se ha reunido en los últimos tiempos en dos ocasiones, la primera en el delta del Ebro en marzo de 2003 y la segunda en Cabañeros en octubre de 2004, y desea agradecer las facilidades prestadas para ello por, respectivamente, el Parque Natural del Delta del Ebro y el Parque Nacional de Cabañeros. También, un año más, agradece la ayuda de SEO/BirdLife y la colaboración de los observadores que han sometido sus citas a evaluación, sin los cuales el presente informe sencillamente no habría existido.

LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTROS HOMOLOGADOS

La lista que sigue se ha elaborado de acuerdo con los siguientes criterios:

- En cada observación se consignan, por orden, 1) provincia; 2) localidad; 3) número de aves observadas (si no se indica otra cosa es una sola), 4) edad y sexo si se conocen (para datos primaverales-estivales sólo se expresa edad cuando no se trata de plumaje nupcial); 5) indicaciones en el caso de que el ave o aves hubieran sido cazadas, trampeadas o encontradas muertas, y si se conservan y dónde, y asimismo, si existen fotografías entre la documentación en poder del Comité; 6) fecha(s); 7) observador(es), en general no más de tres.
- Se publican sólo datos considerados seguros, aunque también observaciones indeterminables a nivel específico en gé-

neros de gran dificultad como *Diomedea* (albatros) o *Limnodromus* (agujetas).

- Las cifras entre paréntesis dispuestas a continuación del nombre de la especie indican los registros/individuos homologados ya por el Comité para los conjuntos de España peninsular-islas Baleares (PB) y Canarias (C) en: 1) años anteriores a 2002; 2) año 2002 (sin incluir los registros de 2001-2002 que ya aparecieron en el informe de 2001).
- De no mediar indicación en otro sentido las fechas se refieren todas a 2002.
- La secuencia taxonómica seguida es la de Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic*, 1978), con las modificaciones acordadas por la AERC (www.aerc.be).
- Un breve comentario sobre cada especie intenta situar las observaciones consideradas en relación a lo que se conoce sobre el estatus de la especie en España y a lo ya dicho en informes anteriores, indicando al principio, entre paréntesis, lo esencial del área de cría en el mundo.

La propiedad de los datos contenidos en el informe corresponde a los diferentes observadores, que deben ser citados como autores en la bibliografía.

A) ESPECIES CONSIDERADAS PARA EL CONJUNTO DE ESPAÑA

Ánsar Piquicorto

Anser brachyrhynchus (PB: 24/30, 3/3; C: 0/0, 0/0)

Álava. Vitoria-Gasteiz, humedales de Salburúa, balsa de Arcaute, 20 a 29 de noviembre (J. Knorr Alonso y R. Arambarri; G. Belamendía).

Cáceres. Zorita, embalse de Sierra Brava, ad., 12 de enero (J. L. Muddeman).

Navarra. Valle de Aranguren, balsa de Zolina, 14 y 19 de febrero (G. Gorospe Rombouts y G. Berasategui).

(Groenlandia, Islandia y Spitsbergen). Se incluyen las primeras observaciones homologadas de la especie en Extremadura y Navarra. La primera para Portugal tuvo lugar en febrero de 2000 cerca de Lisboa (Moore, 2001).

Ánsar Chico

Anser erythropus (PB: 4/4, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Zamora. Villafáfila, ad., 26 de enero (quizás desde el 16) (A. Rodrigo García y L. Antón Prieto).

(Paleártico boreal, desde el norte de Escandinavia). Aunque muchas de las observaciones de ánsares y barnaclas que aparecen en nuestros informes corresponden a Villafáfila, esta es la primera cita que se homologa de Ánsar Chico en dicha localidad.

Barnacla Canadiense

Branta canadensis (PB: 15/18, 1/2; C: 0/0, 0/0)

Cantabria. Noja, laguna de Victoria, dos, foto de uno, 13 de septiembre (S. Alarcón Costa y L. Fernández Cano).

1999:

Pontevedra. O Rosal, estuario del Miño, 16 a 27 de noviembre (C. Vidal Rodríguez).

(Norteamérica, introducida en islas Británicas y Escandinavia). Origen desconocido. El comportamiento muy confiado de las aves de Cantabria, unido a la fecha en que se vieron hace pensar en procedencia de cautividad. El otro registro corresponde en cambio a un año, 1999, que ya contaba con otras cinco citas homologadas.

Barnacla Cuellirroja

Branta ruficollis (PB: 5/6, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Cáceres. Zorita, embalse de Sierra Brava, 12 y 13 de enero (J. L. Muddeman).

(Siberia). Origen desconocido. Primer registro de la especie en Extremadura. Al igual que una de las citas de Ánsar Piquicorto, corresponde a un embalse de reciente construcción pero que ya alberga grandes cifras de anátidas durante el invierno.

Ganso del Nilo

Alopochen aegyptiaca (PB: 17/28, 3/6; C: 0/0, 0/0)

Jaén. Vilches, embalse de Guadalén, tres, foto, 6 de octubre (F. J. Martín Barranco y D. Burgos Romero).

Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce, 26 de marzo (A. M. Paterson).

Pontevedra. A Guarda, estuario del Miño, dos, fotos, 8 de septiembre (L. E. Senra Valverde).

(África subsahariana y Egipto, introducido en Gran Bretaña y los Países Bajos). Origen desconocido. Las aves observadas en el embalse de Guadalén debieron prolongar allí su estancia, ya que uno de los autores (F. J. Martín Barranco) nos comunica la observación de dos ads, seguidos por cinco pollos en fecha 14 de julio de 2003. Aunque tenemos citas homologadas de esta especie todos los años desde 1996 y ya suman veinte, es curioso que la primera sea relativamente reciente, de 1993.

Tarro Canelo

Tadorna ferruginea (PB: 70/148, 9/12; C: 6/34, 0/0)

Madrid. Rivas-Vaciamadrid/Velilla de San Antonio, 18 de mayo (J. Miranda Guerrero). Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, dos, hembra y pro-

bable macho, fotos, 29 de septiembre (M. Juan Martínez y D. González Fernández). Valdemorillo, embalse de Valmayor, tres, 23 de noviembre (G. Núñez-Lagos Laborda).

Málaga. Vélez Málaga, Torre del Mar, desembocadura del río Vélez, dos, fotos, 20 de enero (P. E. Lanzas Quintana y E. Muñoz Muñoz) y probablemente los mismos, macho y hembra, fotos, los días 1 y 2 de junio (F. J. Molina Jiménez). Torremolinos, dos, 14 de julio (A. M. Paterson y M. C. A. Clark).

Pontevedra. A Guarda, estuario del Miño, hembra, 2 de mayo (C. Vidal Rodríguez).

Salamanca. Azud de Riobobos, hembra ad., foto, al menos desde el 31 de julio (M. Rouco) al 21 de agosto (J. J. Ramos Encalado y G. Hernández Cordero/SEO-Salamanca); quizás el mismo individuo, 3 de octubre (A. Pablos Álvarez).

1999:

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, embalse de Los Molinos, cuatro, foto, 9 de noviembre (J. Normaja y J. J. Nurmi).

1987:

Girona. Pals, playa y desembocadura del Rec del Molí, hembra, 11 de abril (J. Martí Aledo).

(Asia centro-occidental, con pequeñas áreas en sueste de Europa y noroeste de África). Origen desconocido. El año 2002 es el último para el que el Comité de Rarezas considerará los registros de esta especie.

Pato Mandarín

Aix galericulata (PB: 18/38, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Barcelona. Delta del Llobregat, Reserva Natural Remolar-Filipines, macho ad., fotos, 30 de noviembre a 1 de diciembre (F. López Sanz y J. Bartrolich; J. Sala y otros) y en otras fechas de 2003 hasta 16 de marzo.

(Paleártico oriental, introducido en Gran Bretaña). Origen desconocido.

Silbón Americano

Anas americana (PB: 17/21, 3/3; C: 4/10, 1/2)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, hembra de 1.º inv., 26 y 27 de octubre y 2 de noviembre (J. L. Raibual Patiño).

Asturias/Lugo. Ría del Eo, macho ad., 20 de diciembre (J. A. Villegas González) y según referencias, entre octubre de 2002 y febrero de 2003.

Cantabria. Embalse del Ebro, desde la estación de bombeo Ebro-Besaya, macho ad., foto, 12 de diciembre (A. Herrero Calva y R. Balbás Gutiérrez).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos, estanque de El Polvillo, dos, 18 a 30 de noviembre (J. J. Ramos; K. B. Willis y G. Huxley).

(Norteamérica). Cuatro registros homologados, tres peninsulares y uno canario, que hacen del 2002 el mejor año hasta el momento. Una interesante revisión de las citas de esta especie en Gran Bretaña e Irlanda puede consultarse en Votier *et al.* (2003).



Tarro Canelo *Tadorna ferruginea*, hembra adulta. Azud de Riobobos (Salamanca), julio de 2002. Foto: M. Rouco.

Cerceta Americana

Anas carolinensis (PB: 17/15, 6/8; C: 6/6, 0/0)

I) Aves que presentan rasgos puros de la especie:

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Insua, macho, diciembre de 2001 a 2 de marzo de 2002, cita ya publicada en el informe de 2001 (J. L. Rabuñal Patiño).

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany* de El Cortalet y otras zonas, macho, fotos, 30 de noviembre de 2002 a 20 de abril de 2003 (J. Martí Aledo, X. del Acebo, S. Sales, R. Gutiérrez, E. Guinart y otros).

Pontevedra. O Grove, macho, 3, 13 y 19 de enero (C. Vidal Rodríguez). A Guarda, estuario del Miño, macho, 15, 22 y 24 de enero (C. Vidal Rodríguez y A. Lomeña Rodríguez); misma localidad, tres machos, los tres entre 31 de octubre y 12 de diciembre y luego uno solo hasta 6 de febrero de 2003 (C. Vidal Rodríguez).

II) Aves que presentan rasgos híbridos entre *Anas crecca* y *A. carolinensis*:

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany* de El Cortalet, macho, fotos, 6 de marzo a 16 de abril (J. Martí Aledo, S. Sales, R. Gutiérrez, E. Guinart y otros).

Navarra. Valle de Aranguren, balsa de Zolina, macho, 24 de febrero (G. Gorospe Rombouts, C. Almingol, L. Almingol, A. Lizarraga y Ch. Vadillo y otros).

(Norteamérica). Se incluyen aquí las primeras citas homologadas para Cataluña y Navarra. Son de especial interés las cinco aves que parece ser que llegaron a coincidir en la provincia de Pontevedra, así como los dos ejemplares híbridos, que son los primeros que se señalan en nuestro país.

Porrón Acollarado

Aythya collaris (PB: 18/36, 6/13; C: 27/33, 0/0)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, dos hembras, foto, una desde 7 de diciembre de 2001 a 27 de enero de 2002 —cita ya publicada en el informe de 2001— y la otra entre 13 de enero y 16 de marzo (J. L. Rabuñal Patiño; foto de P. Gutiérrez Varga/Sterna-Ferrol); misma localidad, hasta siete aves, un macho de 1.^{er} inv. y seis hembras —también probablemente de 1.^{er} inv.—, con repetidas observaciones entre el 26 de octubre y el 16 de marzo de 2003 (al menos tres hembras ya el 26 de octubre, cuatro desde el 16 de noviembre, el macho y una quinta hembra a partir del 8 de diciembre, y las siete aves el 21 de diciembre) (J. L. Rabuñal Patiño). Valdoviño, embalse de As Forcadas, dos, macho y hembra, fotos, 19 de

noviembre a 12 de abril de 2003 (durante la estancia el macho realizó ocasionales visitas a la cercana laguna de A Frouxeira) (P. Gutiérrez Varga, A. Gutiérrez Pita y P. Pita Criado/Sterna-Ferrol).

Madrid. Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, macho, fotos, días 6 (D. González Fernández y M. Juan Martínez) y 9 de enero (J. C. Atienza, E. Escudero e I. Fernández Aransay); misma localidad, hembra, fotos, al menos entre 27 de enero y 3 de febrero (D. González Fernández, J. L. Muddeman y otros).

Pontevedra. Baiona, marisma de A Ramaíosa, hembra, 30 de octubre (C. Vidal Rodríguez).

2001:

León. Zuares del Páramo, balsa de riego, 8 ejemplares —un macho ad., 3 machos de 1.^{er} inv. y 4 hembras—, días 18, 20 y 25 de noviembre por la mañana; además, en la tarde del 25 de noviembre, 7 aves —3 machos y 4 hembras—, probablemente parte de las anteriores, en balsa de riego cercana en Santa Cristina del Páramo (D. Miguélez Carbajo y otros) (parece ser que hasta 6 ejemplares se vieron más tarde, al menos entre 30 de noviembre y 15 de diciembre, en el embalse de Selga de Ordás, localidad situada a unos 50 km al norte de las anteriores).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos, charca de El Polvillo, macho, 24 de noviembre de 2000 a 13 de abril de 2001 (J. J. Ramos, F. Siverio y M. Siverio).

2000:

Santa Cruz de Tenerife. Véase arriba.

(Norteamérica). Excelente año, en el que sobresa- le un grupo de siete aves en Galicia y dos observaciones en el centro mismo de la Península, primeras para la comunidad de Madrid. Al parecer hubo más observaciones gallegas, por desgracia no comunicadas. A destacar también el grupo de ocho aves detectado en noviembre de 2001 en la provincia de León.

Porrón Bola

Aythya affinis (PB: 2/2, 1/1; C: 6/15, 1/1)

A Coruña. Valdoviño, embalse de As Forcadas, hembra ad., 19 a 24 de noviembre (P. Gutiérrez Varga, A. Gutiérrez Pita y P. Pita Criado/Sterna-Ferrol). **Santa Cruz de Tenerife.** Roquito del Fraile, hembra, foto, 29 de diciembre de 2002 y 2 de enero de 2003 (T. Kuppel).

(Norteamérica). La tercera cita peninsular, gallega como las dos anteriores, y la séptima para las Canarias, una vez más en la localidad tinerfeña de El Fraile. El Comité Portugués de Raridades ha homologado recientemente el primer registro para las Azores, de dos aves en noviembre de 2000 (*Anuário Ornitológico*, 2: 12).

Negrón Común

Melanitta nigra (PB: 2/2, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Aves con caracteres de la subespecie *Melanitta nigra americana*:

A Coruña. Pontecoso/Cabana de Bergantiños, ría de Corme y Laxe, macho de 1.^{er} inv., 10 a 23 de marzo, aunque probablemente entre 10 de febrero y 24 de marzo (J. L. Rabuñal Patiño).

(Norteamérica y este de Siberia). Tercer registro homologado, en Galicia. Los anteriores corresponden a Asturias y a los años 1986 y 1994 (*Ardeola*, 35: 171 y 43: 108-109).

Serreta Chica

Mergus albellus (PB: 17/27, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Salamanca. Azud de Riobobos, posible hembra, foto, 3 a 23 de agosto y por referencias, quizás hasta el 8 de septiembre (J. J. Ramos Encalado, G. Hernández Cordero, V. López Alcázar y Á. González Mendoza/SEO-Salamanca; M. Rouco).

(Paleártico boreal). La fecha, plenamente estival, resulta sorprendente puesto que hasta ahora todas las homologadas caían entre finales de octubre y primeros de marzo. Las que invernan en Francia —lo que normalmente hacen sólo por el noreste del país— suelen también llegar desde últimos de octubre e irse en febrero-marzo, si bien se conocen casos de permanencia estival (Dubois *et al.*, 2000). De acuerdo con las recomendaciones de la AERC la especie se incluye en el género *Mergus* en lugar de en el género *Mergellus*.

Serreta Capuchona

Mergus cucullatus (PB: 0/0, 0/0; C: 1/1, 0/0)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Adeje, charca de riego en Playa Paraíso (El Pinque), 1.^{er} inv., fotos, desde 11 de diciembre de 2001 (D. Lupton y B. Lancaster; E. García del Rey) hasta por lo menos 16 de febrero de 2002 (R. Fray), cita ya publicada en el informe de 2001.

(Norteamérica). Origen desconocido. De acuerdo con las recomendaciones de la AERC la especie se incluye en el género *Mergus* en lugar de en el género *Lophodytes*.

Malvasía Canela

Oxyura jamaicensis (PB: 27/77, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. Puebla del Río, Corta de los Olivillos, macho, quizás de 1.^{er} inv., es abatido dentro del programa de protección a la Malvasía Cabeciblanca *Oxyura leucocephala*, 14 de noviembre (F. Chiclana Moreno y M. Martín).

(América, introducida en Gran Bretaña).

Zampullín Picogrueso

Podilymbus podiceps (PB: 3/3, 0/0; C: 1/1, 0/0)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, probable ad., 1 de diciembre de 2001 a 16 de marzo (J. L. Rabuñal Patiño y otros).

La Rioja. Logroño, embalse de La Grajera, ad., fotos, 19 de febrero de 2001 hasta por lo menos enero

de 2002 (I. Gámez Carmona; D. González Fernández; A. Onrubia y otros).

(América). Observaciones ya publicadas en el informe de 2001.

Zampullín Cuellirrojo

Podiceps auritus (PB: 57/106, 4/31; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Ría de Ferrol, Maniños, fotos, 2, 19 y 20 de diciembre, y en compañía de otro ejemplar en varias fechas de 2003 hasta el 11 de febrero (A. Gutiérrez Pita, P. Gutiérrez Varga, P. Pita Criado e I. Allegue/Sterna-Ferrol).

Cantabria. Marismas de Santoña, hasta 18 aves, 29 de enero, con otras observaciones durante el mismo invierno que se extienden desde el 21 de octubre de 2001 (un ave) hasta el 14 de marzo de 2002 (nueve) (J. Gómez-Navedo; J. M. Pérez de Ana; véase cita publicada en el informe anterior correspondiente a A. Rodrigo García y M. A. García Matellanes); once, 19 de diciembre, con otras observaciones de menor número de aves entre el 5 de noviembre (un ave) y distintas fechas de 2003 (J. Gómez-Navedo; M. T. Garrigós Gabilondo y J. M. Pérez de Ana; A. Herrero Calva).

Girona. Sant Pere Pescador, bahía de Roses, 23 de enero (O. Clarabuch, J. Martí, I. Batet y J. R. Sanz).

2001:

Cantabria. Marismas de Santoña, hasta 12 aves el 10 de febrero, con 10 el 10 de enero y 2 el 9 de marzo; en la siguiente temporada invernal, desde 1 ave el 21 de octubre hasta 10 el 14 de diciembre (J. Gómez-Navedo).

2000:

Cantabria. Marismas de Santoña, hasta 12 ejemplares el 21 de febrero, con 5 aves el 25 de enero; en la siguiente temporada invernal, un ave el 28 de septiembre y cuatro el 27 de diciembre (J. Gómez-Navedo y F. González Sánchez).

1987:

Guipúzcoa (Gipuzkoa). San Sebastián (Donostia), bahía de La Concha, foto, 12 de noviembre (R. Saiz Elizondo).

(Holártico boreal). Juan Gómez-Navedo nos ha enviado una interesante relación de observaciones efectuadas en las Marismas de Santoña durante estos últimos años, que complementan en cuanto a fechas y cifras el panorama dibujado por las observaciones hasta ahora homologadas, y que obliga a retocar la contabilidad de los registros (si bien es evidente que muchas de las aves deben repetirse de un año para otro). En total, en el invierno de 1999-2000 se habría llegado a un máximo de 12 ejemplares, en el de 2000-2001 a 17 y en el de 2001-2002 a 18. Para Santoña las primeras observaciones homologadas datan de noviembre de 1988, pero se vienen repitiendo anualmente al menos desde la temporada 1993-94, con cifras en progresivo aumento. Tal situación, acompañada de la evolución también positiva de las citas de

esta especie a nivel peninsular, ha aconsejado al Comité de Rarezas a retirarla de la relación de las sometidas a homologación. Por tanto, el Comité dejará de considerar las observaciones a ella referidas a partir del 1 de enero de 2005 (aunque se tendrán en cuenta, como es habitual en estos casos, las observaciones de 2004 y años anteriores, así como las que pudieran tener lugar en las islas Canarias).

Petrel Antillano

Pterodroma hasitata (PB: 0/0, 1/1, C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Mar a 45°01'N/12°16'W, unas 180 millas náuticas (330 km) al noroeste del cabo Finisterre, 30 de abril (S. N. G. Howell y J. Davis).

(Mar Caribe). Primera observación en aguas españolas correspondiente a esta especie. Es ave globalmente amenazada, que se reproduce únicamente en las islas de Cuba y La Española y que fuera de la época de cría vaga por el Atlántico occidental entre las latitudes de los Estados Unidos y Brasil (Del Hoyo *et al.*, 1992). Una nota sobre la presente observación, ilustrada con dibujos de campo, puede encontrarse en Howell (2002). Al parecer tan sólo existen tres citas previas para el Paleártico Occidental, relativas a Gran Bretaña y a los años 1850, 1980 y 1984 (Dannenberg, 1983; Howell, 2002).

Paño de Wilson

Oceanites oceanicus (PB: 11/55, 1/1; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Mar a 4 millas al norte del cabo de Estaca de Bares, 18 de agosto (A. Gutiérrez Pita, P. Pita Criado, I. Allegue, A. Sandoval y P. Gutiérrez Varga/Sterna-Ferrol).

(Antártida e islas subantárticas). Localidad y época habituales.

Piquero Pardo

Sula leucogaster (PB: 2/2, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Pontevedra. Localidad concreta desconocida, cadáver encontrado con ocasión de la marea negra del *Prestige*, foto, 10 de diciembre (A. Antinori y S. Castelli).

(Pantropical). Tercera cita española, realizada en las condiciones un tanto confusas que rodearon a la catástrofe del petrolero *Prestige*. El cadáver, de un ave posiblemente juvenil, se llevó al centro de recuperación de emergencia instalado en Pontevedra y allí los observadores, voluntarios en la limpieza de playas, le tomaron la foto que ahora permite homologar la cita. No sabemos si el cadáver se conserva o no. Las únicas citas españolas correspondían a la provincia de Málaga y a los años 1983 y 1986 (*Ardeola*, 35: 169), mientras una interesante observación portuguesa homologada tuvo lugar en el Algarve, junto a Lagos, entre el 27 de julio y el 20 de agosto de 1996 (Costa *et al.*, 1999). Para Marruecos, Thévenot *et al.* (2003) recogen cinco citas.

Pelícano Común

Pelecanus onocrotalus (PB: 12/15, 1/3; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Aznalcázar, Caño de Guadimar, tres ads., fotos, 5 de noviembre (J. Butler, B. Rhodes, I. Smeaton y S. Smeaton).

(Europa sudoriental, Asia y África). Posiblemente aves ya detectadas en años anteriores.

Avetoro Lentiginoso

Botaurus lentiginosus (PB: 3/3, 0/0; C: 0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos/El Tanque, charcas de Erjos, 10 de diciembre (T. Clarke).

(Norteamérica). Primera cita homologada para las islas Canarias, de donde sólo se conocía la captura de un ejemplar en la isla de Tenerife que recoge Bannerman (1963) y que tuvo lugar en la localidad de Madre del Agua, cerca de La Laguna, en fecha desconocida.

Avetorillo Plomizo

Ixobrychus sturmii (PB: 0/0, 0/0; C: 1/1, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos/El Tanque, charcas de Erjos, macho ad., fotos, 23 a 25 de agosto y posteriormente en distintas fechas

del año 2003 (W. Velmala, R. Lindroos y L. Nikkinen; L. Scalabre).

(África al sur del Sahara). Segunda observación homologada para las Canarias y España, un par de años después de la que tuvo lugar en la vecina isla de Gran Canaria en enero de 2000 (*Ardeola*, 49: 145-146). De acuerdo con las recomendaciones de la AERC la especie se incluye en el género *Ixobrychus* en lugar de en *Ardeirallus*.

Garceta Dimorfa

Egretta gularis (PB: 34/34, 8/9; C: 2/2, 1/1)

D) Aves que muestran caracteres de la subespecie *Egretta gularis gularis*:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Amarilla Golf, ave no juv., fotos, 20 de junio a 27 de julio (R. Barone Tosco, J. P. Castro y otros; T. Clarke).

Sevilla. Puebla del Río, entre los poblados de Alfonso XIII e Isla Mayor, probable 2.º año calendario, fotos, 19 y 20 de enero (J. Ruiz Carmona) y 14 de febrero (F. Chiclana Moreno, J. Garzón Gutiérrez y M. Martín). Villafranco del Guadalquivir, finca Veta la Palma, ad., 27 de febrero (F. Chiclana Moreno). Puebla del Río, Isla Mayor, 1.º verano o ad., 31 de agosto (J. Butler y otros).



Avetorillo Plomizo *Ixobrychus sturmii*, macho. Charca de Erjos (Tenerife), agosto de 2002. Foto: W. Velmala.

II) Aves que muestran caracteres intermedios entre *Egretta garzetta* y *E. gularis* (posibles híbridos):

Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce, 1 de abril (A. M. Paterson); otro ejemplar, 28 de abril a 19 de mayo (A. M. Paterson y A. Paterson Fermo-sell); otro ejemplar, ad., 30 de junio (A. M. Paterson y M. C. A. Clark).

Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Brazo del Este, 16 de mayo (F. J. García Vargas y R. López Sandín).

Tarragona. Delta del Ebro, dos, primer año calendario (de aspecto idéntico, quizás hermanos), 2 de agosto a 13 de diciembre, uno muere (se conserva en la estación ornitológica de Canal Vell) y el otro continúa por la zona de las salinas de La Tancada al menos hasta el 22 de abril de 2003, fotos (D. Bigas; A. Molina; J. Tantull; R. Tonnel).

(Paleotropical). Lllaman la atención las fechas invernales en dos de las tres citas de aves no híbridas detectadas este año en las marismas del Guadalquivir.

Marabú Africano

Leptoptilos crumeniferus (PB: 16/16, 5/5; C: 0/0, 0/0)

Cádiz. Tarifa, campos en la antigua laguna de La Janda, fotos, 16 de octubre (D. Cuenca y M. Lobón).

Cantabria. Valdeolea, ad., fotos, 8 de julio, por referencias entre 26 de junio y 20 de julio (C. Sáinz Concha).

Lleida. El Pont de Suert, Montanuy, fotos, 15 y 16 de abril (P. Vila Doncel y otros).

Málaga. Istán, foto, 22 de julio (A. Rodríguez Mariscal y J. M. Carpena Coronado). Cañete la Real, ad., foto, 30 y 31 de agosto (A. Fernández Cruces).

(África al sur del Sahara). Origen desconocido. Este es el segundo año con mayor número de registros después del 2001, que tuvo siete.

Tántalo Africano

Mycteria ibis (PB: 2/2, 2/1; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. Puebla del Río, Brazo del Este, ad., fotos, 22 de octubre (J. Butler, J. Jones y P. Jones); probablemente el mismo individuo el 7 de diciembre (J. Butler, G. Meehan y J. Meehan) y todavía en febrero y marzo de 2003.

(África al sur del Sahara y Madagascar). Origen desconocido.

Ibis Sagrado

Threskiornis aethiopicus (PB: 5/6, 1/1; C: 1/1, 1/1)

A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira, ad., foto, 16 y 18 de abril y 13 de mayo (A. Gutiérrez Pita y P. Gutiérrez Varga/Sterna-Ferrol).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Arona, charca de El Fraile, 20 de julio (B. Pérez Martín).

(África al sur del Sahara). Origen desconocido.

Espátula Africana

Platalea alba (PB: 7/6, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. Puebla del Río, Isla Mayor, ad., 6 de octubre (J. Butler y otros).

(África al sur del Sahara). Origen desconocido.

Flamenco Enano

Phoenicopterus minor (PB: 8/8, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Huelva. Villafranco del Guadalquivir, finca Veta la Palma, ad., 30 de octubre (J. L. Muddeman).

Sevilla. Osuna, laguna de Calderón Grande, ad., 1 de diciembre (F. Chiclana Moreno y M. Villaécija).

2001:

Tarragona. Delta del Ebro, punta de La Banya, dos, ads., 21 de mayo (D. Bigas y F. Vidal Esquerré).

1999:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, costa rocosa junto a la punta de La Rasca, ad. o subad., foto, 2 de noviembre (J. Normaja y J. J. Nurmi).

(África al sur del Sahara). Origen desconocido.

Pigargo Europeo

Haliaeetus albicilla (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)

Islas Baleares. Isla de Mallorca, sierra de Tramuntana, inmaduro, desde últimos de diciembre de 2001 hasta al menos 16 de febrero (M. Rebassa, X. Gassó, J. M. Rebassa y A. Sastre Serra), cita ya publicada en el informe de 2001.

(Paleártico y Groenlandia).

Buitre Moteado

Gyps rueppellii (PB: 25/18, 2/2; C: 0/0, 0/0)

Segovia. Montejo de la Vega de la Serrezuela, comedero de buitres, subad., fotos, 17 de marzo (J. Griesinger y B. Rotter, comunicado por F. J. Fernández y Fernández-Arroyo). Montejo de la Vega de la Serrezuela, barranco de Valugar, inm., 10 de junio (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).

2001:

Cádiz. Tarifa, Valle del Santuario, al menos dos, inms., fotos, 4 de octubre (J. Elorriaga y otros).

(África al sur del Sahara). Recientes revisiones sobre la presentación de este buitre en la Península Ibérica pueden consultarse en De Juana & Camiña (2001) y Gutiérrez (2003). Para Portugal se han homologado hace poco las cuatro primeras citas, correspondientes a un individuo capturado en el distrito de Portalegre en agosto de 1993 y a tres aves, al menos, observadas en el distrito de Castelo Branco en junio de 1998 y febrero y agosto de 1999, una de ellas, la de febrero de 1999, ave adulta que aparentemente incubaba en nido situado en el Tajo Internacional, no se sabe si formando pareja con otro *Gyps rueppellii* o bien con un *Gyps fulvus* (Costa et al., 2003). La contabilidad de las citas estaba equivocada en el informe anterior.



Buitre Moteado *Gyps rueppellii*, subadulto. Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia), marzo de 2002. Foto: J. Griesinger.

Aguilucho Papialbo

Circus macrourus (PB: 5/5, 4/4; C: 1/1, 0/0)

Illes Balears. Isla de Mallorca, Pollença, macho ad., fotos, 8 de abril (D. Walker, G. Hollamby, B. Chambers, P. Burness y P. Stafford). Puerto Pollença, macho ad., 21 de abril (D. L. Robinson).

Jaén. Andújar, finca Los Alarcones, macho ad., 30 de marzo (J. I. García-Abasolo González).

Sevilla. Puebla del Río, La Dehesa de Abajo, macho ad., 31 de marzo (J. A. Villegas González).

(Eurasia, desde Rumanía hasta Asia central). Año récord, que también ha resultado serlo en Francia, allí con seis citas homologadas (Frémont *et al.*, 2004). Una revisión reciente sobre la migración de esta especie por el Mediterráneo central puede encontrarse en Corso & Cardelli (2004).

Busardo Moro

Buteo rufinus (PB: 14/15, 2/2; C: 2/2, 0/0)

Cádiz. Algeciras, observatorio de El Algarrobo, ad., 9, 13 y 14 de septiembre (T. Conzemius y otros). Tarifa, Sierra de la Plata, juv., presenta caracteres correspondientes a la subespecie *cirtensis*

sis, 7 de octubre (D. Thexton, R. Irving e I. Kinley).

2001:

Cádiz. Facinas, un ejemplar (quizás dos) en la vega de La Janda, 3 km al oeste de Facinas, y otro más en la carretera a Los Barrios desde el mirador de la sierra de Ojén, presentan caracteres correspondientes a la subespecie *cirtensis*, 20 de octubre (E. F. J. Garcia y S. Abbott).

(Sureste de Europa, Asia y norte de África). Más observaciones en Andalucía, que acumula once de las dieciseis homologadas para la Península.

Busardo Calzado

Buteo lagopus (PB: 5/5, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1990:

Girona. Pals, arrozales de las *basses* de Coll, 12 de noviembre de 1989 a 21 de marzo de 1990 (J. Martí Aledo y R. Fortià).

1989:

Girona. Véase arriba.

(Holártico boreal). Este es el registro más antiguo de los homologados hasta la fecha. Como todos los demás, resulta ser invernal y de Cataluña.

Águila Moteada*Aquila clanga* (PB: 14/14, 1/1; C: 0/0, 0/0)**Huelva.** Parque Nacional de Doñana, La Rocina, ad., fotos, 10 de enero (K. Rainio, A. Kause, S. Kunttu y R. Lindroos)

(Eurasia septentrional, desde Polonia al este de Siberia). Localidad y fecha habituales.

Águila Motada/Pomerana*Aquila clanga/pomarina* (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)

I) Aves que muestran caracteres intermedios entre ambas especies (posibles híbridos):

2001:**Huelva.** Parque Nacional de Doñana, La Rocina, juv., fotos, 27 de diciembre (S. Villa Méndez).

II) Descripción insuficiente para distinguir entre ambas especies o sus posibles híbridos:

2001:**Huelva.** Parque Nacional de Doñana, *lucio* de El Cangrejo, ad. o subad., 8 de diciembre (F. Chiclana Moreno).

(Eurasia). De especial interés, la observación referente a un ave con caracteres híbridos, documentada con buenas fotografías y sobre la cual puede consultarse en Gutiérrez & Villa (2002). Bibliografía reciente sugiere que la hibridación entre estas dos especies de águilas pueda ser un fenómeno usual en algunos países (véase por ejemplo Väli & Lõhmus, 2004), lo que debe llevarnos a la exigencia de un especial cuidado a la hora de homologar registros referidos a ellas.

Halcón Borní*Falco biarmicus* (PB: 6/6, 1/1; C: 0/0, 0/0)**Girona.** Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, arrozales de La Gallinera, 1.ª inv., presenta caracteres correspondientes a la subespecie *erlangeri*, 2 de diciembre de 2001 y 1 y 2 de enero de 2002 (J. Martí Aledo, V. Estrada, P. Serrano y otros; P. Plans Rubió).**2001:****Girona.** Véase arriba.

(Italia, sureste de Europa, África, Arabia y Oriente Medio). Origen desconocido. Tercera cita homologada para Cataluña.

Calamoncillo Africano*Porphyrio alleni* (PB: 6/6, 2/2; C: 6/6, 0/0)**Alicante.** Benidorm, 1.ª inv., fotos, ave recogida en un jardín el 26 de enero, que tras pasar un tiempo en un centro de recuperación (Santa Faç) es liberada en el Parque Natural de El Hondo el 8 de febrero (E. Gomis Martín).**Illes Balears.** Isla de Mallorca, Porreres, 1.ª inv., foto, 8 a 11 de enero (el día 11 es capturado y anillado) (P. J. García Salas, J. Riera y otros).

(África al sur del Sahara). Citas próximas en la geografía y el calendario, ambas relativas a ejemplares de primer invierno. Todas las que llevamos homologadas hasta ahora, menos una que es de marzo, caen entre noviembre y enero.

Chorlito Dorado Americano*Pluvialis dominica* (PB: 14/14, 1/1; C: 12/12, 0/0)**Girona.** Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany*s de El Matà, 1.ª verano, 11 de mayo (D. Steele y J. Scovell).

(Norteamérica septentrional). Segunda cita homologada para Cataluña, la primera el año pasado y también de los Aiguamolls.

Chorlito Dorado Siberiano*Pluvialis fulva* (PB: 4/4, 2/2; C: 0/0, 0/0)**Barcelona.** Delta del Llobregat, marisma de Les Filipines, 1.ª verano, fotos y vídeo, 28 a 30 de agosto (F. López, J. Castelló, R. Gutiérrez y otros).**Tarragona.** Delta del Ebro, arrozales junto a la carretera entre Sant Jaume d'Enveja y la isla de Buda, fotos, 27 de diciembre (G. Bota, E. Farré, X. Revés, E. Solanes y S. West).

(Siberia). La distribución de las citas homologadas de esta especie cobra un cariz todavía más mediterráneo, con cuatro en Cataluña y una en Valencia frente a sólo una en Galicia. Sobre el calendario, cuatro caen en agosto-septiembre, una en diciembre y una en marzo.

Correlimos Semipalmeado*Calidris pusilla* (PB: 4/4, 1/1; C: 2/2, 0/0)**A Coruña.** Laxe, laguna de Traba, juv., 20 y 21 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño).

(Norteamérica septentrional). Como suele ocurrir entre las limícolas neárticas, dominan las citas de Galicia, las otoñales y las relativas a aves de primer año. En la presente observación las condiciones meteorológicas reinantes, con vientos muy fuertes, exigieron un comportamiento casi heroico al observador hasta que consiguió apreciar bien el rasgo más distintivo de la especie, las pequeñas palmeaduras en las patas.

Correlimos Culiblanco*Calidris fuscicollis* (PB: 13/13, 0/0; C: 7/7, 2/5)**Las Palmas.** Isla de Fuerteventura, embalse de Los Molinos, juv. en muda a 1.ª inv., 17 y 24 de octubre (N. Willaert y M. Veramme).**Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, Roquito del Fraile, cuatro, juvs./1.ª inv., 21 de octubre (T. Clarke y B. Johnson).

(Norteamérica boreal). A destacar, la cita de Tenerife con cuatro aves al tiempo, la primera que homologamos de más de un individuo.



Calamoncillo Africano *Porphyrio alleni*, primer invierno. Porres (Mallorca), enero de 2002. Foto: P. J. García Salas.



Calamoncillo Africano *Porphyrio alleni*, primer invierno. Benidorm (Alicante), febrero de 2002. Foto: E. Gomis.

Correlimos de Baird

Calidris bairdii (PB: 3/3, 3/3; C: 2/2, 0/0)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Insua, juv., 28 de septiembre (J. L. Rabuñal Patiño). Laxe, laguna de Traba, juv., fotos, 21 a 27 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño; A. Gutiérrez Pita y P. Gutiérrez Varga/Sterna-Ferrol).

Pontevedra. Baiona, playa de Ladeira, juv., 22 de octubre (C. Vidal Rodríguez).

(Norteamérica septentrional y noreste de Siberia). De las seis observaciones peninsulares que ya contabilizamos, las seis gallegas, cuatro corresponden a José Luis Rabuñal.

Correlimos Pectoral

Calidris melanotos (PB: 102/114, 9/9; C: 16/55, 4/4)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Insua, juv., 25 y 27 de septiembre (J. L. Rabuñal Patiño); probable juv., 20 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño).

Badajoz. La Garrovilla, embalse de Los Canchales, juv., 14 de septiembre (F. A. Prieto y J. L. Valiñas).

Barcelona. Delta del Llobregat, marisma de Les Filipines, juv., fotos y vídeo, 30 de agosto (R. Gutiérrez y J. Castelló).

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany* del Matà, juv., 3 a 7 de octubre (J. Martí Aledo, T. Montràs Janer y otros); misma localidad, juv., 16 a 18 de octubre (J. Martí Aledo).


Huelva. Parque Nacional de Doñana, cerca del centro de visitantes «José Antonio Valverde», ad., 16 de abril (H.-J. Roland, C. Manetti, U. Roland, H. Scherer y S. E. Wagner).

Illes Balears. Isla de Mallorca, Muro, estación depuradora, 5 de mayo (M. Rebassa Beltran y B. Ramis Ripoll).

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, Tegui, salinas de Los Cocoteros, juv., 20 de septiembre (F. J. García Vargas).

Pontevedra. Meaño, Dena, juv., hembra (por sus medidas), capturado para anillamiento, fotos, 20 de septiembre (A. Fernández Cordeiro, D. Álvarez Graña, E. Martínez Sabarís, A. Pastoriza Barreiro y C. D. Romai Cousido/Grupo de Anillamiento Anduriña).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Roquito del Fraile, ad., 20 a 25 de septiembre (T. Clarke y B. Johnson); embalse de Valle Molina, juv., 22 de octubre (T. Clarke); Roquito del Fraile, juv., 26 de octubre (T. Clarke).



Correlimos Pectoral *Calidris melanotos*, juvenil. Meaño (Pontevedra), septiembre de 2002. Foto: Grupo de Anillamiento Anduriña.

2001:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, Los Llanos, estanque de riego en Las Martelas, juv., fotos, 28 de octubre (J. M. Castro Martín).

1998:

Tarragona. Delta del Ebro, campo inundado a las afueras de Sant Jaume d'Enveja, dos, juvs., 17 y 18 de septiembre (D. Bigas y C. Escoda Pinyol).

(Norteamérica). El mejor año hasta la fecha, con un total de quince observaciones, de las que nueve son peninsulares, cinco canarias y una balear. Tres de las canarias corresponden a un mismo observador, Tony Clarke. Entre las peninsulares figura la primera para Extremadura.

Correlimos Falcinelo

Limicola falcinellus (PB: 14/14, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Huelva. Huelva, Marismas del Odiel, El Espigón, fotos, 30 de abril (A. Ranner y E. Karner-Ranner).

(Escandinavia, Finlandia y áreas de Siberia). Desde 1997 no teníamos registros de esta especie. El de ahora es primaveral, con lo que ya van seis en abril-mayo frente a nueve en julio-octubre, un patrón fenológico muy similar al que se observa en Francia (Dubois *et al.*, 2000).

Correlimos Canelo

Tryngites subruficollis (PB: 19/20, 0/0; C: 5/5, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Amarilla Golf, 1.º verano, fotos, 6 a 16 de mayo (I. Johnson y

K. Johnson, comunicado por T. Clarke; R. Barone y C. Izquierdo).

(Norteamérica). Primera cita de primavera que se homologa en España (aunque se conocen un par de citas de mayo en Asturias anteriores al establecimiento del Comité de Rarezas). Todas las anteriormente homologadas se distribuían entre un 28 de agosto y un 9 de noviembre.

Agachadiza Real

Gallinago media (PB: 7/9, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Barcelona. Delta del Llobregat, El Remolar, fotos, 22 de mayo (F. López Sanz, R. Gutiérrez Benítez, R. Armada y otros).

(Desde Escandinavia y Polonia hasta Siberia occidental). Fecha relativamente tardía.

Agujeta Escolopácea

Limnodromus scolopaceus (PB: 9/9, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Illes Balears. Isla de Mallorca, Parc Natural de S'Albufera, 1.º inv., fotos, 9 a 18 de octubre (T. Bantock y C. Galley; J. Waine; A. Stagg).

(NE de Siberia y extremo N de Norteamérica). Primera cita para las Baleares (véase Stagg, 2003), pese a que de las nueve homologadas para la Península tres correspondían ya al litoral mediterráneo. Curiosamente, en Francia las citas de esta especie se distribuyen sin excepción por el litoral atlántico y del orden del 70 % aparecen concentradas en el departamento más occidental de todos, Finistère (Dubois *et al.*, 2000).



Agujeta Escolopácea *Limnodromus scolopaceus*, primer invierno. Parc Natural de S'Albufera (Mallorca), octubre de 2002. Foto: T. Bantock.

Agujeta Escolopácea/Gris

Limnodromus scolopaceus/griseus (PB: 7/8, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Huelva. Almonte, El Rocío, 5 de abril (J. A. Villegas González).

(Norteamérica y Siberia).

Correlimos Batitú

Bartramia longicauda (PB: 0/0, 0/0; C: 0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Amarilla Golf, ad., 20 a 22 de septiembre (T. Clarke y B. Johnson).

(Norteamérica). Esta cita canaria es la primera que se homologa para el conjunto de España, si bien en la Península se conocía ya la recuperación de un ave anillada en Michigan en julio de 1988 y cazada cerca de Sevilla en diciembre del mismo año (Dennis, 1990). Se trata de una especie que cría en praderas y pastizales de Norteamérica —donde ocupa un rango latitudinal amplio, desde Alaska y Quebec hasta Colorado y Virginia—, que inverna en el sur de Sudamérica y que ha producido ya un cierto número de registros de divagantes en Europa, sobre todo otoñales. Entre otros, se llevan contabilizados 44 en Gran Bretaña (Rogers *et al.*, 2003) y cinco en Francia (Dubois *et al.*, 2000). En Portugal la primera cita homologada tuvo lugar en Ludo, Faro, septiembre de 1999 (Costa *et al.*, 2003).

Archibebe Patigualdo Chico

Tringa flavipes (PB: 32/33, 5/5; C: 5/5, 0/0)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Insua, juv., 24 de septiembre a 4 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño); juv., 7, 11 y 12 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño); juv. que muda a 1.^{er} inv. y luego a 1.^{er} verano, 10 de noviembre de 2002 a 4 de mayo de 2003 (J. L. Rabuñal Patiño).

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà, *estany* del Matà, 1.^{er} inv., 4 y 5 de diciembre (J. Martí Aledo).

Huelva. La Redondela, 1.^{er} inv., foto, 7 de enero (J. A. Villegas González, J. M. Sayago y L. Urbina).

(Norteamérica). Otro buen año, después de las seis citas del 2001. Resulta muy interesante que dos de las nuevas citas afectan a fechas de pleno invierno, cuando hasta ahora tan sólo raras estancias otoñales se habían prolongado hasta diciembre. Destaca una de las de Galicia referente a un ave que permaneció medio año en la misma localidad, A Insua, lo que a un observador tan cuidadoso y experimentado como es José Luis Rabuñal —se trataba de su registro número trece referente a esta especie— le permitió efectuar estupendas descripciones de los sucesivos plumajes.

Andarríos del Terek

Xenus cinereus (PB: 32/33, 3/3; C: 1/1, 0/0)

Cádiz. San Roque, Sotogrande, desembocadura del río Guadiaro, ad., 27 de julio (R. J. Banham y R.

Martin). Chiclana de la Frontera, 1 de noviembre (J. A. Lama Miñana; A. López López y J. C. Marín Santos).

Guipúzcoa (Gipuzkoa). Irún, bahía de Txingudi, Parque Ecológico de Plaiaundi, fotos, 30 de julio (J. Briz Lázcoz y M. Etxaniz Aginagalde).

2001:

Tarragona. Tarragona, puerto, foto, 26 de agosto (A. Cama i Torrell y P. Josa Anguera).

1998:

Tarragona. Delta del Ebro, bahía de El Fangar, juv., 27 de julio a 11 de noviembre (D. Bigas, E. Bigas e I. Alberch).

(Siberia, Rusia europea y parte de Finlandia). Se incluye aquí la primera cita para el País Vasco (y segunda para el litoral cantábrico, tras una de Santoña en 1987).

Andarríos Maculado

Actitis macularius (PB: 7/7, 0/0; C: 6/7, 0/0)

1997:

Tarragona. Delta del Ebro, antigua piscifactoría junto a la laguna de Canal Vell, juv., 24 a 29 de agosto (D. Bigas).

1922:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, El Médano, ave que se conserva disecada en la colección de D. Domingo Bello (visitada por gentileza de D. Ruperto Pérez Godiño), juv., fotos, capturado en el mes de septiembre (J. A. Lorenzo Gutiérrez).

(Norteamérica). La cita de Tenerife es la más antigua que conocemos referente tanto a las islas Canarias como al conjunto de España. La del delta del Ebro, por su parte, también es primera cronológicamente para Cataluña.

Falaropo Tricolor

Phalaropus tricolor (PB: 8/8, 0/0; C: 0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, Fuencaliente, salinas, fotos, 5 de octubre (J. M. Castro Martín).

(Norteamérica). Primer registro homologado para el archipiélago de las Canarias, donde de acuerdo con Martín & Lorenzo (2001) tan sólo se conocía una observación invernal dudosa.

Págalo Rabero

Stercorarius longicaudus (PB: 24/29, 2/3; C: 2/4, 0/0)

A Coruña. Mar a unas 10 millas al norte del cabo de Estaca de Bares, dos, ads., fotos, 18 de agosto (A. Gutiérrez, P. Gutiérrez, P. Pita Criado, I. Allegue y otros/Sterna-Ferrol).

Salamanca. Azud de Riobobos, juv., fotos, 22 y 23 de agosto (J. J. Ramos Encalado, G. Hernández Cordero, V. López Alcázar y Á. González Mendoza/SEO-Salamanca).

2001:

León. Santa Cristina del Páramo, balsa de riego, juv., fotos, 26 a 29 de agosto (L. A. Ramos Franco, M. Juan Martínez, D. Miguélez Carbajo y J. García Fernández).

(Holártico boreal). Hay dos observaciones en Castilla y León, las primeras para esta comunidad. Aproximadamente el 20 % del total de las citas homologadas en la Península corresponden ya a puntos del interior, lo que por cierto se acerca mucho al 17% que, con mayor número de datos, se señala para Francia (Dubois *et al.*, 2000).

Gaviota Guanaguana

Larus atricilla (PB: 20/19, 0/0; C: 1/1, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, Punta-gorda, ad., foto, 24 de abril (O. Monterroso Hoyos).

(Norteamérica). Segundo registro que se homologa para las Canarias (el anterior en la isla de La Gomera, enero-febrero de 1996).

Gaviota Pipizcan

Larus pipixcan (PB: 5/5, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Madrid. Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, presa del Rey, 2.º inv., fotos, 13 a 22 de septiembre (Javier de la Puente, Delfín González Fernández y otros).

(Norteamérica). Interesante observación en el interior mismo de la Península, hasta ahora carente de citas sobre esta especie.

Gaviota de Bonaparte

Larus philadelphia (PB: 7/5, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Cantabria. Castro Urdiales, playa de Brazomar, ad., fotos, 14 de enero (I. García Serna).

(Norteamérica). Primer registro en Cantabria.

Gaviota de Delaware

Larus delawarensis (PB: 94/163, 7/8; C: 12/13, 0/0)

A Coruña. Ares, playa, ad., fotos, 21 de enero a 15 de marzo (P. Gutiérrez Varga y A. Gutiérrez Pita/Sterna-Ferrol, y A. Sandoval); misma localidad y quizás mismo individuo, ad., fotos, 1 de diciembre a 15 de marzo de 2003 (A. Gutiérrez Pita, P. Gutiérrez Varga y otros/Sterna-Ferrol); Ferrol, ad., 21 de enero a 16 de marzo (P. Gutiérrez Varga y A. Gutiérrez Pita/Sterna-Ferrol, y A. Sandoval).

Asturias. Gijón (Xixón), parque de Isabel la Católica, dos, 1.º inv. y ad., fotos, 11 de marzo (D. González Fernández); misma localidad, 2.º inv., fotos, 11 de diciembre (D. González Fernández).

Guipúzcoa (Gipuzkoa). Irún, bahía de Txingudi, Parque Ecológico de Plaiiandi, 2.º inv., 13 y 15 de enero (M. Etxaniz Aginagalde y G. Gorospe Rombouts); misma localidad, ad., 14 de enero (M. Etxaniz Aginagalde).

2001:

A Coruña. A Coruña, ría de O Burgo, 1.º verano, 18 de marzo (R. Salvadores Ramos, T. Salvadores Ramos y C. Vidal Rodríguez).



Gaviota Pipizcan *Larus pipixcan*, segundo invierno. Rivas-Vaciamadrid (Madrid), septiembre de 2002. Foto: Delfín González.

1997:

Asturias. Gijón (Xixón), parque de Isabel la Católica, 2.º inv., con anilla, 2 de noviembre (L. M. Arce).

1996:

Asturias. Gijón (Xixón), parque de Isabel la Católica, tres, 1.º inv., 6 de diciembre (L. M. Arce).

(Norteamérica). Distribución típica de las citas: todas en las costas cántabro atlánticas y en fechas de noviembre a marzo.

Gavión Hiperbóreo

Larus hyperboreus (PB: 76/87, 1/1; C: 3/3, 0/0)

Cantabria. Marina de Cudeyo, playa de Galizano y punta de Cucabrera, 2.º verano, foto, 15 de marzo (J. Gómez-Navedo, A. Andrés y F. de Frutos).

(Holártico circumpolar). Tan sólo una cita en este año.

Charrán Real

Sterna maxima (PB: 12/15, 3/3; C: 0/0, 0/0)

Cádiz. Tarifa, playa de Los Lances, ad., foto, 2 de octubre (J. M. Diego Inac y otros). Chiclana de la Frontera, playa de Sancti Petri, ad., 1 de noviembre (F. Chiclana Moreno, J. Salcedo y otros/SEO-Sevilla). Tarifa, playa de Los Lances, ad., fotos, 7 de noviembre (D. Cuenca).

(América y costas de África occidental). En Thévenot *et al.* (2003) se ofrece una interesante revisión sobre las presentaciones de esta especie en Marruecos.

Charrán Sombrío

Sterna fuscata (PB: 3/3, 0/0; C: 1/1, 0/0)

2001:

Pontevedra. Baiona, cabo Silleiro, ave en paso a pocos metros de la costa, ad., 29 de agosto (C. Vidal Rodríguez).

(Pantropical). Tercera observación peninsular homologada. Su interés se incrementa al considerar que las otras dos y la de Canarias eran todas ya de los años 80. Y es curioso que también para Francia falten por completo observaciones durante los años 90 (Dubois *et al.*, 2000).


Tórtola Oriental

Streptopelia orientalis (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2001:

Castellón. Islas Columbretes, isla Grosa, juv., atrapado para anillamiento, fotos, 30 de septiembre (C. Jensen Marcet).

(Asia). Segunda cita española, después de la que tuvo lugar en Tarragona en diciembre de 1994 (Ar-



Charrán Sombrío *Sterna fuscata*, adulto. Cabo Silleiro (Pontevedra), agosto de 2001. Dibujo: C. Vidal.

deola, 44: 133). Los caracteres del ejemplar concuerdan en general con la subespecie occidental *S. o. meena*, a la que por otra parte suelen achacarse las presentaciones de esta especie en Europa, si bien hay que hacer constar que algunos detalles importantes no pudieron estudiarse debido a que el ejemplar había perdido por completo la cola (posiblemente al escapar de alguno de los halcones de Eleonora *Falco eleonorae* que anidan en Columbrete).

Tórtola Senegalesa

Streptopelia senegalensis (PB: 8/10, 0/0; C: 14/23, 1/4)

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, La Lajita, cuatro, ads., 2 de febrero (G. Oliosio).

(África y suroeste de Asia). Para las islas Canarias y en concreto Fuerteventura se conocen observaciones desde 1988, pero esta es la primera que tiene que ver con cuatro aves. A destacar, también, que dos de ellas estaban en cortejo y llegaron a copular. Tal como hacen ver Martín & Lorenzo (2001), cabe la posibilidad de que estas citas canarias se deban a escapes o sueltas, pero alguna podría tener que ver con llegadas desde Marruecos, donde la especie se estableció a principios de los 80 y ahora está muy repartida (Bergier *et al.*, 1999). Dado que en 2003 y 2004 se han producido nuevas observaciones que hacen creer que la especie se encuentra ya firmemente establecida como reproductora en Fuerteventura y Lanzarote, el Comité de Rarezas ha considerado conveniente retirarla de la lista de rarezas para Canarias, de forma que no se considerarán las citas relativas a estas islas que tengan fechas posteriores al 1 de enero de 2005.

Vencejo Moro

Apus affinis (PB: 22/34, 1/2; C: 8/9, 0/0)

Cádiz. Tarifa, Bolonia, dos, 27 de julio (A. M. Paterson, A. Paterson Ferosell y M. A. C. Clark).

(África, Oriente Medio y sur de Asia). En la actualidad el Comité de Rarezas estudia ya citas que hablan de la reproducción de varias parejas en la provincia de Cádiz durante la primavera del 2004.

Bisbita de Richard

Anthus richardi (PB: 52/155, 1/2; C: 3/3, 0/0)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, dos, 6 de abril (J. L. Rabuñal Patiño).

1999:

Asturias. Punta La Romanela, Navia, dos, 19 de enero (L. M. Arce).

(Centro y este de Asia). Tampoco este año hubo invernada en el entorno de Traba, siendo la fecha de la única observación de pleno paso primaveral. En la zona de la observación asturiana se anotaron al menos 15 aves en diciembre de 1997.

Bisbita de Hodgson

Anthus hodgsoni (PB: 3/4, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2001:

Pontevedra. A Guarda, Camposancos, dos, 16 de diciembre, con nuevas observaciones de uno de los individuos los días 19, 22 y 25 (T. Salvadores, A. Salvadores, F. Arcos y C. Vidal).

(Asia central y oriental). Tercera cita española, sólo un año después de la segunda en Doñana, el 13 de diciembre de 2000. Nótese que las fechas de la actual también son de diciembre, mientras en el conjunto de Europa la mayor parte de las observaciones caen en pleno otoño; en concreto, en el Reino Unido la mayoría son de octubre (Vinicombe & Cottridge, 1996) y las de Francia sobre todo de fines de octubre o principios de noviembre (Dubois *et al.*, 2000).

Pájaro-gato Gris

Dumetella carolinensis (PB: 0/0, 0/0; C: 1/1, 0/0)

1999:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Granadilla de Abona, urbanización La Mareta, 4 de noviembre (B. Johnson).

(Norteamérica). Este registro, primero para las Canarias y España, es también uno de los pocos que existen sobre la especie en Europa. En concreto sólo sabemos de otros cinco, repartidos entre Alemania (Helgoland, octubre de 1840; Leopoldshagen, mayo de 1908), las Islas del Canal (Jersey, octubre de 1975), Irlanda (Cork, noviembre de 1986) y Gran Bretaña (Anglesey, octubre de 2001) (Mitchell & Young, 1997; Rogers *et al.*, 2002). De manera que el nuestro vendría a ser, cronológicamente, el quinto para el Paleártico Occidental. Esta es una especie de la familia Mimidae que cría en Norteamérica desde el sur de Canadá hasta casi el Golfo de México y que inverna desde el este de los Estados Unidos hasta Panamá y las islas del Caribe. Conviene notar que la fecha de la observación canaria, un 4 de noviembre, coincide con la irlandesa, siendo otras tres de octubre, lo que estaría muy de acuerdo con las fechas en que se desarrolla la migración otoñal (con llegadas a Centroamérica hacia mediados de octubre, según Cramp, 1988).

Ruiseñor azul

Luscinia cyane (PB: 1/1, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2000:

Tarragona. Delta del Ebro, laguna de Canal Vell, macho de 1.º inv., atrapado para anillamiento, fotos, 18 de octubre (D. Bigas, J. Piccardo y otros).

(Siberia oriental, noreste de China y Japón). Este es cronológicamente el segundo registro para todo el Paleártico occidental, tras la captura de una posible hembra de primer invierno ocurrida en las Islas del Canal el 27 de octubre de 1975 (Rountree, 1977;



Ruiseñor azul *Luscinia cyane*, macho de primer invierno. Delta del Ebro (Tarragona), octubre de 2000. Foto: R. Gutiérrez.

Alström *et al.*, 1991). Sin embargo, dos observaciones británicas han seguido muy de cerca a la nuestra, con fechas 23 de octubre de 2000 y 2 de octubre de 2001 (Rogers *et al.*, 2002). Las áreas de invernada de esta especie asiática oriental se extienden desde el suroeste de la China hasta Birmania, islas Filipinas, Borneo y Sumatra, y su paso otoñal en China tiene lugar entre septiembre y principios de octubre (Cramp, 1988). Véase nota sobre la presente observación, con fotos, en Bigas & Gutiérrez (2000).

Collalba Desértica

Oenanthe deserti (PB: 4/4, 1/1; C: 12/17, 0/0)

Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Aznalcázar, Caño de Rosalimán, a 1,5 km del centro de visitantes «José Antonio Valverde», hembra ad., 31 de agosto (J. Butler, Steven Long y Sharon Long).

2000:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Buena Vista del Norte, hembra, fotos, 4 de marzo (B. Rodríguez Martín).

1998:

Asturias. Salinas, concejo de Castrillón, macho de 1.^{er} inv., fotos, 29 de noviembre de 1997 a 28 de marzo (D. López Velasco, C. Álvarez Usategui, E.

García Sánchez y otros /Coordinadora Ornitológica d'Asturies).

1997:

Asturias. Véase arriba.

(Norte de África, Oriente Medio y suroeste de Asia). La observación de Canarias corresponde a una pequeña invasión registrada en esas fechas. Interesante también la larga permanencia invernal del ave asturiana.

Zorzal Papinegro

Turdus ruficollis atrogularis (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Tarragona. Delta del Ebro, Barra del Trabucador, 1.^{er} inv., 13 de octubre (S. West).

(Extremo E de Rusia Europea hasta Asia central). Primera observación homologada para España y la Península Ibérica de una especie que en el conjunto de Europa es divagante relativamente frecuente (véanse por ejemplo Alström *et al.*, 1991, y Mitchell & Young, 1997). Para Gran Bretaña se conocen ya 51 registros y 16 para Francia. Por las mismas fechas que la nuestra tuvieron lugar tres observaciones en Gran Bretaña, entre el 15 y el 17 de octubre, también correspondientes las tres a aves de primer invierno (Rogers *et al.*, 2003).



Carricero de Blyth *Acrocephalus dumetorum*. Brazo de la Torre (Sevilla), septiembre de 2001. Foto: J. L. Arroyo.

Carricero de Blyth

Acrocephalus dumetorum (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. La Puebla del Río, Brazo de la Torre, San Ramón, fotos, capturado para anillamiento, días 2 y 5 de septiembre de 2001 y nuevamente, 28 de agosto de 2002 (J. L. Arroyo Matos y K. Breck).

2001:

Sevilla. Véase arriba.

(Eurasia, desde Finlandia y los Países Bálticos hasta el Asia central). Este es el primer registro que se homologa en España y la península Ibérica, aunque en septiembre de 1972 un carricero atribuido a esta especie se anilló en Cubas, Cantabria, (Agüero & González Morales, 1973) y en septiembre de 1973 otro en Gibraltar (Cortés *et al.*, 1980). Se trata de una especie que ha extendido su área de distribución hacia el oeste —ha criado ya en Suecia— y que pese a tener rutas migratorias muy orientales, puesto que inverna en la India, Pakistán y Birmania, se ha registrado ya como diágrado en bastantes países europeos (Cramp, 1992). En Gran Bretaña llevan 56 registros homologados (Rogers *et al.*, 2003) y siete en Francia (Frémont *et al.*, 2004). La mayor parte de las presentaciones en Europa occidental son de septiembre y octubre.

Mosquitero Bilistado

Phylloscopus inornatus (PB: 27/27, 1/1; C: 6/6, 0/0)

Barcelona. Delta del Llobregat, junto a la laguna de El Remolar, 2 de noviembre (D. González Ballvey).

(Norte y este de Siberia y Asia central).

Mosquitero Sombrió

Phylloscopus fuscatus (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2001:

Lleida. Vilanova de la Barca, Sot del Fuster, capturado para anillamiento, fotos, 15 de noviembre (O. Baltà i Josa y otros).


(Asia central y oriental). Segunda cita homologada, tras la de Menorca en mayo de 1997 (*Ardeola*, 49: 165). En esta ocasión la fecha sí que entra dentro de lo que es habitual en Europa.

Papamoscas Papirrojo

Ficedula parva (PB: 17/17, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Ciudad Real. Torre de Juan Abad, finca Cerrojero, macho ad., 15 de septiembre (T. Gullick y T. McIlroy).

Málaga. Torremolinos, ave no juv., 31 de julio (A. M. Paterson).



Mosquitero Sombrío *Phylloscopus fuscatus*. Vilanova de la Barca (Lérida), noviembre de 2001. Foto: O. Baltá y otros.

(Europa central y oriental y Asia). La de Ciudad Real es la primera observación homologada para Castilla-La Mancha y todo el interior peninsular. La de Málaga es extraordinariamente temprana (casi todas nuestras observaciones de otoño caen entre mediados de septiembre y finales de octubre).

Papamoscas Collarino

Ficedula albicollis (PB: 28/28, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Burgos. Piedrahíta de Muñío, macho, 1 de mayo (R. Fernández González).

1998:

Tarragona. Delta del Ebro, estación Biológica de Canal Vell, 1.º inv., fotos, 19 de septiembre (D. Bigas, J. M. Arcos, D. Perpinyan, X. Larruy y M. Raurell).

(Europa central y oriental y partes de Turquía, el Cáucaso e Irán). Interesa especialmente el registro de Tarragona, por ser el segundo otoñal que homologamos (el primero, por cierto, también tiene que ver con un ave anillada en septiembre en el delta del Ebro).

Estornino Rosado

Sturnus roseus (PB: 11/11, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Girona. Torroella de Montgrí, finca Torre Ponsa, 1 de junio (R. Mascort Amigó y C. Pascual Massaguer).

Sevilla. Puebla del Río, Brazo del Este, macho ad., días 29 (D. Serrano Larraz) y 31 de julio (F. Chiclana Moreno).

2001:

Illes Balears. Isla de Mallorca, Manacor, juv., foto, 15 de enero (C. Pache).

(Sureste de Europa y suroeste de Asia). Igual que el año anterior, el 2002 fue de invasión en Europa (véase por ejemplo Ottens, 2003), con grandes cifras criando en Rumanía y hasta 101 individuos registrados en Francia (Frémont *et al.*, 2004). La distribución geográfica de nuestras citas homologadas hasta ahora resulta, tal como cabría esperar, claramente oriental, con diez en el conjunto de Baleares, Cataluña y el País Valenciano frente a tres en otras partes).

Camachuelo Carminoso

Carpodacus erythrinus (PB: 21/21, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Ceuta. Ceuta, arroyo de El Infierno, juv., atrapado para anillamiento, fotos, 15 de septiembre (J. Navarrete Pérez, J. Peña Ríos, J. Gaona Mena y M. A. Guirado Cajal).

2000:

Huelva. Parque Nacional de Doñana, Manecorro, juv., atrapado para anillamiento, fotos, 26 de octubre (J. L. Arroyo y R. Moreno).



Camachuelo Carminoso *Carpodacus erythrinus*, juvenil. Ceuta, septiembre de 2002. Foto: J. Navarrete, J. Peña y otros.

(Norte y centro de Europa, y Asia). La de Ceuta es la primera observación que homologamos para el norte de África. Para Marruecos se conocen dos, en Oualidia, octubre de 1980, y en el estuario del Masha, enero de 1994 (Thévenot *et al.*, 2003).

Escribano Pigmeo

Emberiza pusilla (PB: 24/24, 3/3; C: 0/0, 0/0)

Albacete. Albacete, canal de El Salobral, atrapado para anillamiento, fotos, 18 de enero (A. Fajardo y A. Lara); misma localidad, 1.^{er} inv., atrapado para anillamiento, fotos, 30 de enero (J. A. Cañizares Mata, D. Cañizares Mata y otros/Grupo Manchego de Anillamiento).

Zaragoza. Fuentes de Ebro, primer año, atrapado para anillamiento, 29 de noviembre (M. Escudero, M. Feliu y J. Lucientes).

(Nordeste de Europa y Siberia). Las citas de esta especie en España se reparten bastante y muchas corresponden, como las tres del presente informe, a localidades del interior peninsular.

Escribano Carirrojo

Emberiza bruniceps (PB: 4/4, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1962:

Barcelona. Masnou, macho, foto, capturado por un aficionado a la cría de aves (D. Juan Canela Trepát)

el 12 de noviembre y que posteriormente es mantenido en cautividad, donde puede ser estudiado y fotografiado; la cita se homologa a partir de lo que figura en Maluquer (1964).

(Asia central y oriental). Origen desconocido. A esta cita antigua hacíamos ya referencia en nuestro informe anterior. Aunque por lo general las observaciones del Escribano Carirrojo en Europa se consideran provenientes de cautividad, recientemente se ha sugerido que la mayor parte de las de Francia e Italia podrían deberse a llegadas naturales ya que cuadran perfectamente con las épocas de migración (Yésou *et al.*, 2003). De ser así tal vez debiera replantearse la categoría del Escribano Carirrojo en la lista española, dado que nuestros cuatro registros caen todos entre un 10 de octubre y un 12 de noviembre.

B) ESPECIES CONSIDERADAS SÓLO PARA LAS ISLAS CANARIAS

Porrón Pardo

Aythya nyroca (1/1, 0/0)

1923:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Laguna, punta del Hidalgo, ave que se conserva disecada

en la colección de D. Domingo Bello (visitada por gentileza de D. Ruperto Pérez Godiño), fotos, capturada el 17 de noviembre (J. A. Lorenzo Gutiérrez).

(Europa y Asia occidental). Martín & Lorenzo (2001) recopilan sólo seis citas para las Canarias, en su mayoría invernales y correspondientes a aves solitarias, una de ellas la que aquí se homologa.

Negrón Común

Melanitta nigra (1/1, 0/0)

1921:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Laguna, punta del Hidalgo, ave que se conserva disecada en la colección de D. Domingo Bello (visitada por gentileza de D. Ruperto Pérez Godiño), fotos, capturada en el mes de octubre (J. A. Lorenzo Gutiérrez).

(Holártico, boreal). Registro ya antiguo. El área de distribución invernal de este pato marino se extiende por el sur hasta Mauritania (Snow & Perrins, 1998).

Colimbo Ártico

Gavia arctica (0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, Agüimes, playa de Vargas, fotos y vídeo, 19 y 23 de diciembre (J. García Monzón).

(Holártico, boreal). Primera cita concreta sobre esta especie en Canarias (Martín & Lorenzo, 2001), en fecha plenamente invernal, como cabría esperar.

Colimbo Grande

Gavia immer (2/2, 0/0)

1996:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Laguna, mar cerca de La Barranquera, fotos, ave recogida en el mar y llevada al Centro de Recuperación de Fauna del Cabildo Insular de Tenerife, presenta las primarias de ambas alas recortadas por lo que su origen es dudoso, 12 de julio (V. Quilis y J. Hernández Abad).

(Norteamérica, Groenlandia e Islandia, en altas latitudes). La fecha tampoco habla en favor de una llegada natural... Una fotografía de este ejemplar se publicó en Martín & Lorenzo (2001).

Flamenco Común

Phoenicopterus roseus (0/0, 5/12)

La Palma. Isla de Fuerteventura, Jandía, cerca del hotel Los Gorriones, juv., foto, 10 de septiembre (A. Betoret López).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, puerto de Tazacorte, tres juvs., foto de uno, aparecen con síntomas de agotamiento y son atendidos en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Cabildo Insular (uno muere a los pocos días), 12 y 13 de agosto (F. M. Medina/Unidad de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma); misma localidad, juv., encontrado muerto, 19 de agosto (F. M. Medina/Uni-



Flamenco Común *Phoenicopterus roseus*, juvenil. Jandía (Fuerteventura), septiembre de 2002. Foto: A. Betoret.

dad de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma); Llanos de Aridane, charcas de Las Martelas, dos juvs., 17 de agosto (F. M. Medina/Unidad de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma) y también 31 de agosto y 4 de septiembre (J. M. Castro Martín); salinas de Fuencaliente, cinco juvs., fotos, 19 de agosto (F. M. Medina/Unidad de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma), de los que uno muere tras ser tratado en el Centro de Rehabilitación, tres siguen hasta el 26 de septiembre y uno hasta el 9 de noviembre (J. M. Castro Martín).

(Sur de Europa, África y suroeste de Asia). Se homologan aquí una cita para Fuerteventura y cuatro para La Palma —las primeras conocidas para esta isla—, referentes a un total de doce aves, todas ellas en plumaje juvenil. El ejemplar encontrado muerto en Tazacorte y uno de los observados en las salinas de Fuencaliente estaba anillado, lo que permitió saber que habían nacido en ese mismo año en la colonia de Fuente de Piedra, Málaga. Siguiendo las recomendaciones de la AERC, consideramos como especies distintas *Phoenicopterus ruber*, de distribución americana, y *P. roseus*, del Viejo Mundo.

Cernícalo Patirrojo

Falco vespertinus (4/4, 0/0)

2001:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Laguna, aeropuerto de Los Rodeos, macho ad., encontrado muerto al borde de la pista de vuelo, foto, mes de mayo (J. A. Lorenzo Gutiérrez).

1907:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, carretera de La Laguna a Tejina, macho ad., se conserva disecada en la colección de D. Domingo Bello (visitada por gentileza de D. Ruperto Pérez Godiño), foto, capturado en el mes de mayo (J. A. Lorenzo Gutiérrez).

(Este de Europa y Asia). Casi un siglo separa estas dos observaciones, por lo demás bastante parecidas.

Archibebe Fino

Tringa stagnatilis (2/2, 2/2)

Las Palmas. Isla de Lanzarote, Yaiza, salinas de Janubio, ad., 9 de octubre (F. J. García Vargas). Isla de Gran Canaria, Santa Lucía, Costa Teneife, 14 de diciembre (M. A. Suárez Fariás).

(Europa oriental y sur de Siberia). Primeras citas homologadas para Lanzarote y Gran Canaria.

Falaropo Picogrueso

Phalaropus fulicarius (1/4, 0/0)

1999:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Santiago del Teide, en el mar desde Los Gigantes, cuatro, en muda a plumaje invernal, 31 de octubre (J. Normaja y J. J. Nurmi).

(Holártico circumpolar). De acuerdo con Martín & Lorenzo (2001) tan sólo se conocían cinco citas para las Canarias, todas en el período julio-septiembre.

Arao Común

Uria aalge (0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Lanzarote, Arrecife, puerto, 5 de diciembre (L. Concepción Francisco y S. Díaz Díaz).

(Holártico). Para las Canarias únicamente existían menciones antiguas relativas al Arao Común (véase recopilación en Martín & Lorenzo, 2001). Su área de invernada habitual llega sólo hasta Portugal.

Acentor Común

Prunella modularis (0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, embalse de Cruz Santa, 26 de enero (P. Hottola, comunicado por T. Clarke).

(Europa). Martín & Lorenzo (2001) recogen tan sólo una observación anterior sobre esta especie en las Canarias, también de Tenerife. Ya en Marruecos se considera invernante raro, pero regular, en el nordeste del país (Thévenot *et al.*, 2003).

Roquero Solitario

Monticola solitarius (0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, Telde, Las Remudas, macho, 9 de septiembre (M. A. Suárez Fariás).

(Sur de Europa, noroeste de África y sur y este de Asia). Hay muy pocas citas en Canarias y hasta la fecha se limitaban a las islas más orientales (Martín & Lorenzo, 2001).

Escribano Nival

Plectrophenax nivalis (2/2, 0/0)

1916:

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Laguna, macho, plumaje otoñal, se conserva disecado en la colección de D. Domingo Bello (visitada por gentileza de D. Ruperto Pérez Godiño), foto, 16 de noviembre (J. A. Lorenzo Gutiérrez).

(Holártico boreal). Martín & Lorenzo (2001) recopilan una decena de citas, siempre con referencia a aves solitarias y en otoño-invierno.

Escribano Hortelano

Emberiza hortulana (1/1, 0/0)

1988:

Las Palmas. Isla de Lanzarote, islote de Alegranza, juv., fotos, mes de septiembre (V. Quilis, comunicado por J. A. Lorenzo Gutiérrez).

(Eurasia). En Martín & Lorenzo (2001) figuran en total ocho observaciones, una de ellas la que ahora se homologa.

REGISTROS NO HOMOLOGADOS

1996: Gavión Hiperbóreo *Larus hyperboreus*; Punta Entinas (Almería), ad., fotos, 24 de marzo (descripción insuficiente y fotos cuya calidad no permite una seguridad completa).

1997: Ibis Sagrado *Threskiornis aethiopicus*; Bornos (Cádiz), ad., 12 de abril (sin descripción ni fotos que den fe de la cita). **Busardo Moro** *Buteo rufinus*; San Adrián de Juarros (Burgos), 5 de septiembre (la descripción no permite seguridad absoluta, en particular cuando se trata de descartar a *B. buteo vulpinus*). **Tórtola Oriental** *Streptopelia orientalis*; «Palmitos Park», San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria (Las Palmas), 26 de julio (descripción insuficiente). **Golondrina Común** *Hirundo rustica transilva*; Delta del Llobregat (Barcelona), macho ad., 20 de abril (la determinación se basa fundamentalmente en la coloración de las partes inferiores, que resulta muy variable dentro de las distintas subespecies, incluidas la nominal y *savignii*). **Lavandera Boyera** *Motacilla flava feldegg*; Los Santos de Maimona (Badajoz), macho, 7 de agosto (la descripción no permite descartar la posibilidad de un macho de la subespecie *thunbergi*).

1998: Pelicano Común *Pelecanus onocrotalus*; delta del Ebro (Tarragona), ad., 28 de noviembre (descripción que no permite eliminar otras posibilidades dentro del género *Pelecanus*). **Corredor Sahariano** *Cursorius cursor*; Tarifa (Cádiz), 1 de abril (descripción insuficiente). **Papamoscas Semicollarino** *Ficedula semitorquata*; Parque Nacional de Doñana (Huelva), hembra juv., atrapada para anillamiento, fotos, 22 de septiembre (algunos de los rasgos señalados en la descripción y apreciables en las fotos no concuerdan con esta especie y sugieren por el contrario un *Ficedula hypoleuca* de coloración algo inusual). **Estornino Negro** *Sturnus unicolor*; Aventura, isla de Gran Canaria (Las Palmas), 28 de julio (descripción insuficiente). **Escribano Cabecinegro** *Emberiza melanocephala*; charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria (Las Palmas), macho, 26 de julio (descripción insuficiente).

1999: Busardo Moro *Buteo rufinus*; Tonyà, Garrigàs (Girona), 2 de julio (observación muy breve y descripción que no basta para asegurar la identificación). **Cuervo Desertícola** *Corvus ruficollis*; Pájara, isla de Fuerteventura (Las Palmas), 22 de marzo (descripción insuficiente).

2000: Pigargo Europeo *Haliaeetus albicilla*; Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia), juv., 9 de noviembre (descripción insuficiente). **Aguilucho Papialbo** *Circus macrourus*; balsa de Zolina (Navarra), juv., 28 de septiembre (las dificultades existentes para separar correctamente a los juveniles de las diferentes especies de *Circus* no permiten en este caso una seguridad absoluta, pese a que la descripción apunta claramente a un *C. macrourus*). **Cha-**

rrrán de Forster *Sterna forsteri*; puerto de Los Gigantes, Santiago del Teide, isla de Tenerife, 19 de mayo (descripción insuficiente). **Estornino Rosado** *Sturnus roseus*; Parque Nacional de Doñana (Huelva), dos juvs., 8 y 9 de diciembre y quizás en fechas posteriores hasta 7 de enero de 2001 (descripciones y fotos apuntan a alguna otra especie exótica de estornino, posiblemente relativa a aves escapadas).

2001: Barnacla Carinegra *Branta bernicla hrota*; Marismas de Santoña (Cantabria), fotos, 19 de octubre (descripción insuficiente y fotos poco reveladoras). **Silbón Americano** *Anas americana*; Marismas de Santoña (Cantabria), macho, 19 de octubre (descripción insuficiente). **Aguilucho Papialbo** *Circus macrourus*; Parque Natural del Desierto de las Palmas, Cabanes (Castellón), juv., 29 de septiembre (descripción insuficiente). **Busardo Moro** *Buteo rufinus*; entre Tarifa y Algeciras (Cádiz), un ave el día 19 y dos el 25 de septiembre (descripción insuficiente). **Águila Pomerana** *Aquila pomarina*; Tarifa (Cádiz), inmaduro, 12 de septiembre (descripción insuficiente). **Bisbita de Richard** *Anthus richardi*; dunas en la Devesa del Saler, Albufera de Valencia (Valencia), 28 de noviembre (ave observada sólo en vuelo e identificación basada en la voz). **Mosquitero Común** *Phylloscopus collybita tristis*; Parque Nacional de Doñana (Huelva), atrapado para anillamiento, fotos, 2 a 7 de noviembre (ave muy pálida, sin nada de amarillo ni verde en el plumaje, que pudiera corresponder a un caso singular de pigmentación pero no a un *tristis*, raza en que aparece amarillo bajo las alas y verde en los bordes de las rémiges).

2002: Cisne Vulgar *Cygnus olor*; Castellbell i el Vilar (Barcelona), ad., 10 de diciembre (no existe descripción del ave). **Barnacla Canadiense** *Branta canadensis*; embalse de Sierra Brava, Zorita (Cáceres), 12 de enero (los rasgos anotados no concuerdan plenamente con ninguna subespecie de *Branta canadensis* y sugieren en cambio la posibilidad de un híbrido entre esta especie y otra, tal vez la Barnacla Cariblanca *Branta leucopsis*). **Tarro Canelo** *Tadorna ferruginea*; colas del embalse del Zadorra, Mendixur (Álava), tres, 29 de agosto (descripción insuficiente). **Pato Mandarín** *Aix galericulata*; río Llobregat en Molins de Rei (Barcelona), hembra, foto, 25 de julio a 15 de agosto (ni la descripción ni las fotos permiten eliminar la posibilidad de un Pato Joyuyo *Aix sponsa*). **Porrón Acollarado** *Aythya collaris*; Vallehermoso, isla de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), macho inmaduro, 1 y 2 de noviembre (descripción insuficiente). **Garceta Dimorfa** *Egretta gularis*; campo de golf en Telde, isla de Gran Canaria (Las Palmas), 12 a 19 de mayo (la descripción resulta insuficiente para discriminar entre un individuo puro de esta especie y un híbrido). **Milano Negro** *Milvus migrans parasitus/aegyptius*; río Duero a su paso por Zamora capital (Zamora), 25 de mayo (descripción insuficiente). **Buitre Moteado** *Gyps rueppellii*; Villanueva de Alcorón (Guadalajara), 12

de mayo (descripción insuficiente y recogida por una segunda persona). **Busardo Calzado** *Buteo lagopus*; Valle de Tobalina (Burgos), macho, 26 de abril (descripción insuficiente); Burriana (Castellón), juv., 22 de octubre (descripción insuficiente). **Águila Moteada** *Aquila clanga*; Trujillo (Cáceres), ad., 21 de abril (ave observada sólo en vuelo, a 250 m de distancia y apenas 5 minutos, y descripción demasiado breve). **Halcón Tagarote** *Falco pelegrinoides*; El Rocío (Huelva), foto, 21 de abril (sin descripción, foto no suficientemente reveladora). **Corredor Sahariano** *Cursorius cursor*; desembarcadura del Guadalhorce (Málaga), cinco aves, 28 de abril (descripción insuficiente, aves observadas sólo en vuelo y muy poco rato). **Chorlitejo Mongol Chico** *Charadrius mongolus*; Tarifa (Cádiz), 26 de abril (descripción que no basta para separar esta especie del **Chorlito Mongol Grande** *Charadrius leschenaultii*). Chorlito Dorado Siberiano *Pluvialis fulva*; Sotogrande (Cádiz), 8 de abril (distancia de observación excesiva, unos 300 ó 400 m). **Archibebe Patiguado Chico** *Tringa flavipes*; marismas de La Algaída, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 12 a 22 de diciembre (descripción insuficiente). **Andarrios Maculado** *Actitis macularius*; Aiguamolls de l'Empordà (Girona), ad., 10 de mayo (descripción insuficiente). **Págalo Polar** *Catharacta maccormicki*; mar a unas 2 millas de la isla de La Gomera, desde el ferry a Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 17 de julio (descripción insuficiente). **Gaviota Pipizcan** *Larus pipixcan*; Laredo (Cantabria), 2.º inv., 21 de diciembre (descripción insuficiente). **Gaviota de Delaware** *Larus delawarensis*; charca de El Fraile, Arona, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 1.ª inv., 1 de enero (la descripción no permite eliminar la posibilidad de una Gaviota Cana *Larus canus*); Puerto de la Cruz, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), ad., 27 de febrero (descripción insuficiente); gola del río Besòs, Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 1.ª verano, foto, 21 de abril (algunos rasgos, a partir sobre todo de la foto, sugieren un híbrido); Santa Cruz de La Palma, isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), 1.ª verano/2.ª inv., 31 de octubre (descripción insuficiente); playa de El Serradal, Castellón de la Plana (Castellón), 3er. inv., 7 y 15 de noviembre (algunos de los rasgos descritos no cuadran bien con esta especie). **Bisbita de Richard** *Anthus richardi*; aeropuerto de Son Sant Joan, isla de Mallorca (Illes Balears), 27 de noviembre (descripción insuficiente). **Colinegro Común** *Cercomela melanura*; Ronda (Málaga), 7 de septiembre (descripción insuficiente). **Collalba Cullirroja** *Oenanthe moesta*; Cabo de Gata (Almería), macho de 1.ª inv., 21 de diciembre (observación muy breve y descripción insuficiente; la especie no cuenta con observaciones homólogas en España). **Mosquitero Común** *Phylloscopus collybita tristis*; Cañada de Las Norias, El Egido (Almería), capturado para anillamiento, fotos, 2 de marzo (no hay descripción y las fotos

muestran una coloración del pico impropia de *tristis*). **Papamoscas Papirojo** *Ficedula parva*; valle del río Borosa, sierra de Cazorla (Jaén), 10 de septiembre (descripción insuficiente). **Estornino Rosado** *Sturnus roseus*; Montejaque (Málaga), 2 de septiembre (descripción insuficiente).

BIBLIOGRAFÍA

- AGÜERO, I & GONZÁLEZ MORALES, J. A. 1973. Posible captura de *Acrocephalus dumetorum* en España. *Ardeola*, 19: 33.
- ALSTRÖM, P., COLSTON, P. & LEWINGTON, I. 1991. *A field guide to the rare birds of Britain and Europe*. HarperCollins Publishers. Londres.
- BANNERMAN, D. A. 1963. *Birds of the Atlantic Islands. Vol 1. A History of the Birds of the Canary Islands and of the Salvages*. Oliver & Boyd. Edimburgo y Londres.
- BERGIER, P., FRANCHIMONT, J. & THÉVENOT, M. 1999. Implantation et expansion géographique de deux espèces de Columbidae au Maroc: la Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* et la Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*. *Alauda*, 67: 23-36.
- BIGAS, D. & GUTIÉRREZ, R. 2000. The Siberian Blue Robin in Spain - the second Western Palearctic record. *Birding World*, 13: 415-417.
- CORTES, J. E., FINLAYSON, J. C., GARCIA, E. F. J. & MOSQUERA, M. A. J. 1980. *The Birds of Gibraltar*. Gibraltar Bookshop. Gibraltar.
- CORSO, A. & CARDELLI, C. 2004. The migration of Pallid Harrier across the central Mediterranean with particular reference to the Strait of Messina. *British Birds*, 97: 238-246.
- COSTA, H., BOLTON, M., CATRY, P., GORDINHO, L. & MOORE, C.C. 1999. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 1996. *Pardela*, 8: 3-23.
- COSTA, H., BOLTON, M., MATIAS, R., MOORE, C.C. & TOMÉ, R. 2003. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 1999, 2000 e 2001. *Anuário Ornitológico*, 1: 3-35.
- CRAMP, S. (Ed.) 1988. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. V. Oxford University Press. Oxford.
- CRAMP, S. (Ed.) 1992. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. VI. Oxford University Press. Oxford.
- DANNENBERG, R. 1983. Capped Petrel in north-eastern North Atlantic Ocean in February 1980. *Dutch Birding*, 5: 85-86.
- DE JUANA, E. & CAMIÑA, A. 2001. Observations of Rüppell's Griffons in Spain. *Vulture News*, 44: 36-40.
- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. & SARGATAL, J. 1992. *Handbook of the Birds of the World, Vol. I*. Lynx Edicions, Barcelona.

- DENNIS, J. V. 1990. Banded North American birds encountered in Europe: an update. *North American Bird Banding*, 15: 130-133.
- DUBOIS, P. J., LE MARÉCHAL, P., OLIOSO, G. & YÉSOU, P. 2000. *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan. París.
- FRÉMONT, J. Y. et le CHN. 2004. Les oiseaux rares en France en 2002. *Ornithos*, 11: 49-85.
- GUTIÉRREZ, R. 2003. Occurrence of Rüppell's Griffon Vulture in Europe. *Dutch Birding*, 25: 289-303.
- GUTIÉRREZ, R. & VILLA, S. 2002. A possible hybrid spotted eagle x lesser spotted eagle in Spain. *Birding World*, 15: 104-105.
- HOWELL, S. 2002. A Black-capped Petrel off the Bay of Biscay: the fourth for the Western Palearctic. *Birding World*, 15: 219-220.
- MALUQUER, S. 1964. Primera captura de *Emberiza bruniceps* en la Península Ibérica. *Ardeola*, 9: 156-157.
- MARTÍN, A. & LORENZO, J. A. 2001. *Aves del Archipiélago Canario*. Francisco Lemus, Editor. La Laguna.
- MITCHELL, D. & YOUNG, S. 1997. *Photographic handbook of the rare birds of Britain and Europe*. New Holland. Londres.
- MOORE, C. C. 2001. White-rumped Sandpiper *Calidris fuscicollis*, Pink-footed Goose *Anser brachyrhynchus* and Lesser Flamingo *Phoenicopterus minor*: three taxa recorded for the first time in Portugal. *Airo*, 11: 55-57.
- OTTENS, G. 2003. Invasion of Rose-coloured Starlings in the Netherlands in 2002. *Dutch Birding*, 25: 385-393.
- ROGERS, M. J. & the Rarities Committee. 2002. Report on rare birds in Great Britain in 2001. *British Birds*, 95: 476-528.
- ROGERS, M. J. & the Rarities Committee. 2003. Report on rare birds in Great Britain in 2002. *British Birds*, 96: 542-609.
- ROUNTREE, F. R. G. 1977. Siberian Blue Robin: new to Europe. *British Birds*, 70: 361-365.
- SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (Eds.) 1998. *The birds of the Western Palearctic. Concise edition*. Oxford University Press. Oxford.
- STAGG, A. 2003. First sighting of Long-billed Dowitcher, *Limnodromus scolopaceus*, in the Balearic Islands. *Anuari Ornitològic de les Balears*, 17: 3-9.
- THÉVENOT, M., VERNON, R. & BERGIER, P. 2003. *The Birds of Morocco. An annotated checklist*. British Ornithologists' Union. Tring, Reino Unido.
- VÄLI, Ü & LÖHMUS, A. 2004. Nestling characteristics and identification of the lesser spotted eagle *Aquila pomarina*, the greater spotted eagle *A. clanga* and their hybrids. *Journal für Ornithologie*, 145: 256-263.
- VINICOMBE, K. & COTTRIDGE, D. M. 1996. *Rare birds in Britain and Ireland. A photographic record*. HarperCollins Publishers. Londres.
- VOTIER, S. C., HARROP, A. H. J. & DENNY, M. 2003. A review of the status and identification of American Wigeon in Britain & Ireland. *British Birds*, 96: 2-22.
- YÉSOU, P., DUQUET, M. & CORSO, A. 2003. Le Bruant à tête rousse *Emberiza bruniceps* en France et en Italie: statut et origine. *Ornithos*, 10: 249-251.